

カテゴリー別情報

[TOP](#)

低温によるかんきつ類の果実被害と樹体被害シグナル一覧表

果樹試験場

温度*	持続時間(h)	温州ミカン	ネーブルオレンジ	ハッサク	甘夏ミカン(安政柑)	レモン
温度*	持続時間(h)	温州ミカン	ネーブルオレンジ	ハッサク	甘夏ミカン(安政柑)	レモン
0	1～2			落果の危険		
	3～4		果実に虎斑症発生			
	5以上					
-1	1～2	樹冠外周果霜焼け, 果汁氷点				
	3～4					
	5以上					
-2	1～2	未熟果・油胞黒変症発生				
	3～4					捲葉
	5以上		捲葉			樹上果実に凍害の危険
-3	1～2		夏秋梢霜焼け	捲葉	捲葉, 夏秋梢霜焼け	果実に苦味, 枝の先端部枯死
	3～4		落葉10～20%		果実に凍害の危険	葉の一部枯死, 落葉軽微
	5以上		枝の先端部枯死	夏秋梢霜焼け	樹上果実ス上り苦味発生	樹皮に亀裂
温度*	持続時間(h)	温州ミカン	ネーブルオレンジ	ハッサク	甘夏ミカン(安政柑)	レモン

※温度は百葉箱の中での気温

[シグナル一覧表を別ウィンドウで表示させる場合は、こちらをクリックしてください。](#)■ [かんきつ寒害対策はこちらからご覧ください](#)

果樹災害対策資料より抜粋
 この情報は、2003年12月に作成しました。
 農業改良普及センター果樹普及課

戻る