

「たちすずか」の最適な窒素施用時期

高糖分飼料イネ「たちすずか」は、栽培目的によって最適な窒素施用時期が大きく異なります。

最適な窒素施用時期が判明しました。

茎葉多収栽培の場合： 基肥+出穂30～60日前に施用

採種栽培の場合： 基肥なし、出穂20日前に施用

茎葉多収栽培

田植時期
5月

出穂
60～30
日前

収穫期
10月

窒素施肥
(基肥)
4～8
kg/10a

窒素施肥
4～8
kg/10a



収量目安

窒素施肥量 (kg/10a)	田植 (月/日)	栽植密度 (株/㎡)	出穂期 (月/日)	収穫日 (月/日)
7	5/17	11.9	9/1	10/9
草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	乾物収量 (kg/10a)	乾物率 (%)	穂重割合 (%)
140	240	1500	42	13

採種栽培

田植時期
6月中旬
以降

出穂
20日前

収穫期
10月

×

基肥
なし

窒素施肥
4～8
kg/10a



収量構成要素等

田植 (月/日)	栽植密度 (株/㎡)	出穂期 (月/日)	成熟期 (月/日)	稈長 (cm)	穂数 (本/㎡)
6/15	13.9	9/4	10/15	105	250

一穂粒数 (粒/本)	総粒数 (粒/㎡)	登熟歩合 (%)	粒千粒重 (g)	生産量 (kg/10a)
55	13800	92	27.8	350