

広島県収受	
号	
26.3.27	
処理期	日
分類記号	保存年数


事務連絡
平成26年3月25日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

第十六改正日本薬局方正誤表の送付について（その4）

第十六改正日本薬局方（平成23年厚生労働省告示第65号）につきまして、一部に誤植等がありましたので別紙のとおり正誤表を送付いたします。



第十六改正日本薬局方正誤表 (その4)

1. 一般試験法

該当箇所	頁	行	正	誤
9.41 試薬・試液 キニノーゲン	174 左	↑ 8	$= R_f \times 0.96$	$= R_f \times 0.0096$
9.41 試薬・試液 ケノデオキシコロール酸, 薄層クロマトグラフィー用	181 右	↓ 12	<p>・・・クロホルム/エタノール (95) 混液 (9:1) に溶かし, 正確に 250mL とし試料溶液とする。この液につき, 薄層クロマトグラフィー (2.03) により試験を行う。試料溶液 10μL を薄層クロマトグラフィー用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロホルム/アセトン/酢酸(100)混液(7:2:1)を展開溶媒として約 10cm 展開した後, 薄層板を風乾する。更に 120°C で 30 分間乾燥後, 直ちにリンモリブデン酸 n 水和物のエタノール(95)溶液(1\rightarrow5)を均等に噴霧し, 120°C で 2~3 分間加熱するとき, R_f 値約 0.4 の主スポット以外のスポットを認めない。</p>	<p>・・・クロホルム/エタノール (95) 混液 (9:1) に溶かし, 正確に 250mL とした液 10μL につき, 「ウルソデオキシコロール酸」の純度試験(4)を準用し, 試験を行うとき, R_f 値約 0.4 の主スポット以外のスポットを認めない。</p>
9.41 試薬・試液 コロール酸, 薄層クロマトグラフィー用	183 右	↑ 9	<p>・・・アセトンに溶かし, 正確に 250mL とし試料溶液とする。この液につき, 薄層クロマトグラフィー (2.03) により試験を行う。試料溶液 10μL を薄層クロマトグラフィー用シリカゲルを用いて調製した薄層板にスポットする。次にクロホルム/アセトン/酢酸(100)混液(7:2:1)を展開溶媒として約 10cm 展開した後, 薄層板を風乾する。更に 120°C で 30 分間乾燥後, 直ちにリンモリブデン酸 n 水和物のエタノール(95)溶液(1\rightarrow5)を均等に噴霧し, 120°C で 2~3 分間加熱するとき, R_f 値約 0.1 の主スポット以外のスポットを認めない。</p>	<p>・・・アセトンに溶かし, 正確に 250mL とした液 10μL につき, 「ウルソデオキシコロール酸」の純度試験(4)を準用し, 試験を行うとき, R_f 値約 0.1 の主スポット以外のスポットを認めない。</p>

2. 医薬品各条

該当箇所	頁	行	正	誤
ピリドキシン塩酸塩	1098 左	↓ 18	炭酸ナトリウム _(99.5) の薄めたエタノール(9.5)(3 \rightarrow 10)溶液	炭酸ナトリウム _(99.5) の薄めたエタノール(3 \rightarrow 10)溶液