

## 【脳卒中】

### 〔急性期〕救急医療

機能	超急性期の脳卒中对応機能(t-PA静注療法施設基準を満たす)
目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 患者の来院後1時間以内(発症後4.5時間以内)に専門的な治療を開始すること</li> <li>● 廃用症候群や合併症の予防, 早期にセルフケアについて自立できるためのリハビリテーションを実施すること</li> </ul>
医療機関等に求められる事項	<p>○ 次に掲げる事項を含め, 該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療を実施していることが求められる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 血液検査や画像検査(X線検査, CT検査, MRI検査, 超音波検査)等の必要な検査が24時間実施可能であること</li> <li>② 脳卒中が疑われる患者に対して, 専門的診療が24時間実施可能であること</li> <li>③ 適応のある脳梗塞症例に対し, 来院後1時間以内(発症後4.5時間以内)に組織プラスミノゲン・アクチベータ(t-PA)の静脈内投与による血栓溶解療法が確実に実施可能であること</li> <li>④ 外科的治療が必要と判断した場合には来院後2時間以内の治療開始が可能であること</li> <li>⑤ 呼吸, 循環, 栄養等の全身管理, 及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対する診療が可能であること</li> <li>⑥ リスク管理のもとに早期座位・立位, 関節可動域訓練, 摂食・嚥下訓練, 言語聴覚療法, 装具を用いた早期歩行訓練, セルフケア訓練等のリハビリテーションが実施可能であること</li> <li>⑦ 回復期(あるいは維持期)の医療機関等と診療情報や治療計画を共有するなどして連携していること</li> <li>⑧ 回復期(あるいは維持期)に, 重度の後遺症等により自宅への退院が容易でない患者を受け入れる医療施設や介護施設等と連携し, その調整を行うこと</li> <li>⑨ 脳卒中疑いで救急搬送された患者について, その最終判断を救急隊に情報提供すること</li> </ol>

### 〔脳卒中:関係医療機関等一覧〕(急性期)

二次保健医療圏	市町名	施設種別	施設名
広島	広島市中区	病院	広島赤十字・原爆病院
		病院	翠清会 梶川病院
		病院	広島市立広島市民病院
	広島市南区	病院	広島大学病院
		病院	県立広島病院
	広島市西区	病院	荒木脳神経外科病院
	広島市安佐南区	病院	日比野病院
	広島市安佐北区	病院	広島市立安佐市民病院
広島市佐伯区	病院	五日市記念病院	
府中町	病院	マツダ株式会社マツダ病院	
広島西	廿日市市	病院	JA広島総合病院
呉	呉市	病院	独立行政法人労働者健康福祉機構 中国労災病院
		病院	国家公務員共済組合連合会 呉共済病院
広島中央	東広島市	病院	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター
尾三	三原市	病院	社会医療法人里仁会 興生総合病院
		病院	山田記念病院
	尾道市	病院	JA尾道総合病院
		病院	公立みつぎ総合病院
		病院	尾道市立市民病院
世羅町	病院	公立世羅中央病院	
福山・府中	福山市	病院	社会医療法人定和会 神原病院
		病院	福山市民病院
		病院	脳神経センター 大田記念病院
		病院	社会医療法人社団陽正会 寺岡記念病院
備北	三次市	病院	市立三次中央病院