

大竹市内における麻しん（はしか）患者の発生について

令和元年5月29日（水）に広島市に届出のあった麻しん患者の接触者の中で、5月31日（金）に発熱を訴えて受診した接触者について、本日6月1日（土）に検査を実施したところ、麻しんであることが確定しました。

次の公共交通機関を記載の日に利用された方は、麻しんに感染している可能性がありますので、広く情報提供するものです。

■麻しん患者との接触者が特定できていない公共交通機関（6月1日現在）

公共交通機関	利用便
向洋駅～大竹駅 (JR山陽線)	5月30日（木）、5月31日（金） 6時41分 向洋駅発 ⇒ 7時43分 大竹駅着
	5月30日（木） 18時28分 大竹駅発 ⇒ 19時22分 向洋駅着

※麻しん患者の利用日以外に当該公共交通機関を利用された場合は、感染のおそれはありません。

■県民の皆様へのお願い

○「麻しん」が疑われる場合には

- ・症状から「麻しん」が疑われる場合、必ず事前に医療機関に連絡の上、速やかに受診してください。
- ・受診の際は、周囲の方へ感染させないよう公共交通機関等の利用を避けてください。
- ・特に上記の公共交通機関を利用された方は注意してください。

麻しんの症状等

- ・初期症状は、発熱と咳、咽頭痛、鼻水、眼球結膜の充血、目やに等のカタル症状です。
- ・これらの症状が数日続いたあと、一旦体温は下がったかのように見えますが、すぐに高熱となり、体に赤い発疹が出始めて全身に広がります。
- ・感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力は非常に強いと言われています。
- ・麻しんにかかったことがある方は、感染の心配はありません。
- ・麻しん含有ワクチンを1才以上で2回接種したことのある方は、発症の可能性は極めて低いです。

1 患者の概要

年齢・性別 20歳代 男性
住所 大竹市内
発症日 令和元年5月31日（発熱）
診断日 令和元年6月1日
症状 発熱
予防接種歴 不明

2 医療機関の皆様へ

- ・発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、麻しんの予防接種歴の確認等、麻しんの発生を意識した診療をお願いします。
- ・患者（疑い含む。）は、個室管理を行う等、麻しんの感染力の強さを踏まえた院内感染対策を実施してください。
- ・臨床症状等から麻しんと診断した場合には、速やかに保健所へ届け出てください。

お 願 い

報道機関各位におかれましては、感染症法に基づき、患者及び患者家族等について、本人等が特定されないことがないよう、格段の御配慮をお願いします。