

新型コロナ感染予防に関する母体チェックリスト					2020.4.13版
以下の質問にすべてチェックをつけてください。			●親族は、母親と2週間以内に濃厚接触した人とする		
			●濃厚接触とは、マスクをしない状態で2m以内で一定時間を過ごすこと		
●母親について					特記事項
1	分娩前後の37.5℃以上の発熱	あり	なし		発熱時期： / ~ / 最高体温 °C
2	分娩前後のその他症状	あり	なし		☐ 咳 ☐ 鼻水 ☐ 味覚・嗅覚異常 ☐ 倦怠感 ☐ その他
3	分娩前2週間以内の里帰り	はい	いいえ		場所
●母親または赤ちゃんとは濃厚接触した親族について（父親、祖父母、母父のきょうだい等、赤ちゃんの兄・姉など）					
4	分娩前後の37.5℃以上の発熱	あり	なし		どなたが： 発熱時期： / ~ / 最高体温 °C
5	分娩前後のその他症状	あり	なし		☐ 咳 ☐ 鼻水 ☐ 味覚・嗅覚異常 ☐ 倦怠感 ☐ その他
●母親または赤ちゃんとは濃厚接触した親族または知人について					
6	母親と分娩前2週間以内に濃厚接触した人が広島県以外の場所に行ったかどうか	はい	いいえ		どなたが： 場所： 時期 /
知人の場合、発熱等の症状（有・無）					
●新生児搬送チームが到着するまでに、上記の質問にご回答いただき、チームが到着した時点で渡してください。「あり」または「はい」が認められる場合は、感染ハイリスクとして接触感染予防策を講じて対応させていただきます。					
●質問3および6の地域のリスクについては、コロナ感染者多発地域等の情報を参考にして判断させていただきます。					
●周産期センター職員に感染者が発症した場合、センター業務が停止する可能性があるため、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。					
感染ハイリスク対応の対象		母親項目のうち2つ以上	1 + 2 2 + (3) 1 + (3) 1 + 2 + 3		
		親族項目のうち2つ以上	4 + 5 5 + (6) 4 + (6) 4 + 5 + 6		
			知人の6がはいの場合、知人の症状有りの場合		

なお、母親に 37.5℃以上の発熱と呼吸器症状があるなど、COVID19 を疑う症状や濃厚接触者に該当など貴院より保健センターと連携された場合は、新生児搬送先にも直ちにご連絡いただきますようお願いいたします。