



令和5年度 フェロモントラップ等調査結果

セジロウカ(予察灯)

1 調査結果

(1) グラフ



(2) 調査データ

地帯区分		中西部			南部		
設置場所		東広島市八本松原			呉市安浦町		
周辺作物		水稻			水稻		
月	半旬	本年	平年	前年	本年	平年	前年
5月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0.5	0
	3	0	0	0	0	0.1	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0
6月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0.2	0	0	0	0
	3	0	0.1	1	0	0	0
	4	0	0	0	0	1.5	0
	5	0	0	0	0	1.4	0
	6	1.0	0.4	0	1.0	1.6	1
7月	1	0	0.6	0	1.0	1.0	0
	2	1.0	0.2	0	6.0	0.6	0
	3	0	0.9	0	0	0.5	0
	4	0	0.1	0	3.0	2.8	1
	5	0	0.5	0	0	1.4	0
	6	0	1.0	0	0	2.1	0
8月	1	0	0.6	0	0	1.4	0
	2	2.0	1.2	0	0	1.1	0
	3	0	0.9	0	0	7.7	25
	4	0	2.8	0	0	16.6	13
	5	0	1.3	0	0	8.7	1
	6	0	3.0	0	0	23.7	9
9月	1	0	8.8	0	2.0	13.6	1
	2	0	2.7	0	0	5.0	0
	3	0	3.0	0	0	3.1	0
	4	0	0.7	0	0	6.0	0
	5	0	0.9	0	0	1.5	4
	6	0	0.7	0	0	2.7	1

※(中西部) 予察灯故障のため欠測

※(南部) 予察灯故障のため欠測(7/28~8/1)



※(南部) 欠測(8/18~8/23)

令和5年度 フェロモントラップ等調査結果

トビイロウンカ(予察灯)

1 調査結果

(1) グラフ



(2) 調査データ

地帯区分		中西部			南部		
設置場所		東広島市八本松原			呉市安浦町		
周辺作物		水稻			水稻		
月	半旬	本年	平年	前年	本年	平年	前年
5月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0
6月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0
7月	1	0	0	0	0	0.1	0
	2	0	0	0	0	1.3	0
	3	0	0	0	0	2.1	0
	4	0	0	0	0	0.2	0
	5	0	0	0	0	0.2	0
	6	0	0	0	0	0	0
8月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0.5	0
	3	0	0	0	0	0.5	0
	4	0	1	0	0	0.4	0
	5	0	0	0	0	1.8	0
	6	0	1.2	0	0	15.0	0
9月	1	0	20.6	0	0	49.6	0
	2	0	8.6	0	0	35.3	0
	3	0	4.4	0	0	19.4	0
	4	0	2.2	0	1.0	3.3	0
	5	0	0.5	0	1.0	1.6	1.0
	6	0	2.6	0	1.0	8.3	5.0

※(中西部) 予察灯故障のため欠測

※(南部) 予察灯故障のため欠測(7/28~8/1)

※(南部) 欠測(8/18~8/23)