「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和6年度　フェロモントラップ等調査結果

セジロウンカ（予察灯）

1　調査結果

（1）グラフ





（2）調査データ

地帯区分		中西部			南部			
設置場所		東広島市八本松原			呉市安浦町			
周辺作物		水稲			水稲			
月	半旬	本年	平年	前年	本年	平年	前年	
5月	1	0	0	0	0	0	0	
	2	0	0	0	0	0.5	0	
	3	0	0	0	0	0.1	0	
	4	0	0	0	0	0	0	
	5	0	0	0	0	0	0	
	6	0	0	0	1.0	0	0	
6月	1	0	0	0	0	0	0	
	2	0	0.2	0	0	0	0	
	3	0	0.1	1	0	0	0	
	4	0	0	0	2.0	1.5	0	
	5		0	0	49.0	1.4	0	※八本松6/21～6/25欠測
	6	14.0	0.4	0	24.0	1.6	1	
7月	1	20.0	0.6	0	25.0	1.0	0	
	2	4.0	0.2	0	0	0.6	0	
	3	16.0	0.9	0	54.0	0.5	0	
	4	10.0	0.1	0	10.0	2.8	1	
	5	9.0	0.5	0	3.0	1.4	0	
	6	3.0	1.0	0	1.0	2.1	0	※安浦町7/27～7/29欠測
8月	1	4.0	0.6	0	2.0	1.4	0	
	2	0	1.2	0	2.0	1.1	0	
	3	5.0	0.9	0	10.0	7.7	25	
	4	6.0	2.8	0	8.0	16.6	13	
	5	0	1.3	0	0	8.7	1	
	6	0	3.0	0	0	23.7	9	
9月	1	1.0	8.8	0	0	13.6	1	
	2	1.0	2.7	0	0	5.0	0	
	3	0	3.0	0	0	3.1	0	
	4	0	0.7	0	0	6.0	0	
	5	0	0.9	0	0	1.5	4	
	6	0	0.7	0	0	2.7	1	