

だいこん類 だいこん一般種の特性（50品種）

品種名	草姿	葉片の特性	葉色	根形	根長(cm)	根径(cm)	根色(上/下)	根の尻形	根の肉色	根重(g)	収穫日(月・日)	す入り	食味辛味成分	食味評価
うぐろ大根	中	普通	緑	短円筒	17.0	5.5	乳白	つまり	灰白	332	11・5	中	やや低い	中
笹木三月子・志和産	開	普通	濃緑	短円筒	26.5	14.7	首黄白/白	流れ	乳白	3,060	1・14	晩	中	中
美濃早生	開	普通	緑	先流れ	34.3	5.1	乳白	流れ	灰白	518	10・29	早	やや低い	優
A P L I L CROSS	開	普通	緑	ややつまり	37.2	6.5	乳白	つまり	乳白	990	11・5	晩	やや低い	中
美濃早生	開	普通	緑	先流れ	42.0	5.1	乳白	流れ	灰白	640	10・29	晩	やや低い	優
CHINA ROSE	立	普通	緑	円筒	18.0	7.3	赤	つまり	灰白	518	11・5	早	中	中
不明・台湾	中	普通	緑	中ぶくれ	23.8	9.4	青首/乳白	つまり	灰白	997	11・11	早	やや低い	中
通海 ト	開	全縁	緑	中ぶくれ	23.6	7.2	乳白	流れ	乳白	661	11・11	早	中	中
ト	開	全縁	緑	中ぶくれ	23.8	6.2	乳白	流れ	灰白	577	11・5	早	やや低い	優
不明	中	普通	緑	腰高～丸	12.0	11.1	青首/乳白	丸	灰白	722	11・11	晩	中	中
APRIL CROSS	中	全縁	緑	先流れ	43.8	6.4	乳白	流れ	乳白	1,081	11・5	晩	やや低い	中
GOURNAY	開	普通	緑	ややつまり	30.4	6.3	黒	流れ	灰白	683	11・11	早	やや高い	劣
WINTERREE TTICHT	開	普通	緑	円筒	22.8	7.5	黒	つまり	灰白	650	11・16	早	やや高い	劣
BOLA	中	普通	緑	腰高～丸	12.8	9.8	乳白	丸	灰白	582	11・5	早	中	中
不明	中	普通	緑	腰高～丸	11.4	9.6	青首/乳白	丸	乳白	591	11・11	早	やや低い	中
不明	開	普通	緑	中ぶくれ	22.4	9.6	青首/乳白	つまり	乳白	1,031	11・11	早	やや低い	中
紫大根	中	普通	緑	先流れ	32.5	5.2	首薄紫/乳白	流れ	灰白	485	10・29	早	中	中
岩国赤	中	普通	緑	中ぶくれ	17.6	10.2	濃赤	つまり	乳白	1,021	11・26	晩	やや低い	中
テヘラン・安藤	開	全縁	緑	先流れ	14.8	5.2	青首/乳白	流れ	灰白	188	10・21	早	やや低い	中
丸型春型大根	中	普通	緑	中ぶくれ	19.0	11.2	青首/乳白	つまり	灰白	1,285	12・6	晩	低い	優
博多四十日大根	中	普通	緑	ややつまり	33.0	4.9	乳白	つまり	乳白	581	11・5	中	やや高い	中
桜島大根	垂	普通	濃緑	腰高～丸	15.3	14.5	乳白	丸	灰白	1,370	12・24	晩	やや低い	優
走島（長）	中	普通	緑	円筒	39.8	11.9	首黄白/白	流れ	灰白	2,920	12・24	早	中	中
女山三月大根	垂	普通	濃緑	長円錐	34.8	6.9	紫	流れ	乳白	995	11・26	晩	やや低い	中
桜島大根	垂	普通	濃緑	腰高～丸	17.3	17.0	乳白	丸	灰白	2,520	12・24	中	やや低い	優
赤首大根	中	普通	緑	先流れ	38.4	6.7	淡赤/乳白	流れ	乳白	1,023	11・16	早	やや低い	優
打木源助大根	中	普通	緑	短円筒	27.4	10.4	青首/乳白	流れ	灰白	1,523	11・25	早	やや低い	中
花知らず早太り時無大根	立	普通	濃緑	長円錐	41.8	7.5	青首/乳白	流れ	乳白	1,330	12・6	晩	やや低い	中
三浦大根	中	普通	緑	中ぶくれ	30.4	8.9	乳白	尖り	灰白	1,315	12・6	晩	やや高い	中
吸込二年子大根	開	普通	緑	長円錐	35.3	7.6	乳白	流れ	乳白	1,053	12・6	晩	中	中
方領大根	中	普通	緑	長円錐	38.6	8.4	白	流れ	灰白	1,541	11・25	早	低い	優
和歌山大根	中	普通	緑	円筒	31.2	8.4	乳白	流れ	乳白	1,326	11・25	早	中	中
練馬大根	中	普通	緑	中ぶくれ	43.0	7.1	青首/乳白	流れ	乳白	1,292	11・25	晩	中	中
西町理想大根	中	普通	緑	先端近ふくれ	38.8	7.7	乳白	つまり	乳白	1,354	11・25	中	やや低い	中
青首宮重大長大根	中	普通	緑	先流れ	39.6	6.1	青首/乳白	流れ	灰白	934	11・19	早	やや低い	優
総太り宮重大根	中	普通	緑	先流れ	30.0	6.9	青首/乳白	流れ	灰白	811	11・19	早	やや低い	中
大丸聖護院大根	開	普通	緑	腰高～丸	11.0	13.7	青首/乳白	丸	灰白	1,239	11・26	早	やや低い	中
大蔵大根	開	普通	緑	円筒	37.3	7.5	乳白	つまり	灰白	1,512	11・25	早	やや低い	中
赤筋大根	中	普通	緑	先流れ	32.4	5.1	乳白/横縞赤	流れ	灰白	534	11・16	早	やや高い	中
黒葉美濃早生大根	開	普通	緑	先流れ	36.7	5.0	乳白	流れ	灰白	532	10・29	早	やや低い	優
白首長尻宮重大根	中	普通	緑	ややつまり	39.6	6.6	乳白	つまり	灰白	973	11・19	晩	やや低い	優
青長大根	開	普通	緑	円筒	19.6	6.0	緑/乳白	尖り	緑/灰白	482	11・16	早	やや低い	優
紅心大根	開	全縁	緑	腰高～丸	13.8	10.0	淡赤	丸	赤	783	12・6	晩	やや低い	優
寒地地だいこん	中	普通	緑	円筒	44.6	9.8	青首/乳白	つまり	灰白	2,617	12・6	晩	やや低い	中
しし	中	普通	緑	腰高～丸・短円筒	22.2	16.2	首黄白/白	つまり・丸	灰白	3,280	12・24	早	やや低い	中
笹木三月子	開	普通	緑	腰高～丸	26.0	12.7	首黄白/白	流れ	乳白	2,625	1・14	晩	中	中
改良四眞大梅花羅蔔	開	普通	緑	中ぶくれ	18.3	6.4	乳白	流れ	灰白	302	10・29	晩	やや低い	優
岩国赤大根	中	普通	緑	腰高～丸	11.8	11.1	鮮紅	丸	灰白	784	11・26	晩	やや低い	中
赤大根	開	普通	緑	先端近ふくれ	28.4	6.8	赤/淡赤	流れ	芯赤/周囲淡赤	747	11・26	早	中	中
五木赤大根	開	普通	緑	中ぶくれ	14.4	7.3	赤紫	つまり	芯赤/灰白	427	11・26	晩	やや低い	中

※は種日：9月14日

※食味方法：「ブルー大根」は生食とし、その他の品種は摺ったもので官能評価

※す入り調査は、大根の収穫期にす入りしていたものは「早」、収穫期より10日後にす入りしたものは「中」、す入りしていないものは「晩」とした