

だいこん類 辛味種の特性（25品種）

品種名	草姿	葉片の特性	葉色	根形	根長(cm)	根径(cm)	根色(上/下)	根の尻形	根の肉色	根重(g)	収穫日(月・日)	す入り	食味辛味成分	食味評価
青味だいこん・志和産	立	普通	緑	短円筒	32.0	3.9	緑/乳白	つまり	緑/灰白	371	11・15	晩	やや低い	中
野生大根・初神1	中	普通	緑	先流れ	18.8	5.1	乳白	流れ	灰白	267	11・30	晩	中	中
野生大根・恋が浜	開	普通	緑	先流れ	13.4	3.6	乳白	流れ	灰白	122	11・30	晩	中	中
野生大根・初神2	開	普通	緑	先流れ	22.0	6.3	乳白	流れ	灰白	457	11・30	晩	中	劣
信州地大根	中	普通	緑	先端近ふくれ	20.8	6.9	青首/乳白	つまり	灰白	587	11・30	早	やや高い	中
くろ丸君	中	普通	緑	腰高～丸	8.0	8.7	黒	丸	灰白	352	11・18	中	やや高い	中
くろ長君	中	全縁	緑	短円筒	19.3	5.5	黒	つまり	灰白	352	11・18	晩	中	中
辛味だいこん親田系	中	全縁	緑	腰高～丸	5.5	6.9	乳白	丸	灰白	173	11・15	晩	やや高い	中
辛味だいこん(村上NO6)	中	普通	緑	腰高～丸	11.3	9.1	乳白	丸	灰白	519	11・15	晩	中	中
親田系(広島農振C)	立	普通	緑	腰高～丸	6.4	8.5	乳白	丸	灰白	248	11・18	早	中	中
黒丸君(広島農振C)	立	普通	緑	腰高～丸	7.6	8.3	黒	丸	灰白	305	11・18	晩	中	中
だるま大根(広島農振C)	立	普通	緑	先端ふくれ	16.0	8.0	青首/乳白	つまり	灰白	586	11・15	早	中	中
辛味大根(村上系NO1)	中	普通	緑	先流れ	24.8	7.3	乳白	流れ	灰白	685	11・15	中	中	中
辛味大根(村上系NO2)	立	切葉	緑	短円筒	9.7	7.0	乳白	つまり	灰白	258	11・15	早	やや高い	中
辛味大根(村上系NO4)	中	普通	緑	腰高～丸	8.3	8.6	乳白	丸	灰白	380	11・15	晩	中	中
辛味大根(村上系NO5)	立	全縁	緑	腰高～丸	8.5	7.4	乳白	丸	乳白	236	11・15	晩	中	中
ねずみ大根	中	普通	緑	先端ふくれ	19.5	8.5	乳白	つまり	灰白	830	11・18	早	やや低い	中
信州地大根	中	普通	緑	先端近ふくれ	20.0	6.6	青首/乳白	つまり	灰白	530	11・30	晩	やや高い	中
牧地大根	立	普通	緑	先端ふくれ	13.8	5.6	乳白	つまり	灰白	292	11・18	晩	やや高い	中
切葉松本地大根	立	切葉	緑	先端近ふくれ	19.2	5.5	青首/乳白	つまり	灰白	360	11・18	早	中	中
あざきだいこん	中	普通	緑	先流れ	19.5	8.6	青首/乳白	流れ	乳白	836	11・30	晩	やや低い	中
ブルー大根	開	普通	緑	長円錐	19.3	5.9	赤紫	尖り	純白	225	10・29	早	高	中
ピリカリだいこん	中	普通	緑	長円錐	14.2	4.0	乳白	尖り	灰白	147	11・15	晩	やや高い	中
辛味だいこん	立	普通	緑	腰高～丸	11.0	8.6	緑/乳白	流れ	淡緑/灰白	434	11・18	晩	やや低い	中
ピリカリだいこん	中	普通	緑	長円錐	14.2	4.0	乳白	尖り	灰白	147	11・15	晩	やや高い	中
辛味だいこん	立	普通	緑	腰高～丸	11.0	8.6	緑/乳白	流れ	淡緑/灰白	434	11・18	晩	やや低い	中
紅おろし	中	普通	濃緑	中ぶくれ	16.5	7.6	赤	つまり	乳白	496	11・30	晩	やや低い	中

※は種日：9月14日

※食味方法：「ブルー大根」は生食とし、その他の品種は摺つたもので官能評価

※す入り調査は、大根の収穫期にす入りしていたものは「早」、収穫期より10日後にはす入りしたものは「中」、す入りしていないものは「晩」とした