

# 広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の インフルエンザの流行状況について


広島県西部保健所

広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の定点医療機関等におけるインフルエンザ患者数等の状況は、次のとおりです。  
(令和7年29週)

インフルエンザ定点医療機関において1週間に診断された患者数です。

(人)

期 間	西部保健所(大竹市・廿日市市)		広島県		全国	
	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり
7年29週(7/14~7/20)	0	0.00	7	0.07	1,146	0.30
7年28週(7/7~7/13)	1	0.20	12	0.13	956	0.25
7年27週(6/30~7/6)	1	0.20	11	0.12	1,095	0.28
7年26週(6/23~6/29)	0	0.00	20	0.21	1,023	0.27



※ 感染症発生動向調査に基づいて作成したものです。

## ○ インフルエンザの感染経路

【飛沫感染】 感染者の咳やくしゃみの「しぶき」を吸い込むなど

【接触感染】 汚染されたドアノブや机などに手が触れ、その手で口、鼻などに触れるなど

## ○ 感染拡大防止のための注意点

《 流水と石けんでこまめに手洗いをしましょう。》

外から帰ってきた時など、こまめに流水と石けんで手洗いを励行しましょう。

《 咳エチケットを守りましょう。》

咳やくしゃみの症状がある方は、咳エチケットを守りましょう。

《 予防接種を受けましょう。》

流行前に予防接種を受けましょう。ウイルスが侵入してきても、予防接種をしていれ

☆ 症状などからインフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

☆ 厚生労働省が、「インフルエンザQ&A」を作成していますので、参考にしてください。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/)