


「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果

セジロウンカ(予察灯)

1 調査結果

(1) グラフ



(2)調査データ

地帯区分		中西部			南部		
設置場所		東広島市八本松原			呉市安浦町		
周辺作物		水稻			水稻		
月	半旬	本年	平年	前年	本年	平年	前年
5月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0.5	0
	3	0	0	0	0	0.1	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0.1	1
6月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0.2	0	1.0	0	0
	3	0	0.1	0	1.0	0	0
	4	0	0	0	0	1.6	2
	5	4	0	0	1.0	6.2	49
	6	0	1.9	14	0	4.0	24
7月	1	0	2.5	20	0	3.2	25
	2	0	0.6	4	0	1.2	0
	3	1	2.2	16	0	5.9	54
	4	0	1.1	10	0	4.1	10
	5	0	1.4	9	0	1.7	3
	6	0	1.1	3	0	1.9	1
8月	1	0	1.0	4	2.0	0.8	2
	2	7	1.4	0	12.0	1.2	2
	3	1	1.2	5	7.0	7.9	10
	4	1	3.4	6	1.0	17.3	8
	5		1.3	0	3.0	2.4	0
	6		2.4	0		17.1	0
9月	1		8.2	1		5.3	0
	2		2.6	1		1.9	0
	3		3.0	0		2.7	0
	4		0.6	0		6.0	0
	5		0.9	0		1.4	0
	6		0.7	0		2.7	0


呉市5/23-25欠測

呉市6/24-25欠測

東広島市7/8-10欠測

「広島県病害虫発生予察調査データ」
令和7年度 フェロモントラップ等調査結果
トビイロウンカ(予察灯)

1 調査結果
(1) グラフ



(2)調査データ

地帯区分		中西部			南部		
設置場所		東広島市八本松原			呉市安浦町		
周辺作物		水稻			水稻		
月	半旬	本年	平年	前年	本年	平年	前年
5月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0
6月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0.1	1.0
	6	0	0	0	0	0	0
7月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	1.0	1.2	0
	3	0	0	0	0	2.2	1.0
	4	0	0	0	0	0.2	0
	5	0	0	0	0	0.2	0
	6	0	0	1.0	0	0	0
8月	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0.5	0
	3	0	0	0	1.0	0.5	0
	4	0	1	0	0	0.4	0
	5		0	0	0	0.4	0
	6		1.1	0		10.1	0
9月	1		19.9	0		46.7	0
	2		8.5	0		22.9	0
	3		4.4	0		14.9	0
	4		2.2	1.0		2.8	0
	5		0.5	0		0.8	0
	6		2.6	0		8.0	0

呉市5/23-25欠測

呉市6/24-25欠測

東広島市7/8-10欠測