





令和7年度 フェロモントラップ調査結果(シロイチモジヨトウ)

※調査データはグラフの下にあります。





調査データ

地帯区分		中東部			中東部			北西部			南西部		
設置場所		三次市三和町			世羅郡世羅町山中福田			安芸高田市高宮町			東広島市安芸津町		
周辺作物		アスパラガス			ねぎ			ねぎ			ばれいしょ		
月	半旬	本年	平均(7年)	前年	本年	平均(1年)	前年	本年	平均(4年)	前年	本年	平均(0年)	前年
5月	1	0	0.2	0	3.0	0	0	0.8	4.9	0	1.3	—	—
	2	0	0.3	0.4	3.0	0	0	2.3	2.7	0.7	1.0	—	—
	3	0	1.6	0.7	3.0	0	0	2.3	3.1	1.6	0.7	—	—
	4	1.4	2.4	0.7	3.0	0	0	0	9.8	1.4	2.1	—	—
	5	0.3	3.1	3.6	1.2	0	0	3.3	18.3	1.6	2.1	—	—
	6	0	2.5	3.9	1.7	0.8	0.8	0.7	13.8	0.7	3.1	—	—
6月	1	0	3.0	2.1	5.9	0.2	0.2	0	3.6	0	3.6	—	—
	2	4.7	2.9	2.1	11.5	0	0	0	5.3	0	3.6	—	—
	3	16.3	3.2	3.3	12.4	0	0	0	7.7	2.9	6.6	—	—
	4	7.0	3.8	4.7	11.5	1.7	1.7	0.6	7.5	7.5	8.0	—	—
	5	22.7	5.7	6.4	8.9	2.6	2.6	1.4	13.3	10.6	5.7	—	—
	6	3.6	6.4	6.4	4.3	1.4	1.4	0	13.4	6.1	5.1	—	—
7月	1	1.9	6.5	5.1	5.4	4.3	4.3	0	14.2	0.6	4.4	—	—
	2	1.9	6.1	4.4	4.9	4.4	4.4	0	17.6	6.3	3.6	—	—
	3	2.5	6.9	5.0	3.6	3.6	3.6	0	25.5	7.7	6.4	—	—
	4	1.2	6.2	3.7	3.8	1.4	1.4	0.1	29.6	4.3	3.0	—	—
	5	2.0	7.6	3.3	4.8	1.0	1.0	0.7	35.2	5.0	0.9	—	—
	6	2.3	8.1	6.3	7.5	4.6	4.6	0.9	20.7	5.4	1.7	—	—
8月	1	3.0	8.0	6.4	13.3	10.0	10.0	0.7	16.7	6.9	0.7	—	—
	2	25.6	8.7	1.9	15.8	4.3	4.3	10.9	17.4	10.3	20.0	—	—
	3	22.0	8.9	3.0	11.9	2.6	2.6		17.4	8.1	28.0	—	—
	4	15.0	9.9	6.4		7.3	7.3		23.8	6.6	8.6	—	—
	5	8.6	10.6	2.9		30.7	30.7		20.9	5.6		—	—
	6		20.8	8.6		34.0	34.0		42.8	41.1		—	—
9月	1		25.8	9.6		24.4	24.4		37.3	18.9		—	—
	2		11.6	10.0		21.0	21.0		30.9	15.7		—	—
	3		11.2	8.9		16.4	16.4		27.7	14.2		—	—
	4		16.8	10.6		24.4	24.4		27.3	4.3		—	—
	5		13.3	13.6		19.1	19.1		38.5	17.4		—	—
	6		13.3	9.4		8.1	8.1		57.1	16.7		—	—
10月	1		10.5	8.2		7.3	7.3		40.5	10.7		—	—
	2		9.5	6.4		6.3	6.3		26.4	6.3		—	—
	3		4.1	12.1		5.0	5.0		28.7	4.6		—	—
	4		2.9	11.5		9.3	9.3		33.1	2.1		—	—
	5		1.6	4.8		5.9	5.9		32.6	0.8		—	—
	6		0.7	0.6		2.9	2.9		34.0	0.2		—	—