| _ | | To the de Salar | and ton | | | | | I de de Maria de | | | | (2024 | 年度 |
|----|--|-----------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|------------|------|-------|----|
| _ | 系名 | 広島湾 | | A =m | | | | 広島湾西部 | ⊓ ∧ ∻m | | | | |
| _ | 定機関 | 広島県5 | | | | | | 広島県環境伊 | | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | 3100000 広島湾 | | 3-01) | | | | 31000008(6 広島湾西部8 | | | | | |
| - | た地点や OD等に係るあてはめ水域名 | 大竹·岩 | | た海域 | | | | 大竹•岩国地 | | | | | |
| _ | DD等に係る環境基準類型 | ※ A □ | | LIMPON | | | | ※ A □ | 761 14 *** | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | 大竹·岩 | | 上海域 | | | | 大竹·岩国地 | 先海域 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | Ж П | | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 | Į | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 | Į. | | | | (1.17) | | | | | | | |
| 刮巾 | 查名 | 平均 | ta . | 年間調 | 企 上僧 | | / | 平均 | _ | 間調査 中 ~ | | | / |
| | 測定項目 単位 流量 m3/ | | ×) | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 十均 | 最小 | | 最大 | m/ | 11 |
| | pH | 8.1 | 1 | 7.9 | ~ | 8.3 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.3 | 0 / | 12 |
| | DO mg/ | _ | | 5.5* | ~ | 10 | 4 / 12 | 7.7 | 5.3* | ~ | 9.7 | 4 / | 12 |
| | BOD mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | COD mg/ | | | 1.5 | \sim | 4.2* | 9 / 12 | 2.7* | 1.7 | \sim | 4.1* | 9 / | 12 |
| - | (75%值) mg/ | | *) | | | | | (2.7*) | | | | | |
| 般項 | SS mg/s | - | | 74 | | 0 | 0 / 10 | - | | | | | |
| 目 | 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg/ | | | <1 <0.5 | ~ | 3 <0.5 | 0 / 12 | | | | | | |
| | n-ハキザン抽口物負_油分等 mg/. 全窒素 mg/. | _ | | 0.11 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.28 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 主 至 条 | | | 0.010 | ~ | 0.28 | 1 / 12 | | | | | | |
| | 全亜鉛 mg/ | | | -1010 | | | - / 12 | | | | | | |
| | ノニルフェノール mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | LAS mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg/ | - | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg/砒素 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | PCB mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg/ | _ | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg/ | - | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| 健 | シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1 1/// 1118/ | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン mg/ トリクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| 目 | テトラクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ mg/ | _ | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | セレン mg/ | | | - | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg/ 亜硝酸性窒素 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 mg/ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ | | 4 | <0.01 | ~ | 0.06 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 明版性至素及び亜明版性至素 111g/ ふっ素 mg/ | _ | - | \0.01 | | 0.00 | 0 / 4 | | | | | | |
| | ほう素 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン mg/ | | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 mg/ | _ | | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 mg/ | - | | | | | | | | | | | |
| 項目 | マンガン_溶解性 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| - | クロム mg/ | | | | | | | - | | | | | |
| | 塩素イオン mg/ 有機態窒素 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 mg/ アンモニア態窒素 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | TOC mg/ | | | | | | | | | | | | |
| そ | クロロフィルa mg/n | | | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 μ S/e | | | | | | | | | • | | | • |
| 項 | メチレンブルー活性物質 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 度 | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg/ | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール mg// アニリン mg// | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg/. 2, 4-ジクロロフェノール mg/. | | | | | | | | | | | | |
| | こ、4-29日ロフェノール mg/.ふん便性大腸菌群数 個/100 | | | | | | | | | | | | |
| | 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境1 | _ | r > 1. ≠. | <u> </u> | | | | 1 | 1 | | | | |

| | | | 1 0 10 1 | | | | | 1.0.1 | | | | (2024 年度) |
|----------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------|--------|------|--------|------------------|------------|--------|--------|-----------|
| Ognat - | 系名 | [| 広島湾西部 | <u></u> | | | | 広島湾西部 | 1.0# | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 31000008 (613 | | | | | 広島県環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | | 3-01) | | | | 31000008 (61 | .3-01) | | | |
| | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾西部8 大竹·岩国地先 | :海城 | | | | 広島湾西部8 大竹·岩国地 | 上海城 | | | |
| | D等に係るのではの小域名 | | 人们 *石国地元 ※ A □ | 11円4以 | | | | 人们•石国地: ※ A □ | /山1丹/以 | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 大竹·岩国地先 | -海域 | | | | 大竹·岩国地 | 先海域 | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | <u>※</u> Ⅱ イ | 114-94 | | | | ※ Ⅱ イ | /L114-9A | | | |
| _ | E生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | <i>7</i> 4. 1 | | | | | | | | | |
| _ | 生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準数 | 類型 | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | | |
| 水生 | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準数 | 類型 | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間 | 調査下 | 層 | | | 年間 | 調査 슄 | 2層 | |
| _ | | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| 1 F | | 13/S | | | | | | | | | | |
| 1 F | pH | - | 8.0 | 7.8 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.8 | ~ | 8.3 | 0 / 36 |
| | | ng/L | 6.6* | 2.9* | ~ | 8.5 | 6 / 12 | 7.3* | 2.9* | ~ | 10 | 14 / 36 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | 2.0 | 1.4 | ~ | 2.3* | 6 / 12 | 2.4* | 1.4 | ~ | 4.2* | 24 / 36 |
| | | ig/L ig/L | (2.2*) | 1.4 | . ~ | 4.0* | 0 / 12 | (2.5*) | 1.4 | | 4.4 | 24 / 30 |
| 1 + | | ig/L ig/L | (4.4.7) | | | | | (4.0*) | | | | |
| /2/ | | J/100mL | | | | | | 1 | <1 | ~ | 3 | 0 / 12 |
| | - 1.335 <u></u> 291 | ıg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 |
| 1 1 | | ıg/L | | | | | | 0.19 | 0.11 | ~ | 0.28 | 0 / 12 |
| 1 F | | ng/L | | | | | | 0.022 | 0.010 | ~ | 0.040* | 1 / 12 |
| | 全亜鉛 m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | - | | | | | | | |
| 1 + | | ng/L | | | | | | | | | | |
| - | | ng/L | 3.8 | 3.8 | ~ | 3.8 | 0 / 1 | 3.8 | 3.8 | ~ | 3.8 | 0 / 1 |
| 1 F | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 H | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 F | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 F | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 1 F | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 1 F | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 1 + | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 + | | ig/L ig/L | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 1 + | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| District | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン m | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム m | ıg/L | | | | | | | | | | |
| [| | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 + | | ng/L | | | | | | 0.04 | /0.01 | ~ | 0.06 | 0 / 2 |
| 1 + | | ng/L ng/L | | | | | | 0.04 | <0.01 | ~ | 0.06 | 0 / 2 |
| 1 F | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 L | | ig/L ig/L | | | | | | | | | | |
| | | ig/L ig/L | | | | | | | | | | 1 |
| 114 | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| - | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 1 F | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 m | ıg/L | | | | | | | | | | |
| 1 4 | 燐酸態燐 m | ng/L | | | | | | | | | | |
| I | TOC m | ng/L | | | | | | | | | | |
| n | | g/m3 | | | | | | | | | | |
| 他 | | S/cm | | | | | | | | | | 1 |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | 度 | | | | | | | | | | |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| I + | | ıg/L | | | | | | | | | | 1 |
| 1 L | | ng/L | | | | | | | | | | 1 |
| 1 F | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 個/ | /100mL | | | | | 1 | i | 1 | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------|--------|-----------------|-----|--------|------|-----------|
| _ | 系名 | | 広島湾西部 | A | | | | 広島湾西部 | | | | |
| | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境係 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 31000013(61 広島湾西部13 | | | | | 31000013 (6) | | | | |
| | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | |) | | | | 広島湾西部1 広島湾西部 | ა | | | |
| | DD等に係るのではの小城名 DD等に係る環境基準類型 | | 広島湾西部 A イ | | | | | ム局偽四部 A イ | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾西部 | | | | | 広島湾西部 | | | | |
| | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | □イ | | | | | □ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | H *1 | | | | | H *1 | | | | |
| _ | 上生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 美類型 | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| _ | 查名 | | | 年間調査 | 生 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | 7層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 2.4* | 1.3 | \sim | 4.1* | 7 / 12 | 2.5* | 1.5 | \sim | 4.1* | 7 / 12 |
| | | mg/L | (2.7*) | | | | | (2.7*) | | | | |
| 般恆 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月日 | 大腸菌数 | FU/100mL | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 0.00 | /0.01 | | 0.07 | 0 / 0 | | | | | |
| | | mg/L | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.07 | 0 / 6 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| - | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 特殊 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | マンガン 溶解性 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| H | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.01 | - / 6 | | | | | |
| | | mg/L | 0.008 | <0.003 | ~ | 0.020 | - / 6 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | | ng/m3 | 3.2 | 1.4 | ~ | 7.9 | - / 6 | | | | | |
| の | | μS/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | · | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | · | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | 圖/100mL | | | | | | | | | | |
| | ふん使性大腸歯群数 備考:環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | 生 上 ポナファしナ | | | | | | 1 | | | 1 |

| | | | <u> </u> | | | <i>V</i> , <i>y C y</i> | TH 214 119 | | | | | (2024 | 4 年度) |
|-----------|---|------------------|-------------------------|-----|--------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|--------|------------|-------|-------|
| _ | 系名 | | 広島湾西部 | A | | | | 広島湾西部 | | | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 31000013 (61- | | | | | 広島県環境係 31000013(6) | | | | | |
| _ | 定地点备号 定地点名 | | 31000013(61 広島湾西部13 | | | | | | | | | | |
| _ | _{足地思名} DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾西部13 |) | | | | 広島湾西部1 広島湾西部 | 3 | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | A d | | | | | Aイ | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾西部 | | | | | 広島湾西部 | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II 1 | | | | | II 1 | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | | |
| 水生 | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間 | 間調査] | · 層 | | | 年間 | 調査 全 | <u>:</u> 層 | | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m | /n |
| | | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | рН | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.0 | | | 0.7. | F / 10 | 0.04 | 1.0 | | 4.1. | 10 | / 00 |
| | | mg/L | 1.9 | 1.4 | ~ | 2.7* | 5 / 12 | 2.3* | 1.3 | ~ | 4.1* | 19 | / 36 |
| — jint | | mg/L mg/L | (2.1*) | | | | | (2.4*) | | | | | |
| 般項 | | Mg/L FU/100mL | | | | | | | | | | | |
| Î | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 5.9 | 3.0 | ~ | 8.7 | 0 / 6 | 5.9 | 3.0 | ~ | 8.7 | 0 | / 6 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン r | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 n | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 n | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Н | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.07 | 0 . | / 6 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| _ | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 殊佰 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Ë | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.01 | - | / 6 |
| | | mg/L | | | | | | 0.008 | <0.003 | ~ | 0.020 | _ | / 6 |
| | | ng/L | | | | | | 0.000 | \0.003 | | 0.020 | | , 0 |
| そ | | ng/m3 | | | | | | 3.2 | 1.4 | ~ | 7.9 | - | / 6 |
| の | | ι S/cm | | | | | | 310 | | | | | |
| 他項 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| L | | 100mL | | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 音其治 | 隹占であることを | 示す | | | | | | | | | |

| | | | | - 1 | | 店 未 総 | | | | | (2024 年度) |
|------|---|-----------------------|--------|--------|-------|--------|----------------------|------|-------|------|-----------|
| | 系名 | 広島湾西部 | | | | | 広島湾西部 | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | 広島県環境係 31000018(6) | | | | | 広島県環境係 31000018(6 | | | | |
| _ | 定地点名 定地点名 | 広島湾西部1 | | | | | 広島湾西部1 | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | 広島湾西部 | | | | | 広島湾西部 | | | | |
| C | DD等に係る環境基準類型 | ※ A イ | | | | | ※ A イ | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | 広島湾西部 | | | | | 広島湾西部 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類! | d I | | | | | | | | | |
| _ | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | 年間調 | 査 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | 7層 | |
| | 測定項目 単化 | | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 m3/ pH | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.3 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.3 | 0 / 12 |
| | DO mg/ | | 5.8* | ~ | 10 | 5 / 12 | 7.7 | 5.7* | ~ | 10 | 4 / 12 |
| | BOD mg/ | | 0.0 | | 10 | 0 / 12 | | 011 | | - 10 | 1 / 12 |
| | (75%値) mg/ | L | | | | | | | | | |
| | COD mg/ | | 1.3 | ~ | 3.7* | 6 / 12 | 2.3* | 1.6 | ~ | 3.7* | 6 / 12 |
| | (75%値) mg/ | | | | | | (2.3*) | | | | |
| 般項 | SS mg/ 大腸菌数 CFU/10 | | <1 | ~ | 1 | 0 / 12 | | 1 | | | |
| 目 | 入勝函数 CFU/III n−ヘキサン抽出物質_油分等 mg/ | | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | + | | | + |
| | 全窒素 mg/ | | 0.11 | ~ | 0.21 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全燐 mg/ | | 0.013 | ~ | 0.028 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 mg/ | | | | · | | | | | · | |
| | ノニルフェノール mg/ | | | | | | | 1 | | | |
| | LAS mg/ 底層溶存酸素量 mg/ | | | | | | | 1 | | | |
| | 皮膚俗仔販系里 mg/ カドミウム mg/ | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg/ | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg/ アルキル水銀 mg/ | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 mg/ PCB mg/ | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | |
| 健 | シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ 1,1,1-トリクロロエタン mg/ | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1-トリクロロエタン mg/ 1,1,2-トリクロロエタン mg/ | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | |
| П | テトラクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg/ | L | | | | | | | | | |
| | チウラム mg/ | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg/ | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ mg/ ベンゼン mg/ | | | | | | | - | | | |
| | セレン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 mg/ | L | | - | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ | | <0.01 | ~ | 0.06 | 0 / 6 | | | | | |
| | ふっ素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | ほう素 mg/ 1,4-ジオキサン mg/ | | | | | | | 1 | | | |
| p-+- | 1,4-シオキザン mg/ 銅 mg/ | | | | | | | + | | | + |
| 特殊 | 鉄_溶解性 mg/ | | | | | | | 1 | | | |
| 項 | マンガン_溶解性 mg/ | | | | | | | | | | |
| 目 | クロム mg/ | L | | | · | | | | | | |
| | 塩素イオン mg/ | | | | | | | 1 | | | |
| | 有機態窒素 mg/ アンモニア態窒素 mg/ | | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 | | 1 | | | |
| | グマモノ 態 至系 mg/ 燐酸態燐 mg/ | | <0.01 | ~ | 0.016 | - / 6 | | + | | | + |
| | TOC mg/ | | .0.003 | | 0.010 | , 0 | | | | | |
| そ | クロロフィルa mg/1 | | 1.0 | ~ | 6.0 | - / 12 | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 μ S/ | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 mg/ | L | | | | | | 1 | | | |
| 目 | 濁度 度 トリハロメタン作成能 mg/ | 1 | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg/ 4-t-オクチルフェノール mg/ | | | | | | | + | | | |
| | アニリン mg/ mg/ | | | | | | | 1 | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg/ | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 個/100 | | | | | | | | | | |

| | | | | | 、貝 | | | | | | | (2024 年度) |
|-------|-------------------------------|--------------|----------------|------|--------|------|--------|----------------|--------|--------|------------|-----------|
| | 系名 | | 広島湾西部 | A ≃m | | | | 広島湾西部 | 1 A =m | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 31000018 (614 | | | | | 31000018 (61 | | | | |
| | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾西部18 | 3 | | | | 広島湾西部1 | 8 | | | |
| | DD等に係るめてはめ水域名 DD等に係る環境基準類型 | | 広島湾西部 ※ A イ | | | | | 広島湾西部 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾西部 | | | | | ※ A イ 広島湾西部 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ II イ | | | | | ※ II イ | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | % 11 / | | | | | ※ Ⅱ ↑ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | <u></u> | ., | | 年間 | 調査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 全 | <u>·</u> 層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 n | n3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.3 | 0 / 36 |
| | DO n | ng/L | 7.3* | 5.6* | \sim | 9.5 | 6 / 12 | 7.5 | 5.6* | \sim | 10 | 15 / 36 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | (75%值) n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.9 | 1.4 | \sim | 2.6* | 2 / 12 | 2.1* | 1.3 | \sim | 3.7* | 14 / 36 |
| 1- | | ng/L | (2.0*) | | | | | (2.3*) | | | | |
| 般 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | > <100 pm 500 | U/100mL | | | | | | 1 | <1 | ~ | 1 (0.5 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 |
| 1 | | ng/L | | | | | | 0.15 | 0.11 | ~ | 0.21 | 0 / 12 |
| 1 | | ng/L | | | | | | 0.019 | 0.013 | ~ | 0.028 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | 6.7 | 2.7 | ~ | 8.6 | 0 / 12 | 6.7 | 2.7 | ~ | 8.6 | 0 / 12 |
| H | | ng/L ng/L | 0.1 | 4.1 | . ~ | 0.0 | 0 / 12 | 0.1 | 4.1 | . ~ | 0.0 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| facts | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | + |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.06 | 0 / 6 |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | | ng/L | | | | · | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 |
| 1 | | ng/L | | | | | | 0.006 | <0.003 | ~ | 0.016 | - / 6 |
| そ | | ng/L | | | | | | 0.4 | 1.0 | | 6.0 | / 10 |
| の | | ig/m3 | | | | | | 2.4 | 1.0 | ~ | 6.0 | - / 12 |
| 他 | | S/cm | | | | | | | | | | |
| 項目 | 濁度 n | ng/L 度 | | | | | | | | | | |
| Ħ | | 度 ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | /100mL | | | | | | | | | | |
| _ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | 単上 ぶもファしナ | ニナ | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| | | | | | - 1 | | | | | | | (2024 年度) |
|----|--|--------------|----------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|---------|--------|------|-----------|
| | 系名 宗松 即 | | 広島湾西部 | △ ## | | | | 広島湾西部 | 1 / 497 | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 31000021 (61 | | | | | 31000021(6 | | | | |
| | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾西部21 | L | | | | 広島湾西部2 広島湾西部 | 1 | | | |
| | DD等に係るめてはの水域名 DD等に係る環境基準類型 | | 広島湾西部 ※ A イ | | | | | 広島湾四部 ※ A イ | | | | |
| | DD寺に徐る環境基準類型 窒素・全燐に係る水域名 | | ※ A イ 広島湾西部 | | | | | ※ A イ 広島湾西部 | | | | |
| | 室素・全燐に保る環境基準類型 | | 広局待四部 ※ Ⅱ イ | | | | | 広局得四部 ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | <u>室系・王牌に床る</u> 環境基準頻至 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | ※ II イ 広島湾西部(ロ | 2) | | | | ※ II イ 広島湾西部(| 12) | | | |
| _ | 主生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 進類型 | ※ 生物特A | | | | | ※ 生物特A | | | | |
| _ | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る2 | | ▼ TAN1414 | | | | | ₩ T-101414 | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| | 查名 | | | 年間調査 | 上層 | (表層) | | | 年間 | 調査中 | '層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.4* | 1 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.4* | 1 / 12 |
| | DO | mg/L | 7.3* | 5.6* | \sim | 9.5 | 5 / 12 | 7.4* | 5.6* | \sim | 8.9 | 5 / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.3* | 1.4 | \sim | 4.3* | 6 / 12 | 2.4* | 1.6 | \sim | 4.3* | 7 / 12 |
| - | (75%値) | mg/L | (2.5*) | | | | | (2.4*) | | | | |
| 般恆 | SS | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | 1 | <1 | \sim | 1 (0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.16 0.021 | 0.11 | ~ | 0.25 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | | 0.012 | ~ | 0.035* | 1 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 ノニルフェノール | mg/L mg/L | 0.002 | 0.001 | ~ | 0.003 | 0 / 4 | | | | | |
| | LAS | | <0.00006 <0.0006 | <0.00006 <0.0006 | \sim | <0.00006 <0.0006 | 0 / 4 | | | | | |
| | LAS 底層溶存酸素量 | mg/L | \0.0000 | \U.UUU6 | ~ | \0.0006 | U / 4 | - | | | | |
| - | 広暦俗仔眩系重 カドミウム | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.07 | 0 / 6 | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | - | | | | |
| - | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | - | | | | |
| 特 | 銅 か4- ※24.67.44- | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| - | 塩素イオン | mg/L mg/L | | | | | | - | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | 0.007 | <0.003 | ~ | 0.016 | - / 6 | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | , 0 | | | | | |
| そ | - | mg/m3 | 3.2 | 1.1 | ~ | 6.5 | - / 12 | | | | | |
| の | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | , 12 | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| [| トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | İ | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | İ | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | İ | | | | |
| | | 個/100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の野 | 告告 主治 | 生占でなること | テナ | | | | | • | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------|--------|-------|--------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-----------|
| - | 系名 | | 広島湾西部 | A am | | | | 広島湾西部 | A am | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 31000021(61- | | | | | 広島県環境保 31000021(61 | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 広島湾西部21 | | | | | 広島湾西部2 | | | | |
| - | DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾西部21 | - | | | | 広島湾西部2 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ж A Л | | | | | ж A 1 | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 広島湾西部 | | | | | 広島湾西部 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 広島湾西部(口 | 1) | | | | 広島湾西部(ロ | 1) | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | ※ 生物特A | | | | | ※ 生物特A | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水均 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| 誹 | 査名 | V/ / I. | | | 調査ヿ | | , | TI LA | | 調査 全 | | , |
| _ | | 単位 13/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | pH | 15/ 5 | 8.0 | 7.9 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.4* | 2 / 36 |
| | • | ng/L | 6.7* | 4.7* | ~ | 8.3 | 8 / 12 | 7.1* | 4.7* | ~ | 9.5 | 18 / 36 |
| | | ng/L | | 211 | | 0.0 | 0 / 12 | | 2,11 | | 0.0 | 10 / 00 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.7 | 1.2 | \sim | 2.1* | 1 / 12 | 2.1* | 1.2 | \sim | 4.3* | 14 / 36 |
| _ | | ng/L | (1.8*) | | | | | (2.2*) | | | | |
| 般 | SS m | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | y 1400 pa yy 1 | U/100mL | | | | | | 1 | <1 | ~ | 1 | 0 / 12 |
| П | 11一ペイリン抽山初貝_加刀寺 | ng/L | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | 0 / 10 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 |
| | | ng/L | 0.13 0.022 | 0.10 | ~ | 0.18 | 0 / 12 | 0.15 | 0.10 | ~ | 0.25 | 0 / 24 |
| 1 | | ng/L | 0.022 | 0.016 | ~ | 0.030 | 0 / 12 | 0.022 0.002 | 0.012 | ~ | 0.035* | 1 / 24 |
| | | ng/L ng/L | | | | | | <0.0006 | <0.0001 | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | <0.0006 | 0 / 4 |
| | | ng/L | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | ~ | <0.0006 | 0 / 4 |
| | | ng/L | 6.7 | 4.2 | ~ | 8.7 | 0 / 12 | 6.7 | 4.2 | ~ | 8.7 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | , 12 | | | | | , 15 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 1 1 1 1 | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | 1 | ıg/L ıg/L | | | | | | | | | | |
| | • | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム m | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | : | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ig/L ig/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.07 | 0 / 6 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | ng/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 m | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| П |) LA | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 |
| 1 | | ig/L ig/L | | | | | | 0.007 | <0.003 | ~ | 0.016 | - / 6 |
| | | ng/L | | | | | | | | | 0.010 | , 3 |
| | クロロフィルa mg | g/m3 | | | | | | 3.2 | 1.1 | ~ | 6.5 | - / 12 |
| の | | S/cm | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 他項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | ふん便性大腸菌群数 個/ 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | /100mL | <u></u> | | | | | <u> </u> | | | | 1 |

| | | | A A /// | | | <i>04 /C /</i> | 717 119 | | | | | (2024 年度) |
|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|--------|----------------|---------|-----------------------|--------|--------|------|-----------|
| _ | 系名 | | 広島湾西部 | A am | | | | 広島湾西部 | 1 A 4m | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 31000027(61 | | | | | 広島県環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 広島湾西部2° | | | | | 31000027(6) 広島湾西部2 | | | | |
| _ | た地ボー DD等に係るあてはめ水域名 | | 大竹港(2) | <u>'</u> | | | | 大竹港(2) | 1 | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | ※ B □ | | | | | ※ B □ | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 大竹·岩国地名 | た海域 | | | | 大竹·岩国地 | 先海域 | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II イ | | | | | II イ | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 査名 | 類型 | | 年間調 | 木 L.豆 | (丰屋) | | | 左目 | 引調査 中 | · 🖂 | |
| р/п | | 単位 | 平均 | 最小 | ■ 上層 | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | 1 | 最大 | m/n |
| | | n3/S | 1 **3 | 对义/1. | | 叔八 | 111/11 | 1 **5 | 政/1. | | 双八 | 111/11 |
| | pH | | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.3 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.3 | 0 / 12 |
| | DO n | ng/L | 7.5 | 5.2 | ~ | 9.9 | 0 / 12 | 7.6 | 5.0 | ~ | 10 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 2.6 | 1.2 | \sim | 4.1* | 3 / 12 | 2.6 | 1.5 | \sim | 4.1* | 3 / 12 |
| <u></u> | | ng/L | (2.9*) | | | | | (2.8*) | 1 | | | |
| 般項 | | ng/L U/100mL | 2 | <1 | ~ | 9 | 0 / 12 | | + | | | |
| 目 | | ng/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | + | | | |
| | | ng/L | 0.23 | 0.16 | ~ | 0.37* | 1 / 12 | | | | | |
| | | ng/L | 0.022 | 0.012 | ~ | 0.044* | 2 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | - | | |
| | | ng/L | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| _ | | ng/L | | | | | | | 1 | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | <u>対</u> 六価クロム n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| , | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | - | | | | | 1 | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | + | | | |
| | | ng/L | | | | | | | + | | | |
| | | ng/L | 0.04 | <0.01 | ~ | 0.06 | 0 / 2 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | 1 | | | |
| | ほう素 n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | ng/L | | | | | | | 1 | | | |
| 殊佰 | | ng/L | | | | | | | 1 | | | |
| 月日 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| H | | ng/L ng/L | | | | | | | 1 | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 n | ng/L | | | | | | | 1 | | | |
| | TOC n | ng/L | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa m. | ıg/m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | | S/cm | | | | | | - | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | 度 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | + | | | |
| | | ng/L | | | | | | | 1 | | | |
| | | /100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環: | | L 隹占であることを | 示す | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| 測定地点番号 31000027 (612-01) 3100002 (612-01) 測定地点名 広島湾西部27 広島湾 (502) COD等に係るあてはめ水域名 大竹港(2) 大竹港 COD等に係る環境基準類型 ※ Bロ 全窒素・全燐に係る水域名 大竹・岩国地先海域 大竹・岩国地先海域 | 環境保全課 127 (612-01) 西部27 (5(2) 日 計画地先海域 イ 年間調査 全層 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
|--|--|
| 測定地点番号 31000027 (612-01) 310000 測定地点名 広島湾西部27 広島湾西部27 COD等に係る環境基準類型 *** B D 全窒素・全燐に係る水域名 大竹・岩国地先海域 大竹・岩 全窒素・全燐に係る水域名 大竹・岩国地先海域 大竹・岩 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 *** 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 *** *** 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 *** *** 調査名 年間調査下層 *** 測定項目 単位 平均 最小 - 最大 m/n 平: 流量 m3/S *** *** B.D *** 8.1 0 / 12 8. DO mg/L 6.5 3.0** ** 8.1 2 / 12 7. BOD mg/L mg/L **< | 27 (612-01) 西部27 (612-01) 西部27 (612-01) 古田地先海域 |
| 測定地点名 広島湾西部27 広島湾 COD等に係るあてはめ水域名 大竹港(2) 大竹港(2) COD等に係る環境基準類型 ※ B ロ ※ B ロ 全窒素・全燐に係る水域名 大竹・岩国地先海域 大竹・岩 全窒素・全燐に係る環境基準類型 II イ II 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 木生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 事査名 年間調査下層 測定項目 単位 平均 最小 最大 m/n 平 流量 m3/S m3/S pH 8.0 7.8 ~ 8.1 0 / 12 8. DO mg/L 6.5 3.0* ~ 8.1 2 / 12 7. BOD mg/L mg/L mg/L 1.4 ~ 2.5 0 / 12 2. | 西部27 注(2) 口 岩国地先海域 イ 年間調査 全層 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 大竹港(2) 大竹港(2) 大竹港(2) 大竹港(2) 大竹港(2) 大竹港(2) 大竹港(2) 大竹港(2) 大竹港(2) 大竹・岩田地先海域 メロール スロール スロール スロール スロール スロール スロール スロール ス | 世間調査 全層 年間調査 全層 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| X B D | ロ 岩国地先海域 イ 年間調査 全層 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 全窒素・全燐に係る水域名 大竹・岩国地先海域 大竹・岩 全窒素・全燐に係る環境基準類型 II イ II 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 #個調査下層 調査名 年間調査下層 測定項目 単位 平均 最小 最大 m/n 平 流量 m3/S pH 8.0 7.8 ~ 8.1 0 / 12 8. DO mg/L 6.5 3.0* ~ 8.1 2 / 12 7. BOD mg/L mg/L 1.9 1.4 ~ 2.5 0 / 12 2. | 岩国地先海域 イ 年間調査 全層 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 II イ II 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 年間調査下層 測定項目 単位 平均 最小 最大 m/n 流量 m3/S pH 8.0 7.8 ~ 8.1 0 / 12 8. DO mg/L 6.5 3.0* ~ 8.1 2 / 12 7. BOD mg/L mg/L 1.9 1.4 ~ 2.5 0 / 12 2. | 年間調査 全層 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型調査名 調定項目 単位 平均 最小 一 最大 m/n 平 流量 m3/S pH 8.0 7.8 ~ 8.1 0 / 12 8. DO mg/L 6.5 3.0* ~ 8.1 2 / 12 7. BOD mg/L mg/L 1.9 1.4 ~ 2.5 0 / 12 2. | 年間調査 全層 均 最小 ~ 最大 m/n .1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 .2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 | 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 | 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 調査名 年間調査下層 測定項目 単位 平均 最小 一最大 m/n 平 流量 m3/S | 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平 流量 m3/S pH 8.0 7.8 ~ 8.1 0 / 12 8. DO mg/L 6.5 3.0* ~ 8.1 2 / 12 7. BOD mg/L (75%値) mg/L 1.9 1.4 ~ 2.5 0 / 12 2. COD mg/L 1.9 1.4 ~ 2.5 0 / 12 2. | 均 最小 ~ 最大 m/n 1 7.8 ~ 8.3 0 / 36 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| 流量 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 2 3.0* ~ 10 2 / 36 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | |
| (75%値) mg/L COD mg/L 1.9 1.4 ~ 2.5 0 / 12 2. | 3 1.2 ~ 41* 6 / 36 |
| COD mg/L 1.9 1.4 ~ 2.5 0 / 12 2. | 3 1.2 ~ 41* 6 / 36 |
| | .3 1.2 ~ 4 1* 1 6 / 36 |
| | |
| | J ^{TT} / |
| <u>般</u> SS <u>mg/L</u> 項 大腸菌数 CFU/100mL 2 | 2 <1 ~ 9 0 / 12 |
| 目 nーヘキサン抽出物質、油分等 mg/L <0 | |
| 全窒素 mg/L 0.5 | |
| 全 全 (10) 1 (10) 2 (10) 2 | |
| 全亜鉛 mg/L | |
| フニルフェノール mg/L | |
| LAS mg/L | |
| 底層溶存酸素量 mg/L 5.1 5.1 ~ 5.1 0 / 1 5. | .1 5.1 ~ 5.1 0 / 1 |
| カドミウム mg/L | |
| 全シアン mg/L | |
| 鉛 mg/L | |
| 六価クロム mg/L | |
| 砒素 mg/L | |
| 総水銀 mg/L | |
| アルキル水銀 mg/L | |
| PCB mg/L | |
| ジクロロメタン mg/L my/L in the full in the ful | |
| 四塩化炭素 mg/L | |
| 1,2-ジクロロエタン mg/L 1,1-ジクロロエチレン mg/L m | |
| 1,1-ジクロロエチレン mg/L シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L | |
| サンペー1,2ーシグロロエテレン mg/L | |
| 康 1103337mmm 70 / / | |
| 項 1,1,2-Fリクロロエタン mg/L | |
| 日 テトラクロロエチレン mg/L | |
| 1,3-ジクロロプロペン mg/L | |
| チウラム mg/L | |
| シマジン mg/L | |
| チオベンカルブ mg/L | |
| ベンゼン mg/L | |
| セレン mg/L | |
| 硝酸性窒素 mg/L | |
| 亜硝酸性窒素 mg/L | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.0 | 04 <0.01 ~ 0.06 0 / 2 |
| ふっ素 mg/L | |
| IE5)素 mg/L | |
| 1,4-ジオキサン mg/L mg/L | |
| 特 <u>銅 mg/L</u> | |
| 殊 鉄.溶解性 mg/L 項 マンガン 溶解性 mg/L | |
| | |
| H クロム mg/L 塩素イオン mg/L | |
| <u>価条イスン mg/L</u> 有機態窒素 mg/L | |
| 円板忠至糸 mg/L アンモニア能窒素 mg/L | |
| が とこと | |
| TOC mg/L | |
| そ クロロフィルa mg/m3 | |
| の一番気に道唯 | |
| 他 項メチレンブルー活性物質 mg/L | |
| 目 濁度 度 | |
| トリハロメタン生成能 mg/L | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L | |
| アニリン mg/L | |
| 2, 4-ジクロロフェノール mg/L mg/L | |
| ふん便性大腸菌群数 備考:環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。 | |

| _ | | _ | 公 共 用) | 7. 3. 7. | 只 | 120, 74 | ъ Л | < /i> | | | | | (2024 | 4 年度) |
|------|---|-----|-----------------------|-----------------|--------|-----------------|----------|--------|----------------------|---------|-------------|------|-------|-------|
| _ | 系名 空機 | | 広島湾西部 | 人類 | | | | | 広島湾西部 | 3 A SIR | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 31000029(61 | | | | | | 広島県環境仍 31000029(6 | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 広島湾西部29 | | | | | | 広島湾西部2 | | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 大竹·岩国地名 | | | | | | 大竹·岩国地 | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A □ | | | | | | ※ A □ | | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る水域名 | | 大竹·岩国地名 | た海域 | | | | | 大竹·岩国地 | 先海域 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | _ | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 査名 | (空 | | 年間調査 | : 니점 | (丰屋) | | | - | 午1 | 引調査 中 | 1 図 | | |
| Д/Li | | 位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | | m/n | 平均 | 最小 | 11叫且 T ~ | 最大 | m | ı/n |
| | 流量 m3 | | 1 **3 | 对(7) | | 双八 | <u> </u> | 11/ 11 | 13 | 对(7) | | 双八 | - 11 | 1/ 11 |
| | pH | | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.4* | 1 | / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.3 | 0 | / 12 |
| | DO mg | :/L | 7.6 | 5.5* | ~ | 10 | 6 | / 12 | 7.6 | 5.4* | ~ | 9.0 | 6 | / 12 |
| | BOD mg | | | | | | | | | | | | | |
| | (75%值) mg | /L | | | | | | | | | | | | |
| | COD mg | | 2.5* | 1.3 | \sim | 4.5* | 7 | / 12 | | 1.5 | \sim | 4.4* | 8 | / 12 |
| | (75%値) mg | | (2.9*) | | | | - | | (2.8*) | 1 | | | | |
| 般項 | SS mg 大腸菌数 cfu/ | | 2 | <1 | ~ | 7 | 0 | / 12 | | | | | | |
| 目 | nーペキサン抽出物質_油分等 mg | | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 | / 12 | | | | | | |
| 1 | | :/L | 0.18 | 0.11 | ~ | 0.25 | 0 | / 12 | | + | | | | |
| 1 | 全燐 mg | | 0.021 | 0.011 | ~ | 0.038* | 2 | / 12 | | | | | | |
| 1 | 全亜鉛 mg | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ノニルフェノール mg | :/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LAS mg | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 底層溶存酸素量 mg | | | | | | | 4 . | | | | | | |
| | カドミウム mg | | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 1 | | | | | | |
| | 全シアン mg | | <0.1 <0.005 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 1 | | | | | | |
| | <u></u> | | <0.005 | <0.005 <0.01 | ~ | <0.005 <0.01 | 0 | / 1 | | | | | | |
| | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 | | | | | | |
| | 総水銀 mg | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 1 | | | | | | |
| | | :/L | | 1010000 | | (010000 | | , - | | | | | | |
| | | /L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 1 | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg | /L | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg | :/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg | | | | | | | | | | | | | |
| | | /L | | | | | | | | | | | | |
| 健 | シス-1,2-ジクロロエチレン mg 1,1,1-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1-トリクロロエタン mg 1,1,2-トリクロロエタン mg | ;/L | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | | | |
| H | テトラクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg | | | | | | | | | | | | | |
| | | /L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg | :/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ mg | /L | | | | | | - | | | | | | |
| 1 | ベンゼン mg | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| | セレン mg | | | | | | - | | | 1 | | | | |
| 1 | 硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 亜硝酸性窒素 mg 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg | | 0.04 | <0.01 | ~ | 0.06 | 0 | / 2 | | | | | | |
| | かつ素 mg | | 0.01 | 10.01 | | 0.00 | | , 4 | | + | | | | |
| 1 | ほう素 mg | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1 | 1,4-ジオキサン mg | | | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 mg | | | | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 mg | | | | | | | - | | | | | | |
| 項目 | マンガン_溶解性 mg | | | | | | | | 1 | | | | | |
| П | クロム mg | | | | | | - | | | 1 | | | | |
| 1 | 塩素イオン mg | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 1 | 有機態窒素 mg アンモニア態窒素 mg | | | | | | 1 | | 1 | - | | | | |
| | | /L | | | | | 1 | | | + | | | | |
| 1 | | /L | | | | | | | | | | | 1 | |
| そ | クロロフィルa mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| (J) | | /cm | | | | | | | | | | | 1 | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 mg | :/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | E | - | | | | | | | | | | | |
| 1 | トリハロメタン生成能 mg | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 1 | 4-t-オクチルフェノール mg | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | :/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1 | 2, 4-ジクロロフェノール mg | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Ш | ふん便性大腸菌群数 個/1 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | | <u> </u> | | | | | | 1 | | | | |

| - | | | L. 1. 44 + 22 | | | | | L. r. da - 1 | | | | (2024 左 | 두度) |
|--------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------|--------|------|--------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|-----|
| | 系名 | | 広島湾西部 | A ≃m | | | | 広島湾西部 | A 400 | | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 31000029(61) | | | | | 広島県環境保 31000029(61 | | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | , | | | | | | | | | | |
| | た地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾西部29 大竹・岩国地名 | | | | | 広島湾西部29 大竹・岩国地名 | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A ロ | 山中坝 | | | | ※ A ロ | 山坪坝 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 大竹•岩国地外 | 上海域 | | | | 大竹·岩国地名 | た 海域 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ II イ | 山中水 | | | | ※ II イ | 山坪水 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | X = 1 | | | | | | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | 基準類型 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係 | | | | | | | | | | | | |
| 水生 | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | 基準類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間 | 問酒査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 🛭 | 2層 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | l |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.0 | 7.9 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | \sim | 8.4* | 1 / | 36 |
| | DO | mg/L | 7.0* | 4.0* | \sim | 8.6 | 5 / 12 | 7.4* | 4.0* | ~ | 10 | 17 / | 36 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | 1.0 | 1.0 | | 0.74 | 0 / 10 | 0.04 | 1.0 | | 4.5% | 17 / | 0.0 |
| | COD (75%値) | mg/L | 1.9 (2.0*) | 1.2 | \sim | 2.7* | 2 / 12 | 2.3* (2.6*) | 1.2 | \sim | 4.5* | 17 / | ახ |
| 一般 | (75%](E) SS | mg/L mg/L | (4.0*) | | | | | (4.U4) | | | | | |
| 般項 | 大腸菌数 | IIIg/L CFU/100mL | | | | | | 2 | <1 | ~ | 7 | 0 / | 12 |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / | 2 |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | 0.18 | 0.11 | ~ | 0.25 | 0 / | 12 |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | 0.021 | 0.011 | ~ | 0.038* | 2 / | 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| L | 底層溶存酸素量 | mg/L | 6.1 | 3.1 | ~ | 8.6 | 0 / 12 | 6.1 | 3.1 | \sim | 8.6 | 0 / | 12 |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 / | 1 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / | 1 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | < 0.005 | 0 / | 1 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / | 1 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 1 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / | 1 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | 40.000 | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / | 1 |
| | ジクロロメタン 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化灰糸 1,2-ジクロロエタン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| н | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | - | | | | | • | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.01 | /0.01 | | 0.00 | 6 / | ^ |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.04 | <0.01 | ~ | 0.06 | 0 / | 2 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 殊 項 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Ħ | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | 燐酸態燐 | mg/L | | | | · | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | アニリン | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | 0 4 154 | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール ふん便性大腸菌群数 | mg/L 個/100mL | | | | | | | | | | | |

| | | | | | - 1 | | | 10 10 | | | | (2024 年度) |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------|--------|------------------|-----------------------|-------------------|-------|------|-----------|
| | 系名 | _ | 広島湾西部 | 人細 | | | | 広島湾西部 | 1 A #P | | | |
| _ | 定機関 | \dashv | 広島県環境保 31000030(61 | | | | | 広島県環境係 31000030(6) | | | | |
| _ | 定地点番号 | | | | | | | , | | | | |
| _ | 定地点名 ひ | - | 広島湾西部30 大竹·岩国地外 | | | | | 広島湾西部3 大竹・岩国地 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | \dashv | 人们·石国地方 ※ A □ | 山丹水 | | | | 人们・右国地 ※ A □ | /山丹切 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | - | 大竹·岩国地外 | 上海域 | | | | 大竹·岩国地 | 先海域 | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | <u>※</u> Ⅱ イ | L1141-9A | | | | ※ Ⅱ イ | 761 <i>H</i> 4-9A | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | W 12 1 | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | [型 | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | 名 | | | | | | | | | | |
| 水生 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | i型 | | | | | | | | | | |
| 調 | <u> </u> 查名 | | | 年間調 | | | | | 1 | 間調査 中 | | |
| | | 位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 m3 | S/S | 0.1 | 7.0 | | 0.0 | 0 / 10 | 0.1 | 7.0 | | 0.0 | 0 / 10 |
| | pH DO mg | . /T | 7.7 | 7.9 5.8* | ~ | 9.9 | 0 / 12 5 / 12 | 8.1 7.7 | 7.9 5.5* | ~ | 9.6 | 0 / 12 |
| | DO mg BOD mg | | 1.1 | J.0* | | 9.9 | 5 / 12 | 7.1 | 0.0* | | 9.0 | 3 / 12 |
| | (75%值) mg | | | | | | | | | | | |
| | COD mg | _ | 2.5* | 1.5 | ~ | 4.4* | 6 / 12 | 2.5* | 1.5 | ~ | 4.6* | 7 / 12 |
| <u> </u> | (75%値) mg | | (2.6*) | _ | | | | (2.6*) | | | | |
| 般 | SS mg | /L | | | | | | | | | | |
| 項 | 大腸菌数 CFU/S | | 1 | <1 | \sim | 2 | 0 / 12 | | | | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg | | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / 2 | | | | - | |
| | 全窒素 mg | _ | 0.16 | 0.11 | ~ | 0.21 | 0 / 12 | | 1 | | | |
| | 全燐 mg | | 0.020 | 0.010 | ~ | 0.033* | 1 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 mg ノニルフェノール mg | | | | | | | | 1 | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | |
| | LAS mg 底層溶存酸素量 mg | _ | | | | | | | | | | |
| | カドミウム mg | _ | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg | /L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg | /L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 mg | | | | | | | | | | | |
| | PCB mg | _ | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg 1,1-ジクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン mg | _ | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン mg | _ | | | | | | | | | | |
| - | テトラクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg | :/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg | /L | | | | | | | | | | |
| | | /L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ mg | | | | | | | | 1 | | | |
| | ベンゼン mg | _ | | | | | | | 1 | | | |
| | セレン mg | _ | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg 亜硝酸性窒素 mg | _ | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 mg 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| | 明政性至系及び聖明政性至系 ふつ素 mg | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 mg | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン mg | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 mg | _ | | | | | | | | | | |
| 一殊項 | 鉄_溶解性 mg | _ | | | | | | | | | | |
| 項口 | マンガン_溶解性 mg | | | | | | | | | | | |
| 目 | クロム mg | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン mg | | | | | | | | | | | |
| | 有機能窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 mg | _ | | | | | | | 1 | | | |
| | 燐酸態燐 mg TOC mg | | | | | | | | | | | |
| そ | クロロフィルa mg/ | | | | | | | | 1 | | | |
| の | | /cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 mg | _ | | | | | | | 1 | | | |
| 月日 | 濁度 周 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg | _ | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール mg | _ | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg | _ | - | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 個/10 | | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | 甘淮 | 上ったファルナ | テナ | | | | | | | | |

| 新文師報 | | | | | | - ` | | | | | | | (2024 年度) |
|--|----------|--|-----|-------|-------------|-----|------|--------|-------|------------|--------|--------|-----------|
| 調定性色素 | | | _ | | △ ## | | | | 広島湾西部 | 1 0 38 | | | |
| 別定担係名 | | | | | | | | | | | | | |
| CODES 長の森 (株理学の機関 | | | _ | | | | | | | | | | |
| ※ A F | | | | | | | | | | | | | |
| *** | | * | _ | | 山呼씨 | | | | | /山平坝 | | | |
| # 1 / # 1 | | | | | -海域 | | | | | 先海域 | | | |
| 次生生物の生ま状の遠に性に係られませ 次生物の生まれのの遠に性に係られませ 次生物の生まれの違い性が高度と素の製 調査を | | | _ | | 114-94 | | | | | /L114-3A | | | |
| 次生物の生息が成っては、保存的の検えを確認 大生物の生息が成っては、保存のでは、保存のであった。 一年では、一般では、保存のであった。 一年では、一般では、保存のであった。 一年では、一般では、保存のであった。 一年では、一般では、「大学を対している」という。 「大学を対している」という。 大学を対している」という。 「大学を対している」という。 「大学を対している」という、「大学を対している。」という、「大学を対している」という、「大学を対している。 「大学を対している」という、「大学を対している。 「大学を対している。 「大学を対している」という。 「大学を対している」という、「大学を対している。 「大学を対している。 「大学を対している。 「大学を対している」という、「大学を対している。 「大学を対している。 「大学を与しいる」という、「大学を与しいないる。 「大学を与しないる。 「大学を与しないる。 「大学を与しないる。 「大学を与しないる。 「大学を与しないる。 「大学を与いないる。 「大学を与しないる。 「大学を与しないる。 「大学を与いないる。 「大学を与いないる。 「大学を与いないる。 「大学を与いないる。 「大学を与いないる。 「大学を与いない | | | | • • | | | | | | | | | |
| 株主特の中型・平田東子の神画を開発 中間観文下層 | | | 型 | | | | | | | | | | |
| 選択を 中間線を 中間線を 中間線を 中間線を 日本の | 水生 | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | 名 | | | | | | | | | | |
| 謝に項目 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 | 水生 | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | 型 | | | | | | | | | | |
| 接着 | | | | | | | | | | | | | |
| BH | | | _ | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| DO mg/L 7.1* 5.3* ~ 8.9 6 / 12 7.5 5.3* ~ 9.5 BOD mg/L 1.9 1.3 ~ 2.4* 4 / 12 2.3* 1.5 ~ 4.6 COD mg/L 1.9 1.3 ~ 2.4* 4 / 12 2.3* 1.5 ~ 4.6 COD mg/L 1.9 1.3 ~ 2.4* 4 / 12 2.3* 1.5 ~ 4.6 SS mg/L 2.1* 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 T-K+T-MBR mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Early mg/L 1.5 | | | /S | 0.1 | 0.0 | | 0.0 | 0 / 10 | 0.1 | 7.0 | | 0.0 | 0 / 00 |
| BOD | | | /T | | | | | | | | | | 0 / 36 |
| CSAD | - 1 | <u>.</u> | | 1.1** | J.J* | | 0.9 | 0 / 12 | 1.5 | 0.0* | | 9.9 | 14 / 30 |
| COD | | - | | | | | | | | | | | |
| C36位 mg/L C2.1e) C2.4e) C2.4e) C3.5 | - + | | | 1.9 | 1.3 | ~ | 2.4* | 4 / 12 | 2.3* | 1.3 | ~ | 4.6* | 17 / 36 |
| 1 | | - | | | - | | | | | | | | |
| 日 | 般 | SS mg/ | 'L | | | | | | | | | | |
| 10 | 項 | ************************************** | | | | | | | | | \sim | 2 | 0 / 12 |
| 全地部 | Ľ | | _ | | | | | | | | | <0.5 | 0 / 2 |
| 全部的 | | | | | | | | | | | | 0.21 | 0 / 12 |
| 上の | | | | | | | | | 0.020 | 0.010 | ~ | 0.033* | 1 / 12 |
| EAS | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 医脳神経療養養 加g/L 6.2 2.4 ~ 8.5 0 / 12 6.2 2.4 ~ 8.5 かドラウム 加g/L | - 1 | | | | | | | | | | | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | - | | 6.2 | 9.4 | ~ | 8.5 | 0 / 19 | 6.2 | 9.4 | ~ | 8.5 | 0 / 12 |
| 金ンアン mg/L 所g/L 所g/L 融末 mg/L 総未規 mg/L 総未規 mg/L 総未規 mg/L PCB mg/L 四塩化炭素 mg/L 四塩化炭素 1,1-ジクロエタン 1,1-ジクロエチレン mg/L 1,1-ジクロエチレン mg/L 1,1-ジクロエチレン mg/L 1,1-ジクロエエチレン mg/L 1,1-ジクロブロエチレン mg/L 1,3-ジクロブロベン デーラフロエチレン mg/L カーラン mg/L カーラス /ul> | _ | | | 0.2 | 2.4 | | 0.0 | 0 / 12 | 0.2 | 2.4 | | 0.0 | 0 / 12 |
| 一 | - | | | | | | | | | | | | |
| 大幅 | | | | | | | | | | | | | |
| 読水銀 | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル木銀 | i | 砒素 mg/ | 'L | | | | | | | | | | |
| PCB mg/L ジプロロメラン mg/L 旧塩化炭素 mg/L 1.2~ジクロロエチレン mg/L シス-1.2~ジクロロエチレン mg/L は 1,1,1~19/20ロエタン it j mg/L 1,1,1~19/20ロエタン mg/L mg/L mg/L 1,1,1~19/20ロエタン mg/L mg/L mg/L プラクロロエチレン mg/L デーララム mg/L プロプロペン mg/L チャララム mg/L プース・プロンプン mg/L ボンゼン mg/L ボンゼン mg/L ボンナン mg/L ボンゼン mg/L ボンゼン mg/L ボンゼン mg/L ボンナン mg/L ボンナン mg/L ボンド mg/L ボンボー mg/L ボンボー mg/L ボンボー mg/L ボンボー mg/L ボンボー mg/L ボンボー mg/L ボンボ | * 17 | 総水銀 mg/ | L. | | | | | | | | | | |
| ジカロリタン mg/L mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 mg/L 1,2-ジクロロエタン mg/L 1,1-ジクロロエチレン mg/L せ mg/L リ,1-ジクロロエチレン mg/L 項 1,1,1-リクロロエタン mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン mg/L | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン mg/L | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| では | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| 康 1,1,2-トリクロロエタン mg/L アトラクロロエチレン mg/L アトラクロロアロペン mg/L チウラム mg/L シマジン mg/L チオペンカルブ mg/L ペンゼン mg/L 世心 mg/L 硝酸性窒素 mg/L 亜硝酸性窒素 mg/L 山の砂性窒素 mg/L 山の砂性窒素 mg/L 山の砂性窒素 mg/L 山の砂性変素 mg/L 山の砂性窒素 mg/L 山の砂性窒素 mg/L 山の砂性窒素 mg/L 山の砂性窒素 mg/L 山の砂性変素 mg/L カーム mg/L カーム mg/L カーム mg/L 大のム mg/L 大のム mg/L 大の上 mg/L 大の地の mg/L 大の上 | | | | | | | | | | | | | |
| NJのロロエチレン mg/L mg/m mg/L mg/m mg/L mg/m mg/L mg/m mg/L mg/m mg/L mg/m mg/m mg/L mg/m | 康士 | | _ | | | | | | | | | | |
| デトラクロロエチレン mg/L 1,3ジクロロプロペン mg/L チウラム mg/L シマジン mg/L チオペンカルブ mg/L ペンゼン mg/L 世レン mg/L 硝酸性窒素 mg/L 亜硝酸性窒素 mg/L 福酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L よっ素 mg/L は支素 mg/L 株 mg/L サージオキサン mg/L ケーム mg/L ケーム mg/L ケーム mg/L 有機態窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 「物態健療 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 「のC mg/L プロフィルa mg/L | 垻⊦ | | | | | | | | | | | | |
| チウラム mg/L シマジン mg/L チオペンカルブ mg/L ペンゼン mg/L 随酸性窒素 mg/L 可酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素 mg/L 高砂素 mg/L よっ素 mg/L ほう素 mg/L 14-ジオキサン mg/L 毎 mg/L 季数溶解性 mg/L マンガン溶解性 mg/L クロム mg/L 有機態窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L 横酸性燐 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/M3 | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン mg/L チオベンカルブ mg/L ベンゼン mg/L せいと mg/L 硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素 mg/L 高の素 mg/L ほう素 mg/L 1,4-ジオキサン mg/L 毎 mg/L 東鉄、溶解性 mg/L マンガン、溶解性 mg/L クロム mg/L 有機能窒素 mg/L 不生一ア能窒素 mg/L 「内のC mg/L プロフィルa mg/L | | 1,3-ジクロロプロペン mg/ | 'L | | | | | | | | | | |
| チオペンカルブ mg/L ベンゼン mg/L 世レン mg/L 硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 5~3素 mg/L 1,4~ジオキサン mg/L 頻 mg/L 株然溶解性 mg/L クロム mg/L クロム mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 体酸能燐 mg/L TOC mg/L プロフィルa mg/M3 | | チウラム mg/ | L. | | | | | | | | | | |
| ベンゼン mg/L セレン mg/L 硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素 mg/L 海の大 mg/L よっ素 mg/L 1,4-ジオキサン mg/L ケスタ mg/L 株 サスタ サース mg/L カロム mg/L カロム mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能空素 mg/L 体験能構 mg/L TOC mg/L カロコフィルa mg/M3 | | | | | | | | | | | | | |
| セレン mg/L 硝酸性窒素 mg/L 亜硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L ふっ素 mg/L ほう素 1,4-ジオキサン 銅 mg/L 株 溶解性 mg/L マンガン,溶解性 mg/L クロム mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 体酸能燐 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 | | | | | | | | | | | | | |
| 研酸性窒素 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | <u> </u> | 0. | | | | | | | | | | | 1 |
| 亜硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 点う素 mg/L [4.5]素 mg/L 1,4-ジオキサン mg/L 頻 mg/L 鉄 溶解性 mg/L マンガン_溶解性 mg/L クロム mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 構酸能燐 mg/L TOC mg/L グロフィルa mg/m3 | | | _ | | | | | | | | | | |
| 研酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L | | | | | | | | | | | | | + |
| あつ素 mg/L ほう素 mg/L 1,4-ジオキサン mg/L 頻 mg/L 鉄 溶解性 mg/L マンガン 溶解性 mg/L クロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 構能態 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 特 mg/L (株) (株) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| 殊 鉄/溶解性 mg/L マンガン/溶解性 mg/L クロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 燐酸能燐 mg/L TOC mg/L グロロフィルa mg/m3 | 特 | | | | | | | | | | | | |
| 目 クロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L 燐酸態燐 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 | 殊 | | | | | | | | | | | | |
| 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 燐酸能燐 mg/L TOC mg/L グロロフィルa mg/m3 | - | | | | | | | | | | | | |
| 有機能窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L 燐酸態燐 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 | - 2 | 0 | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 mg/L 燐酸態燐 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 | - + | | | | | | | | | | | | 1 |
| 燐酸態燐 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 | - | | | | | | | | | | | | 1 |
| TOC mg/L / クロロフィルa mg/m3 / mg/m3 | | | | | | | | | | | | | |
| プロロフィルa mg/m3 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | + |
| | の | | _ | | | | | | | | | | 1 |
| 他 項 メチレンブルー活性物質 mg/L | 1177. 上 | | _ | | | | | | | | | | |
| 目 濁度 度 | ~ - | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 mg/L | Ī | トリハロメタン生成能 mg/ | L L | | | | | | | | | | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L mg/L | - | | | | | | - | | | | | | |
| アニリン mg/L | <u> </u> | - | _ | | | | | | | | | | 1 |
| 2, 4-ジクロロフェノール mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 個/100mL | | | | | _ , | | | | | | | | 1 |

| | | | T | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|-----|--|--------------|------------------|-------------|--------|----------|---|-----|---|-----------------------|-------------|--------|------|-----------|
| | 系名 | | 広島湾西部 | 1 A =m | | | | | | 広島湾西部 | A =m | | | |
| | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | | | 広島県環境保 31000225(61 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 31000225 (61 | | | | | | | | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾西部2: 広島湾西部 | 2-5 | | | | | | 広島湾西部22 広島湾西部 | 2-5 | | | |
| | OD等に係るのではの水域名 OD等に係る環境基準類型 | | ム島湾四部 A イ | | | | | | | ム島湾四部 A イ | | | | |
| | (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | | 広島湾西部 | | | | | | | 広島湾西部 | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | □ イ | | | | | | | □ イ | | | | |
| _ | ・ | | 広島湾西部(| 仝 械) | | | | | | 広島湾西部(金 | 全械) | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | ※ 生物A イ | 上/外/ | | | | | | ※ 生物A イ | 上%/ | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に促 | | X 1.40/1.1 | | | | | | | X 1,0011 1 | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年間調査 | 生 上層 | (表層) | | | | | 年間 | 間調査 中 | 層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | | m/n | 1 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | pН | | | | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.3* | 1.6 | \sim | 3.3* | 2 | / | 4 | 2.2* | 1.6 | \sim | 3.2* | 2 / 4 |
| | (75%値) | mg/L | (2.1*) | | | | | | | (2.1*) | | | | |
| 般 | SS | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| 項目 | 7 VIII EI 3/A | CFU/100mL | | | | | 1 | | | | | | | |
| П | 11一、イリン抽山初貝_佃刀寺 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 全燐 | mg/L | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | _ | , | | | | | | 1 |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.002 | 0.001 | ~ | 0.002 | 0 | / | 4 | | | | | 1 |
| | ノニルフェノール | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ~ | <0.00006 | 0 | / | 4 | | | | | |
| | LAS | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | ~ | <0.0006 | 0 | / | 4 | | | | | |
| - | 底層溶存酸素量 カドミウム | mg/L | | | | | - | | | | | | | + |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L mg/L | | | | | | | | - | | | | + |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | + |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | - | | | | | | | 1 |
| | ほう素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| - | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | - | | | | | | | |
| 特 | 郵 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ | mg/L | | | | | - | | | | | | | + |
| 殊項目 | 鉄_溶解性 マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | - | | | | | | | + |
| 目 | マンガン_浴解性 クロム | mg/L mg/L | | | | | - | | | | | | | - |
| H | 塩素イオン | mg/L | | | | | + | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | + |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | + |
| | が | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | 1 | | | | | | | |
| の | 索 尼尼道 在 | μ S/cm | | | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 月 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | - | | | | | | | - | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | 1 | | | | 1 | | | | | | | |

| _ | | | A A /// | | | | | | | | | (202 | 24 年 | 度) |
|----------|--------------------------------------|--------------|------------------------|---------|-----|-------|-------|-------------------|----------|--------|----------|------|------|-----------|
| | 系名 | | 広島湾西部 | A ≃m | | | | 広島湾西部 | A 400 | | | | | _ |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 31000225(61- | | | | | 広島県環境保 | | | | | | \dashv |
| | 定地点番号 | | | | | | | 31000225 (61 | | | | | | |
| _ | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾西部22 | 2-5 | | | | 広島湾西部2 | 2-5 | | | | | _ |
| | DD等に係るめてはの水域名 DD等に係る環境基準類型 | | 広島湾西部 A イ | | | | | 広島湾西部 A イ | | | | | | - |
| _ | DD寺に係る環境基準類型 窒素・全燐に係る水域名 | | A イ 広島湾西部 | | | | | A イ 広島湾西部 | | | | | | \dashv |
| _ | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | 以局待四部 Ⅱ イ | | | | | 以局偽四部 Ⅱイ | | | | | | - |
| _ | 室系・主牌に保る東現塞甲類室 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | ■ 11 1 広島湾西部(á | 24(1) | | | | Ⅱ 1 広島湾西部(s | 全城) | | | | | \dashv |
| - | 主主物の主息状況の適応性に係る係る環境基準 | 生 類刑 | 広島湾四部(3 ※ 生物A イ | 匚/以/ | | | | 広局偽四部(3 ※ 生物Aイ | 工學/ | | | | | \dashv |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るが | | X 生物A 1 | | | | | X 生物A 1 | | | | | | _ |
| _ | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | | | _ |
| _ | 查名 | T-79K | | 年間 | 調査下 | 層 | | | 年間 | 調査 🛭 | 全層 | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | 1 | m/n | |
| | 流量 | m3/S | , , | 70.7 | | 74.74 | , | | 74.1 | | 70.7 | | , | _ |
| | pH | | | | | | | | | | | | | _ |
| | DO | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.7 | 1.6 | ~ | 1.8 | 0 / 4 | 2.0 | 1.6 | ~ | 3.3* | 4 | / 1 | 2 |
| _ | (75%値) | mg/L | (1.7) | | | | | (1.9*) | | | | | | |
| 般 | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | | | | | | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | 全燐 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | 0.002 | 0.001 | \sim | 0.002 | 0 | / - | 4 |
| ĺ | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | \sim | <0.00006 | 0 | / | 4 |
| ĺ | LAS | mg/L | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | \sim | <0.0006 | 0 | / - | 4 |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| D:th- | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| ĺ | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| ĺ | チオベンカルブ ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| ĺ | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| ĺ | | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| | 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| ĺ | 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| l | 朝酸性量素及い亜朝酸性量素 ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| ĺ | かつ系 ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| ĺ | 1.4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| - | 旬 1,4-シオキザン | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| 特础 | 鉄_溶解性 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| 殊項 | 大、谷畔性 マンガン 容解性 | | | | | | | + | | | | | | - |
| 月 | マンガン_俗解性 クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| - | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | - |
| ĺ | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | - |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| そ | | mg/m3 | | | | | 1 | | | | | | | - |
| の | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | - |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | IIIg/L 度 | | | | | 1 | | | | | | | |
| П | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| l | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | - |
| | アニリン | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | 7 |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | \exists |
| | | 個/100mL | | | | | | 1 | | | | | | |
| <u> </u> | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | | 単占ったとファした | <u></u> | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |

| _ | | | | | | | | 10 10 | | | | (2024 年度) |
|----|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|--------|-------|-----------|
| | 系名 | | 広島湾 | ∧ ±m | | | | 広島湾 | 1 人部 | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 32000001(61 | | | | | 広島市環境係 32000001(6) | | | | |
| _ | 定地点番号 | | | 5-01) | | | | , | 15-01) | | | |
| _ | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾1 | | | | | 広島湾1 海田湾 | | | | |
| | DD等に係るめてはめ水吸名 DD等に係る環境基準類型 | | 海田湾 ※ B イ | | | | | 海田湾 ※ B イ | | | | |
| | DD寺に徐る泉児基準規型 窒素・全燐に係る水域名 | | ★ B 7 広島湾北部 | | | | | ※ B 7 広島湾北部 | | | | |
| _ | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | 広局偽礼部 Ⅲイ | | | | | 以局偽礼部 Ⅲ イ | | | | |
| - | 室系・主隣にはの環境基準規至 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | ш4 | | | | | ш1 | | | | |
| _ | 主主物の主念状況の適応性に係る係る環境基準 | 護期型 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | 查名 | 790. | | 年間調査 | : 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | 7層 | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.2 | 7.8 | \sim | 8.9* | 5 / 12 | 8.1 | 7.9 | \sim | 8.3 | 0 / 12 |
| | DO | mg/L | 9.6 | 5.5 | \sim | 14 | 0 / 12 | 8.1 | 6.1 | \sim | 10 | 0 / 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 3.9* | 1.8 | \sim | 7.6* | 6 / 12 | 3.2* | 1.9 | \sim | 5.5* | 6 / 12 |
| 1- | | mg/L | (5.2*) | | | | | (4.3*) | | | | |
| 般 | | mg/L | 4 | 1 | ~ | 8 | 0 / 12 | 4 | 1 | ~ | 7 | 0 / 12 |
| 項目 | 2 4130 Jiii 294 | FU/100mL | 17 | 2 | \sim | 65 | 0 / 12 | 58 | 1 | ~ | 520 | 0 / 12 |
| П | | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| 1 | | mg/L | 0.59 | 0.31 | ~ | 1.3* | 5 / 12 | | | | | |
| 1 | | mg/L | 0.061* | 0.028 | ~ | 0.093* | 8 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | 0.004 | 0.002 | ~ | 0.007 | 0 / 12 | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | <0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | | | | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | | mg/L | <0.003 | <0.003 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| 1 | | mg/L | .0.0000 | .0.0000 | • | .0.0000 | 0 / 2 | | | | | |
| 1 | | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月日 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | - | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | | mg/L | (0 | (0 | | 10.5 | | | | | | |
| 特 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 2 | | | | | |
| 殊何 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 2 | | | | | |
| 項目 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | | | | | |
| Ë | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | 15000 | 10000 | | 17000 | / 10 |
| 1 | | mg/L | 13700 | 2190 | ~ | 17500 | - / 12 | 15900 | 10200 | ~ | 17800 | - / 12 |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 70C | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | | mg/L ng/m3 | | | | | | | | | | |
| の | - | ng/m3 uS/cm | | | | | | - | | | | |
| 他 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | |
| Ħ | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | 川g/ L 周/100mL | | | | | | | | | | |
| Щ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | 出上 ポキファしナ | | | | 1 | I. | 1 | | | 1 |

| | | | | | | | | 10 10 | | | | (2024 年度 |
|----------|-------------------------------|------------------|---------------|----------|-------|-------|----|-----------------------|---------|--------|----------|----------|
| | 系名 | | 広島湾 | A | | | | 広島湾 | A | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 | | | | | 広島市環境保 32000001(61 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 32000001 (615 | o=01) | | | | , | 5-01) | | | |
| _ | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾1 | | | | | 広島湾1 海田湾 | | | | |
| | DD等に係るのではめが吸名 DD等に係る環境基準類型 | | 海田湾 ※ B イ | | | | | (#四傳 ※ Bイ | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| _ | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲイ | | | | | Ⅲイ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | III *1 | | | | | III 1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 售類型 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るが | | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| | 查名 | | | 年間認 | 間査 下層 | | | | 年間 | 調査 🛭 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ 最: | 大 m/ | 'n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | | 8.2 | 7.8 | \sim | 8.9* | 5 / 24 |
| | DO | mg/L | | | | | | 8.9 | 5.5 | \sim | 14 | 0 / 24 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | | | | | | 3.6* | 1.8 | \sim | 7.6* | 12 / 24 |
| | | mg/L | | | | | | (4.9*) | | | | |
| 般西 | SS | mg/L | | | | | | 4 | 1 | ~ | 8 | 0 / 24 |
| 項目 | - 1.33 E 31 | CFU/100mL | | | | | | 38 | 1 | ~ | 520 | 0 / 24 |
| [| | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 |
| 1 | 全窒素 | mg/L | | | | + | | 0.59 0.061* | 0.31 | ~ | 1.3* | 5 / 12 |
| 1 | 全燐 | mg/L | | | | + | | | 0.028 | ~ | 0.093* | 8 / 12 |
| Ì | 全亜鉛 ノニルフェノール | mg/L mg/L | | | | | | 0.004 | 0.002 | ~ | 0.007 | 0 / 12 |
| | LAS | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L mg/L | 5.7 | 0.7 | ~ 9. | 0 0 / | 12 | 5.7 | 0.7 | ~ | 9.0 | 0 / 12 |
| H | 広信俗付販糸里カドミウム | mg/L | 5.1 | 0.1 | 9. | , 0 / | 14 | <0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 12 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | < 0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | < 0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | < 0.0005 | <0.0005 | ~ | < 0.0005 | 0 / 2 |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| fa-ta | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / 2 |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 |
| 項 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 |
| 目 | クロム | mg/L | | _ | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 2 |
| 1 | 塩素イオン | mg/L | | | | | | 14800 | 2190 | ~ | 17800 | - / 24 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 2 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| 他 | 電気伝導度 メチレンブルー活性物質 | μS/cm | | | | | | | | | | |
| 項日 | メチレンブルー活性物質 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | |
| 目 | 御及 トリハロメタン生成能 | ළ mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | + | | | | | | |
| | | 田g/ L 個/100mL | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 備考: 環境基準類型の「※」 印は各水域の | | 単上 ポキファした | 그-}- | | | | 1 | 1 | | | 1 |

| _ | | | | | - ` | | | | | | | (2024 年度) |
|----|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-----------|
| | 系名 | | 広島湾 | 人 ## | | | | 広島湾 | 人部 | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 32000002 (615 | | | | | 広島市環境保 32000002(61 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | | 5-51) | | | | | 5-51) | | | |
| | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾2 海田湾 | | | | | 広島湾2 海田湾 | | | | |
| | DD等に係るめてはめ水域名 DD等に係る環境基準類型 | | 海田湾 Bイ | | | | | 海田湾 Bイ | | | | |
| _ | DD寺に保る現現基準類型 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| _ | 室系・全燐に係る環境基準類型 | | 広局偽礼部 Ⅲ イ | | | | | 広局偽礼部 Ⅲ イ | | | | |
| _ | 並素・主牌に尿る原現塞中規至 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | ш 1 | | | | | m /1 | | | | |
| _ | E生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る水は | | | | | | | | | | | |
| | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年間調 | 生 上層(| (表層) | | | 年間 | 調査 中 | '層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 n | n3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.2 | 7.8 | ~ | 8.7* | 3 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.4* | 1 / 12 |
| | DO m | ng/L | 8.9 | 5.1 | \sim | 11 | 0 / 12 | 8.4 | 6.3 | ~ | 10 | 0 / 12 |
| | BOD | ng/L | | | | | | | | | | |
| | (75%值) m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 3.4* | 1.9 | \sim | 5.9* | 5 / 12 | 3.2* | 1.6 | \sim | 7.1* | 5 / 12 |
| - | | ng/L | (4.7*) | | | | | (4.3*) | | | | |
| 般 | | ng/L | 3 | 1 | ~ | 6 | 0 / 12 | 4 | 2 | ~ | 7 | 0 / 12 |
| 項目 | | U/100mL | 67 | 2 | \sim | 510 | 0 / 12 | 110 | 1 | ~ | 780 | 0 / 12 |
| Н | | ng/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì. | シス-1,2-ジクロロエチレン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | - | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン m 銅 m | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 特础 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| - | | ng/L | 13400 | 2170 | ~ | 17500 | - / 12 | 15500 | 8890 | ~ | 17600 | - / 12 |
| | | ng/L | -0100 | 2110 | | 1.000 | , 12 | 10000 | 5550 | | 1.000 | , 12 |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| そ | | ig/m3 | | | | | | | | | | |
| の | · | S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 月日 | | 度 | | | | | | | | | | |
| [| | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | /100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 倍其淮 | ま占でなることた | 군士 | | | | | | | | |

| 測定地点番号 測定地点名 | 市環境保全課 0002(615-51) 湾2 |
|---|--|
| 測定地点番号 | では、 |
| 測定地点名 | 湾2 湾 B イ 湾北部 Ⅲ イ |
| 下の口等に係るあではめ水域名 海田湾 海田湾 海田湾 下の口等に係る環境基準類型 B イ 正金室素・全燐に係る水域名 広島湾北部 広島湾北部 広島湾北部 広島湾北部 全窒素・全燐に係る環境基準類型 III イ I | 湾 B イ 湾北部 III イ 年間調査 全層 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| COD等に係る環境基準類型 | B イ 湾北部 Ⅲ イ 年間調査 全層 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 全窒素・全燐に係る水域名 | 年間調査 全層 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 関定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 添量 pH DO mg/L (75%値) COD mg/L (75%値) COD mg/L (75%値) SS mg/L 大腸菌数 「下ジャカートナン抽出物質 油分等 全産素 mg/L 全窒素 全燐性 カーヘキサン抽出物質 油分等 全燐性 カールフェノール LAS 加州 「加州 「加州 「加州 「加州 「加州 「加州 「加州 | 世 イ 年間調査 全層 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る尿境基準類型 調査名 年間調査下層 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 流量 m3/S pH DO mg/L g/L (75%値) mg/L COD mg/L (75%値) (75%位) (75%位) <td>年間調査 全層 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2</td> | 年間調査 全層 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る係る環境基準類型 | 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 | 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 | 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 調査名 | 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 流量 | 平均 最小 ~ 最大 m/n 8.2 7.8 ~ 8.7* 4 / 2 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| pH DO mg/L BOD mg/L (75%値) mg/L COD mg/L (75%値) mg/L (4 SS mg/L 大腸菌数 CFU/100mL n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg/L 全窒素 mg/L 全媒 mg/L /ニルフェノール mg/L LAS mg/L | 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 70 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| DO mg/L | 8.6 5.1 ~ 11 0 / 2 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 70 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| BOD mg/L mg/L mg/L cOD mg/L mg/L cOD mg/L mg/L coD mg/L | 3.4* 1.6 ~ 7.1* 10 / 2 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| (75%値) mg/L mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (75%位) mg/L (75%(d) mg/L (75 | 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| COD | 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| - (75%値) mg/L 般 SS mg/L 支腸菌数 CFU/100mL n-ヘキサン抽出物質 油分等 mg/L 全窒素 mg/L 全媒 mg/L /ニルフェノール mg/L LAS mg/L | 4.6*) 4 1 ~ 7 0 / 2 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| 般 SS mg/L 大腸菌数 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 項 大腸菌数 CFU/100mL mg/L | 90 1 ~ 780 0 / 2 |
| Table Ta | |
| 全 全 素 mg/L 全 強 mg/L 全 雄 mg/L 全 亜 鉛 mg/L ノニルフェノール mg/L LAS mg/L | <0.5 ~ <0.5 0 / 1 |
| 全燐 mg/L 全亜鉛 mg/L ノニルフェノール mg/L LAS mg/L | |
| 全亜鉛 mg/L ノニルフェノール mg/L LAS mg/L | |
| /ニルフェノール mg/L LAS mg/L | |
| LAS mg/L | |
| | |
| 底層溶存酸素量 | 6.0 1.2 ~ 8.9 0 / 1 |
| | 6.0 1.2 ~ 8.9 0 / 1 |
| カドミウム mg/L 全シアン mg/L | |
| 生シノン mg/L sh | |
| 対 六価クロム mg/L | |
| 就素 mg/L | |
| 総水銀 mg/L | |
| アルキル水銀 mg/L | |
| PCB mg/L | |
| ジクロロメタン mg/L | |
| 四塩化炭素 mg/L | |
| 1,2-ジクロロエタン mg/L | |
| 1,1-ジクロロエチレン mg/L | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L | |
| 健 1.1.1-トリクロロエタン mg/L | |
| 康 項 1,1,2-トリクロロエタン mg/L | |
| 間 トリクロロエチレン mg/L | |
| テトラクロロエチレン mg/L | |
| 1,3-ジクロロプロペン mg/L | |
| チウラム mg/L | |
| シマジン mg/L | |
| チオベンカルブ mg/L | |
| ベンゼン mg/L | |
| センン mg/L | |
| 硝酸性窒素 mg/L | |
| 亜硝酸性窒素 mg/L | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L | |
| ふつ素 mg/L | |
| IED A Night the Market | |
| 1,4-ジオキサン mg/L mg/L | |
| 特 銅 mg/L mg/L mg/L | |
| 殊 鉄.溶解性 mg/L 項 マンガン.溶解性 mg/L | |
| 項 マンガン_溶解性 mg/L mg/L mg/L | |
| 9 LA IIIg/L | 4500 2170 ~ 17600 - / 2 |
| 有機態窒素 mg/L | 2110 11000 / 2 |
| アンモニア能窒素 mg/L | |
| 「 | |
| TOC mg/L | |
| そ クロロフィルa mg/m3 | |
| の 番与に道中 ピー | |
| 他 項 メチレンブルー活性物質 mg/L | |
| 1 濁度 度 | |
| トリハロメタン生成能 mg/L | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L | |
| アニリン mg/L | |
| 2, 4-ジクロロフェノール mg/L | |
| ふん便性大腸菌群数 個/100mL | |

| 水 | 系名 | | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | (2024 年度) |
|----|---|--------------|--------------|----------|--------|---------|--------|-------------|------------|--------|-------|-----------|
| 浿 | 定機関 | | 広島市環境保 | 全課 | | | | 広島市環境保 | R全課 | | | |
| 浿 | 定地点番号 | | 32000006 (61 | 8-01) | | · | | 32000006 (6 | 18-01) | | | · |
| | 定地点名 | | 広島湾6 | | | | | 広島湾6 | | | | |
| | OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | ※ Aイ | | | | • |
| 全 | 空素・全燐に係る水域名 | | 広島湾南部 | | | | | 広島湾南部 | | | | |
| 全 | ・ 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ □ | | | | | ※ Ⅱ □ | | | | • |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | • |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | 基準類型 | | | | | | | | | | |
| 訓 | 計 查名 | | | 年間調査 | 坒 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | 中層 | • |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.3 | 8.0 | \sim | 8.8* | 3 / 12 | 8.2 | 8.0 | \sim | 8.7* | 2 / 12 |
| | DO | mg/L | 9.1 | 6.5* | \sim | 11 | 2 / 12 | 8.6 | 6.9* | \sim | 10 | 2 / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.7* | 1.7 | \sim | 5.3* | 7 / 12 | 2.8* | 1.4 | \sim | 6.1* | 6 / 12 |
| | (75%値) | mg/L | (3.4*) | | | | | (2.6*) | | | | |
| 般 | | mg/L | 2 | 1 | \sim | 5 | 0 / 12 | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 |
| 項日 | 7 C120 ELL 30C | CFU/100mL | 3 | <1 | ~ | 11 | 0 / 12 | 67* | <1 | ~ | 770* | 1 / 12 |
| 目 | 11一、イリン加山物貝_四万寺 | mg/L | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.28 | 0.15 | ~ | 0.44* | 3 / 12 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.028 | 0.016 | \sim | 0.044* | 5 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.002 | 0.001 | \sim | 0.006 | 0 / 12 | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | < 0.0017 | < 0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 2 | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | < 0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | < 0.01 | < 0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 2 | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | < 0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | PCB | mg/L | < 0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | 1 |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | + |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | + |
| 康 | 1.1.0.1111/ | mg/L | | | | | | | | | | + |
| 項目 | | mg/L | | | | | | | | | | + |
| П | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 1.3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | シマジン | mg/L | | | | | + | | | | | + |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | + | | | | | + |
| | セレン | mg/L | | | | | + | | | | | + |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 一 一 一 一 可 的 性 空 素 | mg/L | | | | | | | + | | | + |
| | 明酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | + | | | + |
| | 明政性至条及U型明政性至条 ふつ素 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | + |
| - | AFI | mg/L mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 2 | | | | | + |
| 特 | | _ | | | | | , | | | | | + |
| 殊項 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | , 2 | | | | | - |
| 月 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | , - | | | | | + |
| Ë | 704 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | 10000 | 10000 | | 17000 | / 10 |
| | 塩素イオン | mg/L | 16100 | 8370 | ~ | 17800 | - / 12 | 16600 | 10300 | ~ | 17800 | - / 12 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | + |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | 1 | | | | | + |
| 7. | TOC | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| その | | mg/m3 | | | | | | | | | | 1 |
| 他 | 电双体得及 | μ S/cm | | | | | | | | | | 1 |
| 項 | メナレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | 1 |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | I | 1 | | | 1 | l | 1 | | | 1 |

| _ | | | 1 . r. da + 2 | | | | | L. C. de - C | | | | (2024年) | 度) |
|----|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------|-------|--------|-----------------------|-------------|--------|---------|---------|----|
| | 系名 字機問 | | 広島湾 | △ ## | | | | 広島湾 | △ #⊞ | | | | _ |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000006(618 | | | | | 広島市環境保 32000006(61 | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 広島湾6 | 5-01) | | | | 広島湾6 | 0-01) | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | ※ A ✓ | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾南部 | | | | | 広島湾南部 | | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ж П □ | | | | | Ж П □ | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 隼類型 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るオ | | | | | | | | | | | | |
| | ±生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 準類型 | | / c ₽F | 1=m+ - | · 🗔 | | | K-88 | | \ FI | | |
| 司间 | 查名 | 光子 | 平均 | | 調査下 | | m /n | 平均 | | 調査 🛭 | | m/n | |
| | 測定項目流量 | 単位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | |
| | pH | 1110/0 | 8.0 | 7.8 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.2 | 7.8 | ~ | 8.8* | 5 / 3 | 36 |
| | | mg/L | 7.7 | 4.9* | ~ | 9.8 | 5 / 12 | 8.5 | 4.9* | ~ | 11 | | 36 |
| | | mg/L | | | | | - , | | | | | - , - | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.8 | 1.0 | ~ | 2.1* | 2 / 12 | 2.4* | 1.0 | ~ | 6.1* | 15 / 3 | 36 |
| _ | | mg/L | (2.0*) | | | | | (2.7*) | | | | | |
| 般 | | mg/L | 2 | 1 | \sim | 4 | 0 / 12 | 2 | 1 | \sim | 5 | | 36 |
| 項目 | 7 VIII (III) VI | CFU/100mL | 26* | <1 | ~ | 280* | 1 / 12 | 32* | <1 | ~ | 770* | | 36 |
| Н | | mg/L | | | | | 1 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 1 | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 0.28 | 0.15 | ~ | 0.44* | | 12 |
| 1 | | mg/L | | | | | | 0.028 0.002 | 0.016 | ~ | 0.044* | | 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | - | 0.002 | 0.001 | ~ | 0.006 | 0 / 1 | 14 |
| | | mg/L | | | | | + | | | | | | |
| | | mg/L | 6.3 | 1.8 | ~ | 8.9 | 0 / 12 | 6.3 | 1.8 | ~ | 8.9 | 0 / 1 | 12 |
| F | | mg/L | | 1.0 | | 5.0 | - , 12 | <0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | | 2 |
| | | mg/L | | | | | 1 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | | 2 |
| | | mg/L | | | | | | < 0.005 | < 0.005 | ~ | < 0.005 | 0 / 2 | 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 2 | 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | 2 |
| | | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | 2 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | 2 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | - | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | + | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / 2 | 2 |
| 殊 | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 2 | 2 |
| 項目 | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | | 2 |
| Ħ | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | | 2 |
| 1 | | mg/L | 17600 | 16000 | \sim | 18100 | - / 12 | 16700 | 8370 | \sim | 18100 | - / 3 | 36 |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | + | | | | | | |
| 1 | 解散態解 TOC | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | + | | | | | | |
| の | 1 | μS/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 月日 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| Γ | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | _ | | | | | | | | | |
| | | 個/100mL | | | | | 1 | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | (基章量 | 性占であることを | 示す | | | | | | | | | |

| | | | L | | | | | L | | | | (2024 年度) |
|----|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---|-------|--------|-----------------------|--|--------|--------|-----------|
| | 系名 岩地田 | | 広島湾 | ∧ ## | | | | 広島湾 | 1 / 48 | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 32000007 (616 | | | | | 広島市環境保 32000007(61 | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 32000007 (616 広島湾7 | 5-51) | | | | 32000007(6) 広島湾7 | .6-51) | | | |
| | た地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島市地先海: | ht | | | | 広島市地先海 | i市 | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | A 口 | ·-y% | | | | A 口 | r-94 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | III イ | | | | | III イ | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間調 | | | , | | | 問酒査 中 | | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 pH | m3/S | 8.3 | 8.0 | ~ | 9.0* | 3 / 12 | 8.2 | 8.0 | ~ | 8.7* | 1 / 12 |
| | | mg/L | 9.2 | 6.7* | ~ | 11 | 3 / 12 | 8.6 | 6.7* | ~ | 10 | 2 / 12 |
| | | mg/L | 3.2 | 0.1* | | 11 | 3 / 12 | 0.0 | 0.1* | | 10 | 2 / 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 3.1* | 1.6 | ~ | 6.9* | 8 / 12 | 2.9* | 1.3 | ~ | 5.9* | 8 / 12 |
| _ | | mg/L | (4.1*) | | | | | (3.8*) | <u> </u> | | | <u>L</u> |
| 般 | | mg/L | 3 | 2 | ~ | 7 | 0 / 12 | 3 | 1 | \sim | 7 | 0 / 12 |
| 項日 | | FU/100mL | 4 | <1 | ~ | 19 | 0 / 12 | 20 | <1 | \sim | 150* | 2 / 12 |
| 目 | | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 : : | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| 項目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| П | | mg/L | 15500 | | | 1000 | , | 10100 | 0.4.7.7 | | , moo. | , |
| | | mg/L | 15500 | 6240 | ~ | 17700 | - / 12 | 16100 | 8180 | ~ | 17900 | - / 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | | ng/m3 | | | | | | | | | | |
| の | 1 | u S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | | 周/100mL | eta la serie | _ , | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 11年 中 2 | 世上ポナファルナ | | | | | | | | | |

| 野球組の番号 | (2024 年度 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----|--------|-------------|----------|--------|------------------------|
| 選挙の表情等 | | | | A am | 広島湾 | | | | n A am | 広島湾 | | 水系名 |
| 高沢連邦名 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b-51) | | | | | 16-51) | | | |
| A P | | | | falt | | | | | 立は | | | |
| | | | | /以 | | | | | 华 /坎 | | | |
| 登호는 | | | | | 広島湾北部 | | | | | | | |
| 株立生物の生を対象のでは、はないます。 株立生物の生を、中に金字でも今の地では、はら寒性神経 園変和 | | | | | | | | | | | | |
| 依生物の生き形での場合では、100mm 100mm 100m | | | | | | | | | | | 名 | |
| 株立生物や北手作等できるの選出を持ち、 選択者 | | | | | | | | | | | | |
| 新安祖 中間 東京 中間 東京 中間 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東 | | | | | | | | | | | | |
| 別立度日 別位 平均 泉小 平均 泉小 一泉八 平均 泉小 一泉八 一月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 | | | | | | | | | | | 環境基準類型 | 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環 |
| 技術 | | 晋 | 調査 全 | 年間 | | | 層 | 丰間調査 下 | | | | 調査名 |
| PH DO BE/L S.3 S.0 ~ 9.00 BOO BE/L S.9 6.7* ~ 11 DO BE/L S.9 6.7* ~ 11 COD BE/L S.9* S.9* C.7* ~ 11 COD BE/L S.9* S.9* C.7* ~ 11 COD BE/L S.9* S.9* C.7* ~ 6.9* COD BE/L S.9* S.9* S.9* COD S.9* S.9* S.9* | m/n | 最大 | ~ | 最小 | 平均 | m/n | | | ļ | 平均 | 単位 | 測定項目 |
| DO Bg/L | | | | | | | | | | | m3/S | 流量 |
| BOD | 4 / 24 | 9.0* | \sim | 8.0 | 8.3 | | | | | | | рН |
| Time | 5 / 24 | 11 | \sim | 6.7* | 8.9 | | | | | | | |
| COO | | | | | | | | | | | - | |
| CTSMO mg/L 3 3 1 ~ 7 | | | | | | | | | | | | |
| 模 SS | 16 / 24 | 6.9* | \sim | 1.3 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 日 | 0 / 24 | | | | | | | | | | | |
| ### 1975 197 | 2 / 24 | | | | | | | | | | | |
| | 0 / 12 | <0.5 | ~ | <0.5 | <0.5 | | | | | | | 川・ペイリン抽山初貝_佃刀寺 |
| 全無数 mg/L | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| LAS | | | | | | | | | | | | |
| 原稿を存棄者量 | | | | | | | | | | | | |
| ### 100 | 0 / 12 | 9.9 | ~ | 9.6 | 6.8 | 0 / 19 | 0.9 | ~ : | | 6.8 | | |
| 会とアン mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | 0 / 12 | 3.4 | | 2.0 | 0.0 | U / 12 | 9.4 | ~ | - | 0.0 | | |
| 競り | | | | | | | | | | | | |
| 大田 | | | | | | | | | | | | |
| 批素 mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 歴史報 mg/L | | | | | | | | | | | | |
| アハキル水像 | | | | | | | | | | | | |
| PCB | | | | | | | | | | | | |
| プグロロメタン mg/L | | | | | | | | | | | | PCB |
| 1.2-ジクロロエタン mg/L | | | | | | | | | | | | ジクロロメタン |
| 1.1-ジクロロエチレン mg/L | | | | | | | | | | | mg/L | 四塩化炭素 |
| 大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | | | | | mg/L | 1,2-ジクロロエタン |
| 1,1,1→リクロロエタン mg/L mg/ | | | | | | | | | | | mg/L | 1,1-ジクロロエチレン |
| The product of th | | | | | | | | | | | mg/L | |
| 類 [1, 2 = 5 y 2 + 1 + 2 y 2 mg/L | | | | | | | | | | | | |
| デトラクロロエチレン mg/L 1,3~ジクロロプロペン mg/L ナウラム mg/L シマジン mg/L チオペンカルブ mg/L ペンゼン mg/L ロの酸性窒素 mg/L 亜硝酸性窒素 mg/L 前酸性窒素 mg/L ボール mg/L ボール mg/L ボージオキサン mg/L ボージオキサン mg/L ボージオキサン mg/L ボール mg/L | | | | | | | | | | | | 項 1,1,2-トリクロロエタン |
| 1,3-ジクロコプロペン mg/L | | | | | | | | | | | | |
| デクラム mg/L シマジン mg/L デオペシカルブ mg/L ペンゼン mg/L セレン mg/L 耐酸性窒素 mg/L 可酸性窒素 mg/L 耐酸性窒素 mg/L 小の素 izう素 izう素 mg/L ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-j | | | | | | | | | | | | |
| シマジン mg/L | | | | | | | | | | | | |
| デオペンカルブ mg/L ペンゼン mg/L セレン mg/L 前酸性窒素 mg/L 可酸性窒素 mg/L 前酸性窒素 mg/L 高の素 ig/L izう素 mg/L 1,4・ジオキサン mg/L ヶ野 mg/L 海株鉄溶解性 mg/L マンガン溶解性 mg/L カロム mg/L 塩素イオン mg/L 塩素イオン mg/L 有機態窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L 燐酸酸 (mg/L) mg/L プロフィルa mg/L 電気伝導度 μ S/cm プロフィルa mg/L 電気伝導度 μ S/cm プロフィルタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | |
| ペンゼン mg/L | | | | | | | | | | | | |
| セレン mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 前酸性窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 請談性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L ふつ素 mg/L 1,4-ジオキサン mg/L 舞 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特 mg/L 殊 終,溶解性 mg/L マンガン,溶解性 mg/L クロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L 燐酸酸煤 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 電気伝導度 μ S/cm メチレンブルー活性物質 mg/L 調度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 残 終済解性 mg/L マンガン/溶解性 mg/L クロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機態窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L 構能態構 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 電気伝導度 μ S/cm メチレンブルー活性物質 mg/L 調度 度 トリハロメタシ生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | Ara |
| 項目 マンガン 溶解性 mg/L クロム mg/L 15800 6240 ~ 17900 塩素イオン mg/L 15800 6240 ~ 17900 有機態窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L 構酸態媒 mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 クロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 燐酸能燐 mg/L TOC mg/L プロフィルa mg/m3 電気伝導度 μ S/cm メチレンブルー活性物質 mg/L 濁度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | 頃 マンガン 溶解性 |
| 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 燐酸能燐 mg/L TOC mg/L クロコフィルa mg/M 電気伝導度 μ S/cm メチレンブルー活性物質 mg/L 濁度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | クロム |
| 有機能窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L | - / 24 | 17900 | ~ | 6240 | 15800 | | | | | | | |
| 燐酸態燐 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 電気伝導度 µ S/cm メチレンブルー活性物質 mg/L 濁度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | 有機態窒素 |
| TOC mg/L | | | | | | | | | | | | |
| そののののののではできます。 μ S/cm 電気伝導度 μ S/cm メチレンブルー活性物質 mg/L 濁度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | |
| で 他 リメテレンブルー活性物質 μ S/cm 諸度 mg/L トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 他 电 元 | | | | | | | | | | | | |
| 項メチレンブルー活性物質 mg/L 濁度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | h 电双体导及 |
| トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | | | | | | | | | | 項 メチレンブルー活性物質 |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| アニリン mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | mg/L | |
| 2, 4-ジクロロフェノール mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 個/100mL 情考:環境基準類型の「※」印は各水域の環境基準点であることを示す。 | | | | | | | | | | <u>L</u> | | |

| _ | | | L | | | | | L | | | | (2024 年度) |
|-----|--|-----------------|-----------------------|----------|--------|---------|--------|-----------------------|---------|---------|-------|-----------|
| | :系名 (古) (1) | | 広島湾 | A ⇒m | | | | 広島湾 | 1 ^ 400 | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000009(61 | | | | | 広島市環境係 32000009(6: | | | | |
| _ | 定地点名 | | 52000009 (61 広島湾9 | 0-93 / | | | | 52000009 (6. 広島湾9 | 10-55) | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島市地先海 | tit | | | | 広島市地先海 | 描 | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A II | ~yA | | | | A II | F*-9A | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | шイ | | | | | Ⅲ イ | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 単類型 | | t pp and | | / I. E. | | | | 7.000 (| | |
| 訳 | 查名 | 124 AL | A4.507 | 年間調 | | | , | ₩. | | 調査中 | | / |
| _ | 測定項目流量 | 単位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | pH | III 3/ S | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.6* | 1 / 12 | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.6* | 1 / 12 |
| | | mg/L | 8.8 | 5.9* | ~ | 10 | 2 / 12 | 8.3 | 6.7* | ~ | 10 | 3 / 12 |
| | | mg/L | | 0.0 | | 10 | 2 / 12 | | 011 | | 10 | 0 / 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 2.9* | 1.5 | ~ | 4.7* | 8 / 12 | 2.8* | 1.5 | ~ | 5.5* | 8 / 12 |
| _ | | mg/L | (3.6*) | | | | | (3.7*) | | | | |
| 般 | | mg/L | 3 | 1 | \sim | 6 | 0 / 12 | 3 | 1 | \sim | 5 | 0 / 12 |
| 項目 | 大腸菌数 | FU/100mL | 50* | 2 | \sim | 290* | 3 / 12 | 54* | 2 | \sim | 410* | 4 / 12 |
| Ħ | | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | ļ |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| H | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | - | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | - | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄、溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項目 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ë | 7-24 | mg/L | 12600 | 2920 | ~ | 16200 | - / 12 | 15900 | 10000 | ~ | 17700 | - / 12 |
| | | mg/L mg/L | 12000 | 2920 | ~ | 16300 | - / 12 | 19900 | 10000 | ~ | 11100 | - / 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | | ng/m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | u S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L M/100mL | | | | | | | | | | |
| Щ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | <u> </u> | | | | 1 | l | 1 | | | 1 |

| _ | | | L | | | | | T | | | | (2024 年度) |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----|-----|--------|----------------|---------|--------|------------|-----------|
| | 系名 | | 広島湾 | 1 A =m | | | | 広島湾 | 1 ^ 400 | | | |
| | 定機関 | | 広島市環境保 | | | | | 広島市環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 32000009 (61 | 16-53) | | | | 32000009 (61 | 16-53) | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾9 広島市地先海 | ; ldt | | | | 広島湾9 広島市地先海 | ; td: | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A 口 | 中央 | | | | A 口 | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | □ イ | | | | | 川イ | | | | |
| _ | 主宝宗 王州にいる衆先至十級主 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | : | III ~1 | | | | | III *1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に使 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環 | | | | | | | | | | | |
| |]査名 | | | 年間 | 調査下 | 層 | | | 年間 | 調査 全 | <u>:</u> 層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pН | | | | | | | 8.2 | 7.9 | \sim | 8.6* | 2 / 24 |
| | DO | mg/L | | | | | | 8.6 | 5.9* | ~ | 10 | 5 / 24 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | | | | | | 2.9* | 1.5 | \sim | 5.5* | 16 / 24 |
| 1- | (75%値) | mg/L | | | | | | (3.7*) | | | | |
| 般 | SS | mg/L | | | | | | 3 | 1 | ~ | 6 | 0 / 24 |
| 項目 | 7 (10) 四 3人 | CFU/100mL | | | | | | 52* | 2 | ~ | 410* | 7 / 24 |
| П | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | 6.0 | 0.0 | | 0.0 | 0 / 10 | 6.0 | 0.0 | | 0.0 | 0 / 10 |
| - | 底層溶存酸素量 カドミウム | mg/L | 6.9 | 2.8 | ~ | 9.2 | 0 / 12 | 6.9 | 2.8 | ~ | 9.2 | 0 / 12 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| H | 7 | mg/L | | | | | | 1.4000 | 00 | | 1,000 | , - |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | 14200 | 2920 | ~ | 17700 | - / 24 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | TOC クロロフィルa | mg/L mg/m3 | | | | | | | | | | |
| 0 | 索尼尼道座 | mg/m3 μS/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | 電気伝導度 メチレンブルー活性物質 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | |
| 日 | トリハロメタン生成能 | 度 mg/L | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 4-t-オクチルフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |
| _ | ふん医性人勝風群数 備考:環境基準類型の「※」印は各水域 | | L | | | | | l | 1 | | | 1 |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----|-------------------------|--------------|------------------|-------|--------|-------|--------|-----------------|--------|--------|-------|-----------|
| | 系名 | | 広島湾 | A am | | | | 広島湾 | A Am | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 | | | | | 広島市環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 32000011 (616 | 5-54) | | | | 32000011 (61 | .6-54) | | | |
| | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾11 広島市地先海5 | lst: | | | | 広島湾11 広島市地先海 | i kdt | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | A 口 | 蚁 | | | | A 口 | : 収 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| _ | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲイ | | | | | □イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | III ~1 | | | | | III 1 | | | | |
| _ | 上生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| - | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る水は | | | | | | | | | | | |
| | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | | ., | | 年間調 | 生 上層 (| (表層) | | | 年間 | 調査 中 | '層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 n | n3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.4* | 1 / 12 | 8.2 | 8.0 | ~ | 8.6* | 1 / 12 |
| | DO m | ng/L | 8.6 | 5.8* | \sim | 10 | 2 / 12 | 8.2 | 6.5* | \sim | 10 | 3 / 12 |
| | BOD m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 2.8* | 1.6 | \sim | 4.4* | 7 / 12 | 2.8* | 1.6 | \sim | 5.3* | 8 / 12 |
| | | ng/L | (3.5*) | | | | | (3.4*) | | | | |
| 般恆 | | ng/L | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 | 3 | 1 | ~ | 6 | 0 / 12 |
| 項目 | 7 1/3/3 [22 / 3/4 | U/100mL | 42* | <1 | ~ | 250* | 4 / 12 | 33* | 1 | ~ | 310* | 1 / 12 |
| | | ng/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| - | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| ١ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ħ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 肚土 | , | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特殊 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 13200 | 2300 | ~ | 17700 | - / 12 | 15600 | 8630 | ~ | 17800 | - / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| その | | g/m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | | S/cm | | | - | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | 度 | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数個 | /100mL | | | | | | | | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|-------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------------|--------|-------|-------|------------------|
| | 系名 岩地田 | | 広島湾 | ∧ ## | | | | 広島湾 | 人部 | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 32000011(616 | | | | | 広島市環境保 32000011(61 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | | 5-54) | | | | 32000011(6) 広島湾11 | 6-54) | | | |
| _ | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾11 広島市地先海り | ht | | | | 広島南11 広島市地先海 | : fait | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | A 口 | /-^ | | | | A 口 | ·/A | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | III イ | | | | | III イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| 水生 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るが | k域名 | | | | | | | | | | |
| 水生 | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| 調 | 査名 | | | | 調査 下層 | | | | | 問酒査 全 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0. | 0 / 04 |
| | pH DO | /1 | | | | | | 8.2 8.4 | 8.0 | ~ | 8.6* | 2 / 24 5 / 24 |
| | BOD | mg/L mg/L | | | | | | 6.4 | 5.8* | ~ | 10 | 5 / 24 |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | | | | | | 2.8* | 1.6 | ~ | 5.3* | 15 / 24 |
| L | | mg/L | | | | | | (3.5*) | 1.0 | | 5.6 | 10 / 44 |
| 般 | SS | mg/L | | | | | | 3 | 1 | ~ | 6 | 0 / 24 |
| 項 | | CFU/100mL | | | | | | 38* | <1 | ~ | 310* | 5 / 24 |
| 目 | | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | LAS | mg/L | | | | | | | _ | | | |
| - | 底層溶存酸素量 | mg/L | 6.6 | 2.4 | ~ | 9.1 | 0 / 12 | 6.6 | 2.4 | ~ | 9.1 | 0 / 12 |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 対価クロム | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| fa-ta | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Î | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | mg/L | | - | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月日 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ë | 塩素イオン | mg/L | | | | | | 14400 | 9900 | ~ | 17000 | - / 24 |
| Ì | | mg/L mg/L | | | | | | 14400 | 2300 | .~ | 17800 | - / 24 |
| | 月機態至糸 アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | 1 | μS/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| Ì | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | - | | | | | - | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| ı | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | 日 不 心 | | | | | (2024 年度) |
|----------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------|--------|-------|-----------|
| _ | 系名 | | 広島湾 | 人細 | | | | 広島湾 | 1 / 48 | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000012(618 | | | | | 広島市環境係 32000012(6) | | | | |
| _ | 定地点名 | | 広島湾12 | 5-02) | | | | 広島湾12 | 16-02) | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | ※ A イ | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅲ イ | | | | | ※ Ⅲ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | № III · | | | | | ж m · і | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 性類型 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るが | | | | | | | | | | | |
| | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| | 查名 | T-34. | | 年間調査 | ¥ 上層 | (表層) | | | 年間 | 調査中 | 1層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | .,,,, | |
| | pH | | 8.3 | 8.0 | ~ | 8.8* | 2 / 12 | 8.2 | 8.0 | \sim | 8.5* | 2 / 12 |
| | DO | mg/L | 9.0 | 6.2* | \sim | 11 | 2 / 12 | 8.4 | 6.7* | \sim | 10 | 3 / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 3.0* | 1.5 | ~ | 5.4* | 8 / 12 | 2.8* | 1.6 | ~ | 5.3* | 7 / 12 |
| <u> </u> | (75%値) | mg/L | (3.9*) | | | | | (3.6*) | | | | <u> </u> |
| 般 | SS | mg/L | 3 | 1 | \sim | 6 | 0 / 12 | 2 | <1 | \sim | 4 | 0 / 12 |
| 項 | 5 (120 E) 59 (| CFU/100mL | 7 | <1 | ~ | 27* | 2 / 12 | 7 | <1 | \sim | 23* | 1 / 12 |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.28 | 0.19 | ~ | 0.36 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.035 | 0.018 | ~ | 0.046 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.001 | <0.001 | ~ | 0.003 | 0 / 12 | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | <0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| 1 | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 2 | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 2 | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| 1 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 4:卦 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 75 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | - | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | - | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| - | 1,4-ジオキサン | mg/L | /0.005 | /0.005 | | /0.005 | _ / 0 | | | | | |
| 特 | 銅 201 305 607 514 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 2 | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 マンガン_溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | | | | | |
| 目 | クロム | mg/L | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 - / 2 | | 1 | | | |
| Ė | | mg/L | 14800 | | ~ | <0.1 | | 16200 | 11500 | ~ | 17700 | _ / 10 |
| | 塩素イオン 有機態窒素 | mg/L mg/L | 14000 | 5220 | ~ | 17700 | - / 12 | 10200 | 11500 | ~ | 17700 | - / 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 燐酸態燐 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| の | | mg/ma μS/cm | | | | | | | + | | | |
| 他 | and the same and the same | μ S/CIII mg/L | | | | | | | | | | |
| 項日 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | |
| П | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | トリハログラン生成能 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| i | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | + | | | |
| | | 田g/L 個/100mL | | | | | | | + | | | |
| _ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の野 | | L 焦占でもステした | テナ | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| 水測 | VI FI | | | | | | Contrada e Co | | | | (2024 左 | 十尺) |
|------|---|--------------|-----------------------------|-------------|-------|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------|----------|----------|
| 測 | | | 広島湾 | △ ≒⊞ | | | 広島湾 | △細 | | | | |
| 細 | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000012 (618 | | | | 広島市環境保 32000012(61 | | | | | |
| _ | _{足地点番号} 定地点名 | | 広島湾12 | 5-02) | | | 52000012 (61 広島湾12 | 8-02) | | | | |
| | 圧地点名 ○D等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾 | | | | 広島湾12 | | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | <i>本面</i> 得 ※ A イ | | | | 本面 (5 ※ A イ | | | | | |
| | 空素・全燐に係る水域名 で素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | 広島湾北部 | | | | | |
| | 童系・主牌に帰る小坂石 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅲ イ | | | | ※ Ⅲ イ | | | | | |
| _ | ^{並素・王牌に帰る環境整中類至} 主生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | м ш 1 | | | | м ш ₁ | | | | | |
| _ | E生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 進類型 | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る を表現している。 | | | | | | | | | | | |
| | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年間調 | 査 下層 | | | 年間 | 調査 슄 | <u>-</u> 層 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | | ~ 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | 8.2 | 8.0 | \sim | 8.8* | 4 / | 24 |
| | DO | mg/L | | | | | 8.8 | 6.2* | \sim | 11 | 5 / | 24 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | | | | | 2.9* | 1.5 | \sim | 5.4* | 15 / | 24 |
| | (75%値) | mg/L | | | | | (3.8*) | | | | | |
| 1200 | SS | mg/L | | | | | 3 | <1 | ~ | 6 | 0 / | 24 |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | 7 | <1 | \sim | 27* | 3 / | 24 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | | 12 |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | 0.28 | 0.19 | ~ | 0.36 | 0 / | 12 |
| | 全燐 | mg/L | | | | | 0.035 | 0.018 | ~ | 0.046 | 0 / | 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | 0.001 | <0.001 | ~ | 0.003 | 0 / | 12 |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS 底層溶存酸素量 | mg/L | 6.6 | 0.1 | ~ 9.0 | 0 / 10 | 6.6 | 0.1 | | 0.0 | 0 / | 10 |
| H | 底層溶存酸素量 カドミウム | mg/L mg/L | 0.0 | 2.1 | ~ 9.0 | 0 / 12 | <0.0017 | 2.1 <0.0003 | ~ | 9.0 | 0 / | 12 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / | 2 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / | 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / | 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / | 2 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | <0.0005 | <0.005 | ~ | <0.0005 | 0 / | 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | .5,5500 | .0.0000 | | | , | <u>и</u> |
| | PCB | mg/L | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / | 2 |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ヤレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 ご動性空素 ご動性空素 で動性空素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 こ。表 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | は7条 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,4-シオキザン 銅 | mg/L | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / | 2 |
| 特 | <u></u> 鉄_溶解性 | mg/L mg/L | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / | 2 |
| 殊項 | <u> </u> | mg/L mg/L | | | | | <0.1 | <0.1 | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | <0.1 | - / | 2 |
| | クロム | mg/L | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 2 |
| H | 塩素イオン | mg/L | | | | | 15500 | 5220 | ~ | 17700 | - / | 24 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | 5220 | | 100 | | J. |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| (D) | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| . >< | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
|] | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | - | | | |
| | 4-t-オクナルノエノール | mg/ L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクテルフェノール アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | A 75 /11 | 小戏力 | 、貝 | | 店 未 総 | 10 10 | | | | (2024 年度) |
|------|--|---------------------|--------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|------|-----------|
| | 系名 | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | |
| - | 定機関 | 広島県環境 | | | | | 広島県環境保 | | | | |
| - | 定地点番号 定地点名 | 32000014(6 広島湾14 | 518-03) | | | | 32000014(6) 広島湾14 | 18-03) | | | |
| _ | た地点石 DD等に係るあてはめ水域名 | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | ※ A イ | | | | | ж A 1 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | 広島湾南部 | | | | | 広島湾南部 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | Ж П □ | | | | | ※ Ⅱ □ | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 査名 | 2 | 左間調 | 査 上層 | (表届) | | | 年間 | 引調査 中 | 1届 | |
| 1/19 | 測定項目 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 m3/ | | -12.7 | | 7,65 | | , - | 1,0,1 | | 7,67 | |
| | pH | 8.2 | 7.9 | \sim | 8.7* | 2 / 12 | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.6* | 2 / 12 |
| | DO mg/ | | 5.3* | ~ | 10 | 3 / 12 | 8.1 | 5.3* | ~ | 10 | 3 / 12 |
| | BOD mg/ | | | | | | | | | | |
| | (75%値) mg/ | | 1.4 | | F 1.6 | 7 / 10 | 2.8* | 1.0 | | F 1. | 7 / 10 |
| | COD mg/ (75%値) mg/ | | 1.4 | ~ | 5.1* | 7 / 12 | (3.4*) | 1.6 | ~ | 5.1* | 7 / 12 |
| 一般 | SS mg/ | | | | | | (0.77) | | | | |
| 項 | 大腸菌数 CFU/IC | | <1 | ~ | 7 | 0 / 12 | | | | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg/ | | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全窒素 mg/ | | 0.14 | ~ | 0.34* | 1 / 12 | | | | · | |
| | 全燐 mg/ | | 0.016 | ~ | 0.033* | 3 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 mg/ ノニルフェノール mg/ | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール mg/ LAS mg/ | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 mg/ | | | | | | | | | | |
| | カドミウム mg/ | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg/ | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg/ アルキル水銀 mg/ | | | | | | | | | | |
| | PCB mg/ | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | |
| 存去 | シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1-トリクロロエタン mg/ 1,1,2-トリクロロエタン mg/ | | | | | | | | | | |
| 項目 | 1,1,2-トリクロロエタン mg/ トリクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | |
| Ħ | テトラクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg/ | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg/ | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg/ | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ mg/ | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン mg/ セレン mg/ | | | | | | | | | | |
| | セレン mg/ 硝酸性窒素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ | | <0.01 | ~ | 0.10 | 0 / 6 | | | | | |
| | ふっ素 mg/ | _ | | | | | | | | | |
| | ほう素 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン mg/ | _ | | | | | | | | | |
| 特础 | 銅 mg/ 鉄,溶解性 mg/ | | | | | | | | | | - |
| 殊項 | 軟_溶解性 mg/ マンガン_溶解性 mg/ | | | | | | | | | | |
| 項目 | クロム mg/ | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン mg/ | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 mg/ | _ | | - | - | | | | | - | |
| | アンモニア態窒素 mg/ | | <0.01 | ~ | 0.01 | - / 6 | | | | | |
| | 燐酸態燐 mg/ | | <0.003 | ~ | 0.017 | - / 6 | | | | | |
| そ | TOC mg/ クロロフィルa mg/1 | | 1.0 | ~ | 25 | - / 12 | | | | | |
| の | 電気伝導度 μ S/ | | 1.0 | | 20 | , 12 | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 mg/ | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg/ | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール mg/ | | | | | | | | | | 1 |
| | アニリン mg/ 2, 4-ジクロロフェノール mg/ | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg/ ふん便性大腸菌群数 個/100 | | | | | | | | | | |
| Щ | 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | → . — | | | 1 | l | 1 | | | |

| 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島県環境保全課 広島県環境保全課 広島県環境保全課 広島県環境保全課 広島県環境保全課 近島湾14 広島湾14 広島湾14 広島湾14 広島湾 広島湾南部 広島湾南部 広島湾南部 広島湾南部 広島湾南部 広島湾南部 広島湾南部 広島湾南部 本生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 ボール | (618-03) |
|---|---|
| 測定地点番号 32000014 (618-03) 32000014 (成島湾14 広島湾14 広島湾14 広島湾14 広島湾14 広島湾14 広島湾14 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾 | (618-03) |
| 測定地点名 広島湾14 広島湾14 COD等に係るあてはめ水域名 広島湾 広島湾 COD等に係る環境基準類型 ※ Aイ ※ Aイ 全窒素・全燐に係る水域名 広島湾南部 広島湾南部 全窒素・全燐に係る環境基準類型 ※ II ロ ※ II ロ 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 年間調査下層 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S pH 8.0 7.9 ~ 8.1 0 / 12 8.1 DO mg/L 6.6* 4.8* ~ 8.6 8 / 12 7.6 BOD mg/L (75%値) (75%値) (2.9*) COD mg/L 1.9 1.1 ~ 2.9* 2 / 12 2.5* 大腸菌数 CFU/10回L 2 (2.9*) (0.5 | |
| 広島湾 | |
| COD等に係る環境基準類型 | 部 |
| 全窒素・全燐に係る水域名 広島湾南部 広島湾南部 広島湾南部 広島湾南部 | 部 |
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 ※ II ロ ※ II ロ 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 年間調査 下層 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S pH 8.0 7.9 ~ 8.1 0 / 12 8.1 DO mg/L 6.6* 4.8* ~ 8.6 8 / 12 7.6 BOD mg/L (7.5%値) mg/L (1.9*) 1.1 ~ 2.9* 2 / 12 2.5* (2.9*) 数 SS mg/L (1.9*) 1.1 ~ 2.9* 2 / 12 2.5* 大腸菌数 CFU/100mL 2 1.1 1.1 2 | ah |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る係る環境基準類型 | |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 年間調査 下層 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S pH 8.0 7.9 ~ 8.1 0 / 12 8.1 DO mg/L 6.6* 4.8* ~ 8.6 8 / 12 7.6 BOD mg/L (75%値) mg/L (1.9*) | |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 | |
| 調査名 年間調査下層 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S - 最大 m/n 平均 pH 8.0 7.9 ~ 8.1 0 / 12 8.1 DO mg/L 6.6* 4.8* ~ 8.6 8 / 12 7.6 BOD mg/L mg/L - 2.9* 2 / 12 2.5* COD mg/L 1.9 1.1 ~ 2.9* 2 / 12 2.5* (75%値) mg/L (1.9*) - 2.9* 2 / 12 2.5* 家S mg/L 本+少ン抽出物質、油分等 2 nーペキサン抽出物質、油分等 mg/L - (0.5 | |
| 測定項目 単位 平均 最小 一 最大 m/n 平均 流量 m3/S m3/S <td>年間調査 全層</td> | 年間調査 全層 |
| 流量 | 最小 ~ 最大 m/n |
| pH 8.0 7.9 ~ 8.1 0 / 12 8.1 DO mg/L 6.6* 4.8* ~ 8.6 8 / 12 7.6 BOD mg/L (75%値) mg/L 1.9 1.1 ~ 2.9* 2 / 12 2.5* (75%値) mg/L (1.9*) (2.9*) SS mg/L 大腸菌数 CFU/100mL 2 nーペキサン抽出物質:油分等 mg/L < 0.5 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| BOD | 7.9 ~ 8.7* 4 / 36 |
| (75%値) mg/L | 4.8* ~ 10 14 / 36 |
| COD mg/L 1.9 1.1 ~ 2.9* 2 / 12 2.5* (75%値) mg/L (1.9*) (2.9*) SS mg/L 大腸菌数 CFU/100mL 2 nーペキサン抽出物質.油分等 mg/L < (0.5 | |
| - (75%値) mg/L (1.9*) (2.9*) 般 SS mg/L 大腸菌数 CFU/100mL 2 nーペキサン抽出物質,油分等 mg/L <0.5 | |
| 般 SS mg/L 大腸菌数 cFU/100mL 2 n-ヘキサン抽出物質:油分等 mg/L <0.5 | 1.1 ~ 5.1* 16 / 36 |
| 項 大腸菌数 CFU/100mL 2 n-ヘキサン抽出物質 油分等 mg/L <0.5 | |
| 目 n-ヘキサン抽出物質.油分等 mg/L (0.5) | |
| 11一ペイリン抽山物具_油力等 1118/上 (0.5) | <1 ~ 7 0 / 12 |
| A starter | <0.5 ~ <0.5 0 / 2 |
| 全窒素 mg/L 0.16 0.10 ~ 0.21 0 / 12 0.19 | 0.10 ~ 0.34* 1 / 24 |
| 全 | 0.016 ~ 0.033* 4 / 24 |
| 全亜鉛 mg/L | |
| /ニルフェノール mg/L | |
| LAS mg/L 底層溶存酸素量 mg/L 6.4 3.1 ~ 8.7 0 / 12 6.4 | 21 - 07 0 / 10 |
| 底層溶存酸素量 mg/L 6.4 3.1 ~ 8.7 0 / 12 6.4 カドミウム mg/L | 3.1 ~ 8.7 0 / 12 |
| 全シアン mg/L | |
| 全グラ ing/L 鉛 mg/L | |
| 対 六価クロム mg/L | |
| 成素 mg/L | |
| 総水銀 mg/L | |
| アルキル水銀 mg/L | |
| PCB mg/L | |
| ジクロロメタン mg/L | |
| 四塩化炭素 mg/L | |
| 1,2-ジクロロエタン mg/L | |
| 1,1-ジクロロエチレン mg/L | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L | |
| 健 1.1.1-トリクロロエタン mg/L | |
| 康 項 1,1,2-トリクロロエタン mg/L | |
| トリクロロエチレン mg/L | |
| テトラクロロエチレン mg/L | |
| 1,3-ジクロロプロペン mg/L | |
| チウラム mg/L | |
| シマジン mg/L | |
| チオベンカルブ mg/L | |
| ベンゼン mg/L | |
| セレン mg/L | |
| 硝酸性窒素 mg/L | |
| 亜硝酸性窒素 mg/L | (0.01 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.03 | <0.01 ~ 0.10 0 / 6 |
| ふつ素 mg/L | |
| ほう素 mg/L 1.4-ジオキサン mg/L | |
| AFI | |
| 特 動 mg/L 動 xxex | |
| 殊 鉄、溶解性 mg/L 項 マンガン、溶解性 mg/L | |
| 項 マンガン_溶解性 mg/L mg/L mg/L | + |
| PLA mg/L 塩素イオン mg/L | |
| 有機能窒素 mg/L | |
| THX版を呈来 | <0.01 ∼ 0.01 − / 6 |
| March Mar | <0.003 ~ 0.017 - / 6 |
| TOC mg/L | , , , |
| そ クロロフィルa mg/m3 6.0 | 1.0 ~ 25 - / 12 |
| の ta気伝導度 | |
| 他 | |
| 目濁度 | |
| トリハロメタン生成能 mg/L | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L | |
| アニリン mg/L | |
| 2, 4-ジクロロフェノール mg/L | |
| ふん便性大腸菌群数 個/100mL | |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|---|-------|--------|-----------------------|---------|--------|-------|-----------|
| | 系名 岩機 開 | | 広島湾 | ∧ ## | | | | 広島湾 | 1 / 48 | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 32000015 (616 | | | | | 広島市環境係 32000015(6) | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 32000015 (616 広島湾15 | 5-55) | | | | 32000015(6) 広島湾15 | 16-55) | | | |
| | た地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島市地先海: | hit | | | | 広島南15 広島市地先海 | ī lidi | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | A 口 | ·-y% | | | | A P | p-94 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | III イ | | | | | III イ | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間調 | | | , | | | 調査中 | | , |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 pH | m3/S | 8.1 | 7.8 | ~ | 8.8* | 2 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.8* | 1 / 12 |
| | | mg/L | 8.4 | 5.7* | ~ | 11 | 2 / 12 | 7.9 | 6.3* | ~ | 10 | 5 / 12 |
| | | ng/L | 0.1 | 0.1** | | 11 | 2 / 12 | 1.3 | 0.5** | | 10 | 5 / 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 2.8* | 1.4 | ~ | 5.4* | 8 / 12 | 2.8* | 1.7 | ~ | 5.7* | 8 / 12 |
| _ | | mg/L | (3.5*) | | | | | (2.8*) | | | | |
| 般 | | mg/L | 3 | <1 | ~ | 7 | 0 / 12 | 3 | 1 | \sim | 7 | 0 / 12 |
| 項日 | > 4.20 EL >94 | FU/100mL | 15 | <1 | ~ | 50 | 0 / 12 | 13 | <1 | \sim | 65 | 0 / 12 |
| 目 | | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 r | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン r | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン r | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | | mg/L | | | - | | | | | - | | |
| 項目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ħ | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 12400 | 4960 | ~ | 17800 | - / 12 | 15900 | 6830 | ~ | 17800 | - / 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | | ng/L ng/m3 | | | | | | | | | | |
| の | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ιg/m3 ιS/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 月日 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン r | mg/L | | | | | | | | | · | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール r | mg/L | | | - | | | | | - | | |
| | | 100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 倍其滑 | 隹占であることか。 | 示す | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | 10 10 | | | | (2024 | 年度) |
|----|--------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------|---------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|------------|
| | 系名 | | 広島湾 | A am | | | | 広島湾 | A am | | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 32000015 (616 | | | | | 広島市環境保 32000017(61 | | | | | |
| _ | 定地点番号 | | , | 5-55) | | | | , | 8-04) | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾15 広島市地先海 | kdt: | | | | 広島湾17 広島湾 | | | | | |
| | DD等に保る環境基準類型 | | A 口 | 蚁 | | | | 広局停 ※ A イ | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | | |
| _ | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | 四周月七郎 | | | | | 四両弓礼印 | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | III 1 | | | | | III ~1 | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 插型 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 查名 | -, | | 年間 | 調査 全 | ·層 | | | 年間調査 | £ 上層 | (表層) | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m | /n |
| | 流量 r | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.1 | 7.8 | ~ | 8.8* | 3 / 24 | 8.2 | 7.8 | ~ | 8.9* | 3 . | / 12 |
| | DO r | mg/L | 8.2 | 5.7* | \sim | 11 | 7 / 24 | 8.8 | 6.2* | \sim | 12 | 2 . | / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%值) r | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 2.8* | 1.4 | \sim | 5.7* | 16 / 24 | 3.3* | 1.8 | \sim | 6.3* | 9 | / 12 |
| - | | mg/L | (3.0*) | | | | | (3.7*) | | | | | |
| 般 | | ng/L | 3 | <1 | ~ | 7 | 0 / 24 | 3 | <1 | ~ | 7 | 0 . | / 12 |
| 項目 | 5 4720 pm 594 | FU/100mL | 14 | <1 | ~ | 65 | 0 / 24 | 11 | <1 | \sim | 35* | 2 . | / 12 |
| H | | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 . | / 12 |
| | | mg/L | | | | | 1 | 0.59 | 0.11 | ~ | 1.5* | 4 . | / 12 |
| | | mg/L | | | | | 1 | 0.055* | 0.034 | ~ | 0.099* | 5 . | / 12 |
| | | mg/L | | | | | 1 | 0.002 | <0.001 | ~ | 0.004 | 0 . | / 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | - | | | | | | |
| - | | mg/L | | | | | - | <0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 2 |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | <0.0017 | <0.1 | ~ | <0.0003 | 0 | / 2 |
| | | mg/L | | | | | 1 | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 2 |
| | | mg/L | | | | | | <0.003 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | | ng/L | | | | | 1 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | | ng/L | | | | | | <0.0005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | - | ng/L | | | | | | .0.0000 | .0.0000 | | | | . <i>u</i> |
| | | ng/L | | | | | | < 0.0005 | < 0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 2 |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 日 | | mg/L | | | | · | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン r | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | - | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | - | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| H | | mg/L | | | | | | /0.005 | /0.005 | | /0.005 | | / 0 |
| 特品 | | mg/L | | | | | | <0.005 <0.1 | <0.005 | ~ | <0.005 | - | / 2 |
| 殊項 | | mg/L | | | | | + | <0.1 | <0.1 <0.1 | ~ | <0.1 | _ | / 2 |
| 日 | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | $\frac{\sim}{\sim}$ | <0.1 <0.1 | _ | / 2 |
| H | | mg/L | 14200 | 4960 | ~ | 17800 | - / 24 | 13500 | 7160 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 17900 | _ | / 12 |
| | | mg/L | 11200 | 4900 | | 11000 | / 44 | 10000 | 1100 | - | 11300 | | . 14 |
| | | ng/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | TOC I | mg/L | | | | | | | | | | | |
| そ | | ng/m3 | | | | | | | | | | | |
| の | | ι S/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | | /100mL | | | | | 1 | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 音其治 | 隹占でなることた- | 로 : | | | | | | | _ | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|-----|-------------------------|--------------|---------------|-------|--------|-------|--------|-----------------------|--------|-----|-----|-----------|
| | 系名 | | 広島湾 | A === | | | | 広島湾 | | | | |
| _ | 定機関 | | 広島市環境保 | | | | | 広島市環境係 32000017(6) | | | | |
| | 定地点番号 | | 32000017 (618 | 3-04) | | | | | 18-04) | | | |
| _ | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾17 広島湾 | | | | | 広島湾17 広島湾 | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | 広局侍 ※ Aイ | | | | | 広局停 ※ A イ | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲイ | | | | | 川イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | III /1 | | | | | III *1 | | | | |
| _ | 上生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 插型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水: | | | | | | | | | | | |
| | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | | ., | | 年間 | 調査中 | 層 | | | 年間 | 調査下 | 層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 n | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.9* | 2 / 12 | | | | | |
| | DO n | mg/L | 8.5 | 6.3* | \sim | 10 | 2 / 12 | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%值) n | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 3.1* | 1.8 | \sim | 5.7* | 7 / 12 | | | | | |
| - | | mg/L | (4.0*) | | | | | | | | | |
| 般 | | mg/L | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 | | | | | |
| 項目 | 7 (20 11 | FU/100mL | 8 | <1 | ~ | 26* | 1 / 12 | | | | | |
| [| | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | + | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 6.2 | 1.4 | ~ | 9.0 | 0 / 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | 1 | 0.4 | 1.4 | | σ.U | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン n | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン n | mg/L | | | | | | | | | | |
| ١ | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| É | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項口 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン n | mg/L | 15800 | 8370 | ~ | 17900 | - / 12 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | | ng/m3 | | | | | | | | | | |
| 他 | | ι S/cm | | | | | 1 | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール n | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数個 | 1/100mL | | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (202 | 4 年度) |
|----------|--|--------------|-----------------------|-------------|--------|----------------|---------|-----------------------|----------------|--------|-----------------|--|-------|
| | (系名 安機器 | | 広島湾 | △ ## | | | | 広島湾 | I △=## | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000017(61 | | | | | 広島県環境係 32000018(6) | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 広島湾17 | 5-04) | | | | 広島湾18 | .8-05) | | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | | |
| | OD等に係るのではめが吸名 OD等に係る環境基準類型 | | 広局停 ※ A イ | | | | | 広局停 ※ A イ | | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | | |
| | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲイ | | | | | ※ Ⅲ イ | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | III - 1 | | | | | ₩ m · 1 | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 淮類型 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 直至10~12~12年)。 11在名 | B-1-78-11. | | 年間 | 調査 🛭 | 2層 | | | 年間調 | 4 上層 | (表層) | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | n | n/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | .,,,,, | | |
| | pН | | 8.2 | 7.8 | ~ | 8.9* | 5 / 24 | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.9* | 3 | / 12 |
| | DO | mg/L | 8.7 | 6.2* | ~ | 12 | 4 / 24 | 8.4 | 6.0* | \sim | 10 | 3 | / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 3.2* | 1.8 | \sim | 6.3* | 16 / 24 | 3.2* | 1.6 | \sim | 5.5* | 8 | / 12 |
| _ | (75%値) | mg/L | (4.1*) | | | | | (4.2*) | | | | | |
| 般 | | mg/L | 3 | <1 | \sim | 7 | 0 / 24 | | | | | | |
| 項目 |) C136 E1 3/C | CFU/100mL | 10 | <1 | \sim | 35* | 3 / 24 | 2 | <1 | \sim | 6 | 0 | / 12 |
| П | 川- ペイリン 抽山初貝_加刀寺 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 | / 2 |
| | 全室素 | mg/L | 0.59 | 0.11 | ~ | 1.5* | 4 / 12 | 0.31 | 0.18 | ~ | 0.51 | 0 | / 12 |
| 1 | 全燐 | mg/L | 0.055* | 0.034 | \sim | 0.099* | 5 / 12 | 0.029 | 0.017 | ~ | 0.039 | 0 | / 12 |
| 1 | 全亜鉛 | mg/L | 0.002 | <0.001 | ~ | 0.004 | 0 / 12 | | | | | 1 | |
| 1 | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | LAS | mg/L | 6.2 | 1 4 | | 0.0 | 0 / 10 | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | (0.0003 | ~ | 9.0 | 0 / 12 | ZO 0002 | /0.0002 | | /0.0002 | 0 | / 1 |
| | カドミウム 全シアン | mg/L | <0.0017 <0.1 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 <0.1 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 1 |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | <0.1 <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.1 <0.005 | | | 0 | / 1 |
| | 六価クロム | mg/L mg/L | <0.003 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | <0.003 | <0.005 | ~ | <0.005 <0.01 | 0 | / 1 |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 |
| | アルキル水銀 | mg/L | \0.0005 | \0.0003 | | ₹0.0003 | 0 / 2 | (0.0003 | \0.0003 | | ₹0.0005 | U | / 1 |
| | PCB | mg/L | < 0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 1 |
| | ジクロロメタン | mg/L | 101000 | (0.0000 | | (0.0000 | 0 / 2 | (0.0000 | 10.0000 | | (0.0000 | | , 1 |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| _ | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| 1 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | , |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.04 | <0.01 | ~ | 0.14 | 0 | / 6 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| \vdash | 1,4-ジオキサン | mg/L | /0.005 | (0.005 | | /0.005 | / 0 | | | | | | |
| 特 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 2 | | | | | 1 | |
| 殊項 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | | | | | 1 | |
| 日 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | | | | | | |
| H | 714 | mg/L | <0.1 14700 | <0.1 | ~ | <0.1 | | | | | | 1 | |
| 1 | 塩素イオン 有機能窒素 | mg/L mg/L | 14100 | 7160 | ~ | 17900 | - / 24 | | | | | 1 | |
| 1 | 月機態室系 アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | | | | | | 0.05 | <0.01 | ~ | 0.15 | - | / 6 |
| | が 体酸能 体酸能 体酸 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | mg/L | | | | | | 0.008 | <0.003 | ~ | 0.15 | _ | / 6 |
| | TOC | mg/L | | | | | | 0.000 | \0.003 | | 0.020 | 1 | , 0 |
| そ | | mg/m3 | | | | | | 10 | 1.0 | ~ | 39 | - | / 12 |
| の | 雪气后道度 | μ S/cm | | | | | | 10 | 1.0 | | 00 | 1 | , 14 |
| 他區 | and the second of the second | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 度 | | | | | | | | | | | |
| П | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | 1 | | | | | | | | | | |
| ш | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | | 単占でなるこした | テナ | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | (2024年度) |
|----------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------|-----------|------|--------|-----------------------|---------|----------|------|----------|
| | 系名 | | 広島湾 | A am | | | | 広島湾 | 1 A 4m | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 32000018 (61) | | | | | 広島県環境係 32000018(6) | | | | |
| _ | 定地点备亏 定地点名 | | 32000018 (61) 広島湾18 | 8-05) | | | | 32000018 (6. 広島湾18 | 18-05) | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ж А Л | | | | | ж А Л | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅲ イ | | | | | ※ Ⅲ イ | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水塩 | | | | | | | | | | | |
| | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | name I. I | _ | | | | 7 Page 1 | | |
| 調 | 查名 | 34 f.J. | 平均 | | 間調査 中 | | / | 平均 | _ | 調査下 | | / |
| | | 単位 n3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | pH | 10/0 | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.6* | 2 / 12 | 7.9 | 7.7* | ~ | 8.1 | 1 / 12 |
| | | ng/L | 8.3 | 5.8* | ~ | 11 | 3 / 12 | 5.8* | 2.5* | ~ | 8.5 | 8 / 12 |
| | | ng/L | | | | | , , , | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | COD m | ng/L | 3.3* | 1.7 | ~ | 5.6* | 9 / 12 | 2.1* | 1.7 | ~ | 2.7* | 4 / 12 |
| <u> </u> | | ng/L | (4.4*) | | | | | (2.1*) | | | | |
| 般 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| り 月 | 大腸菌数 | U/100mL | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 m | ng/L | | | | | | 5.7 | 1.4 | ~ | 8.8 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン m | ng/L | | | | | | | | | | |
| Î | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L ng/L | | | | | | - | | | | |
| H | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | TOC m | ng/L | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa mg | g/m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | | S/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | 度 | | | | | | | | | | |
| i | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | - | | | | |
| | | 1g/L /100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環場 | | L 隹占でなることな | 군士 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| 水系名 広島湾 広島湾 広島湾 広島湾環境保全課 広島市環境保 | 17-01) |
|--|--|
| 測定地点番号 32000018 (618-05) 32000026 (61 測定地点名 広島湾18 広島湾26 COD等に係る尿境基準類型 ※ A イ ※ A ハ 全窒素・全燐に係る水域名 広島湾北部 広島湾北部 全窒素・全燐に係る環境基準類型 ※ III イ 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 本生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 年間調査全層 測定項目 単位 平均 流量 m3/S pH 8.1 7.7* ~ 8.9* 6 / 36 8.3 DO mg/L 7.5 2.5* ~ 11 14 / 36 9.5 BOD mg/L mg/L (75%値) 1.6 ~ 5.6* 21 / 36 3.6* COD mg/L 2.9* 1.6 ~ 5.6* 21 / 36 3.6* (4.1*) | 17-01 |
| 測定地点名 広島湾18 広島湾26 COD等に係るあてはめ水域名 広島湾 五日市・廿日市・ひ口等に係る環境基準類型 ※ A ハ 全室素・全燐に係る水域名 広島湾北部 広島湾北部 全室素・全燐に係る環境基準類型 ※ III イ IIII イ 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る係る環境基準類型 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 年間調査 全層 測定項目 単位 平均 最小 最大 m/n 平均 流量 m3/S カー 日 | 市地先海域 年間調査 上層(表層) 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| 広島湾 五日市・廿日〒 COD等に係る環境基準類型 ※ A イ ※ A ハ 全窒素・全燐に係る水域名 広島湾北部 広島湾北部 広島湾北部 広島湾北部 広島湾北部 広島湾北部 近島湾北部 世紀 大生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 大生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 年間調査 全層 東位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S pH 8.1 7.7* ~ 8.9* 6 / 36 8.3 pH 8.1 7.7* ~ 8.9* 6 / 36 8.3 pH DO mg/L 7.5 2.5* ~ 11 14 / 36 9.5 BOD mg/L (75%値) mg/L (75%値) mg/L (3.5*) 1.6 ~ 5.6* 21 / 36 3.6* (4.1*) | 年間調査 上層 (表層) 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| X A / | 年間調査 上層 (表層) 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| 全窒素・全燐に係る水域名 | 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 ※ Ⅲ イ Ⅲ イ 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 木生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S pH 8.1 7.7* ~ 8.9* 6 / 36 8.3 pO mg/L 7.5 2.5* ~ 11 14 / 36 9.5 BOD mg/L mg/L COD mg/L 2.9* 1.6 ~ 5.6* 21 / 36 3.6* (4.1*) | 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S pH 8.1 7.7* ~ 8.9* 6 / 36 8.3 DO mg/L 7.5 2.5* ~ 11 14 / 36 9.5 BOD (75%値) mg/L (3.5*) 1.6 ~ 5.6* 21 / 36 3.6* (4.1*) | 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 | 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 | 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| 調査名 年間調査 全層 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 pH 8.1 7.7* ~ 8.9* 6 / 36 8.3 DO mg/L 7.5 2.5* ~ 11 14 / 36 9.5 BOD (75%値) mg/L mg/L COD mg/L 2.9* 1.6 ~ 5.6* 21 / 36 3.6* — (75%値) mg/L (3.5*) (4.1*) | 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| 測定項目 単位 平均 最小 一 平均 流量 m3/S m3/S m3/S m3/S pH 8.1 7.7* ~ 8.9* 6 / 36 8.3 DO mg/L 7.5 2.5* ~ 11 14 / 36 9.5 BOD mg/L mg/L 0 < | 最小 ~ 最大 m/n 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| | 7.9 ~ 8.9* 3 / 12 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 6.6* ~ 15 2 / 12 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1.8 ~ 7.2* 10 / 12 |
| COD mg/L 2.9* 1.6 \sim 5.6* 21 / 36 3.6* \sim (75%(d) mg/L (3.5*) (4.1*) | 1.8 ~ 7.2* 10 / 12 |
| (75%値) mg/L (3.5*) (4.1*) | 1.0 1.2. 10 / 12 |
| | 1 |
| 10A 1== 1 | 1 ~ 10 0 / 12 |
| 項 大腸菌数 | <1 ~ 19 0 / 12 |
| I | ⟨0.5 ∼ ⟨0.5 0 / 12 |
| 全窒素 mg/L 0.31 0.18 ~ 0.51 0 / 12 0.41 | 0.21 ~ 0.59 0 / 12 |
| 全鱗 mg/L 0.029 0.017 ~ 0.039 0 / 12 0.042 | 0.024 ~ 0.087* 1 / 12 |
| 全亜鉛 mg/L 0.001 | <0.001 ∼ 0.003 0 / 12 |
| ノニルフェノール mg/L | |
| LAS mg/L | |
| 底層溶存酸素量 mg/L 5.7 1.4 ~ 8.8 0 / 12 | |
| カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 ~ <0.0003 0 / 1 <0.0017 | <0.0003 ~ <0.0003 0 / 2 |
| 全シアン mg/L <0.1 <0.1 ~ <0.1 0 / 1 <0.1 | <0.1 ~ <0.1 0 / 2 |
| 鉛 mg/L < 0.005 < 0.005 ~ (0.005 0 / 1 < 0.005 | <0.005 ~ <0.005 0 / 2 (0.01 0 / 2 |
| 六価クロム mg/L < 0.01 < 0.01 ~ < 0.01 0 / 1 < 0.01 | <0.01 ~ <0.01 0 / 2 <0.005 - <0.005 0 / 2 |
| 砒素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0 / 1 <0.005 総水銀 mg/L <0.0005 | $\langle 0.005 \rangle \sim \langle 0.005 \rangle 0 / 2$ $\langle 0.0005 \rangle \sim \langle 0.0005 \rangle 0 / 2$ |
| 総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 ~ <0.0005 0 / 1 <0.0005 アルキル水銀 mg/L | <0.0005 ~ <0.0005 0 / 2 |
| PCB | <0.0005 ~ <0.0005 0 / 2 |
| FCB | (0.0000 (0.0000) 0 / 2 |
| 四塩化炭素 mg/L | |
| 1,2-ジクロロエタン mg/L | |
| 1,1-ジクロロエチレン mg/L | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L | |
| 健 1,1,1-トリクロロエタン mg/L | |
| 康 1,1,2-トリクロロエタン mg/L | |
| 日 トリクロロエチレン mg/L | |
| テトラクロロエチレン mg/L | |
| 1,3-ジクロロプロペン mg/L | |
| チウラム mg/L | |
| シマジン mg/L | |
| チオベンカルブ mg/L | |
| ベンゼン mg/L | |
| セレン mg/L | |
| 硝酸性窒素 mg/L | |
| 亜硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.04 <0.01 | |
| 明版性 | |
| はう素 mg/L | |
| 1,4-ジオキサン mg/L | |
| AB/I | <0.005 ∼ <0.005 − / 2 |
| 特 鉄 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ | <0.1 ~ <0.1 - / 2 |
| 項 マンガン 溶解性 mg/L <0.1 | ⟨0.1 ~ ⟨0.1 - / 2 |
| 目 クロム mg/L (0.1 | ⟨0.1 ~ ⟨0.1 - / 2 |
| 塩素イオン mg/L 14900 | 7470 ~ 17600 - / 12 |
| 有機態窒素 mg/L | |
| アンモニア態窒素 mg/L 0.05 <0.01 ~ 0.15 - / 6 | |
| 燐酸態燐 mg/L 0.008 <0.003 ~ 0.025 - / 6 | |
| TOC mg/L | |
| そ クロロフィルa mg/m3 10 1.0 ~ 39 - / 12 の 最后に適中 g/m | |
| 他 世 X (公) | |
| 項 メチレンブルー活性物質 mg/L mg/L | |
| 目 濁度 度 1111 カライグ 休かな カ | |
| トリハロメタン生成能 mg/L | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L mg/L mg/L | |
| | |
| | |
| ふん便性大腸菌群数 個/100mL | 1 |

| | | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | | (2024 年度) |
|------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------|---------------|------------|-----|-----------|
| _ | 系名 | | 広島湾 | ^ =m | | | | 広島湾 | 1 ^ 400 | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 | | | | | 広島市環境保 | | | | |
| _ | 定地点备亏 定地点名 | | 32000026 (61 広島湾26 | 7-01) | | | | 32000026(6) 広島湾26 | 17-01) | | | |
| _ | た地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 五日市·廿日市 | h 世 先 海 域 | | | | 五日市・廿日 | 市地先海域 | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | ※ Aハ | 11707014450 | | | | ※ Aハ | 1117070114154 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲ イ | | | | | Ⅲ イ | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 査名 | 車類型 | | 左目 | 調査 中 | · 🖂 | | | 左目 | 1 1 1 1 | · 🖂 | |
| р/пј | | 単位 | 平均 | 最小 | 神直 + | - /世 - 最大 | m/n | 平均 | 最小 | 引調査 下 ~ | 最大 | m/n |
| | | m3/S | 15 | 对(1) | | 双八 | 111/11 | 1 **3 | AX71. | | 双八 | 111/11 |
| | рН | | 8.2 | 8.0 | ~ | 8.6* | 3 / 12 | | | | | |
| | DO 1 | mg/L | 8.7 | 7.0* | ~ | 10 | 2 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 3.3* | 1.8 | \sim | 6.4* | 9 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | (3.8*) | 2 | ~ | - | 0 / 12 | | | | | |
| 般項 | | mg/L FU/100mL | 5 | <1 | ~ | 5 14 | 0 / 12 | | | | | |
| 目 | | mg/L | , | \1 | - | 1.4 | 0 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | - | | | | | - | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | 6.3 | 2.1 | ~ | 10 | 0 / 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | - | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| _ | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | + | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| 殊項 | | mg/L | | | | | - | | | | | |
| 月 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L mg/L | 15900 | 10200 | ~ | 17600 | - / 12 | | | | | |
| | | mg/L | 10000 | 10200 | | 17000 | , 12 | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 1 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa m | ng/m3 | | | | | | | | | - | |
| 他 | | u S/cm | | | | | 1 | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 4-t-オクチルフェノール | mg/L mg/L | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | |
| | | mg/L | | | | | + | | | | | |
| | | 間/100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | 推占である~レを | 示す | | | 1 | | 1 | | | |

| _ | | | 1 . r. da + 2 | | | | | 1.1. W. C. | | | | (2024 | 年度) |
|------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|---------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------|-------|-----|
| | 系名 | | 広島湾 | △細 | | | | 広島湾 | 1 A #H | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000026 (61 | | | | | 広島市環境係 32000027(6) | | | | | |
| _ | 定地点名 定地点名 | | 広島湾26 | 7-01) | | | | 広島湾27 | 15-02) | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | | 五日市・廿日市 | h 世 先 海 域 | | | | 海田湾 | | | | | |
| _ | OD等に係る環境基準類型 | | ※ Aハ | 11707014194 | | | | ※ B ✓ | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | III 1 | | | | | ※ Ⅲ イ | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 基準類型 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | 5水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水/ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | 基準類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 査名 | | | | 調査 🛭 | | | | 年間調査 | | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/ | n |
| | 流量 | m3/S | 0.0 | | | | 2 / 24 | 0.0 | | | | | |
| | pH DO | /1 | 8.3 9.1 | 7.9 6.6* | ~ | 8.9* | 6 / 24 | 8.2 9.1 | 7.9 6.0 | ~ | 8.9* | 4 / | 12 |
| | BOD | mg/L mg/L | 9.1 | 0.0* | ~ | 15 | 4 / 24 | 9.1 | 0.0 | ~ | 12 | 0 / | 12 |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 3.5* | 1.8 | ~ | 7.2* | 19 / 24 | 3.5* | 1.6 | ~ | 6.4* | 6 / | 12 |
| | (75%値) | mg/L | (3.9*) | 1.0 | | | 10 / 44 | (4.9*) | 1.0 | | J. 1 * | | 14 |
| 般 | SS | mg/L | 4 | 1 | ~ | 10 | 0 / 24 | 3 | <1 | ~ | 10 | 0 / | 12 |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | 7 | <1 | ~ | 19 | 0 / 24 | 30 | 1 | ~ | 270 | 0 / | 12 |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / | 12 |
| | 全窒素 | mg/L | 0.41 | 0.21 | ~ | 0.59 | 0 / 12 | 0.45 | 0.20 | \sim | 0.90* | 1 / | 12 |
| 1 | 全燐 | mg/L | 0.042 | 0.024 | \sim | 0.087* | 1 / 12 | 0.050 | 0.032 | \sim | 0.11* | 2 / | 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.001 | <0.001 | ~ | 0.003 | 0 / 12 | 0.003 | 0.001 | \sim | 0.007 | 0 / | 12 |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 6.3 | 2.1 | \sim | 10 | 0 / 12 | | (0 | | 10.0 | | |
| | カドミウム | mg/L | <0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | <0.0017 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 / | 2 |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 2 | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / | 2 |
| | 4年4月1 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 2 |
| | 六価クロム | mg/L | <0.01 <0.005 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | <0.01 <0.005 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / | 2 |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 <0.0005 | ~ | <0.005 <0.0005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 <0.0005 | ~ | <0.005 <0.0005 | 0 / | 2 |
| | 総水銀 アルキル水銀 | mg/L mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | ₹0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / | 2 |
| | PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 | ~ | < 0.0005 | 0 / | 2 |
| | ジクロロメタン | mg/L | (0.0003 | \0.0003 | | ₹0.0005 | 0 / 2 | (0.0003 | \0.0003 | | ₹0.0005 | 0 / | - 4 |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| ' | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | - | | | | | |
| 1 | 亜硝酸性窒素 心酔性突素及び亜硝酸性突素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| 1 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | はう素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| p-4- | fl,4=ンカイリン 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | < 0.005 | - / | 2 |
| 特殊 | 鉄 。溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 2 |
| 項 | マンガン_溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 2 |
| 目 | クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 2 |
| | 塩素イオン | mg/L | 15400 | 7470 | ~ | 17600 | - / 24 | 14800 | 5080 | ~ | 17700 | - / | 12 |
| 1 | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | | |
| 他 | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| 1 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Ī | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | - | | | | | |
| 1 | 2, 4-ジクロロフェノール ふん便性大腸菌群数 | mg/L 個/100mL | | | | | | | | | | | |
| ı | | | | | | | | i | | | | | |

| _ | T. h. | | | | | | | 4.5 | | | | (2024 年度) |
|----------|---|------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|--------|----------------------|----------------------|-------|-----|-----------|
| | (系名 安 | | 広島湾 | △ #⊞ | | | | 広島湾 | 1 △ 1 111 | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000027(61 | | | | | 広島市環境係 32000027(6 | | | | |
| _ | 定地点名 | | 広島湾27 | 5-02) | | | | 広島湾27 | 15-02) | | | |
| _ | DE型は石 OD等に係るあてはめ水域名 | | 海田湾 | | | | | 海田湾 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ Bイ | | | | | ※ Bイ | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅲ イ | | | | | ※ Ⅲ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 進類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| 訓 | 查名 | | | 年間 | 間調査 中 | 層 | | | 年間 | 間調査 下 | 層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.2 | 7.9 | \sim | 8.6* | 2 / 12 | | | | | |
| | DO | mg/L | 8.4 | 6.3 | \sim | 10 | 0 / 12 | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 3.0 | 1.4 | \sim | 5.6* | 5 / 12 | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | (3.8*) | | | | | | 1 | | | |
| 般 | SS | mg/L | 3 | 1 | ~ | 7 | 0 / 12 | | | | | |
| 項目 |) C136 EL 300 | CFU/100mL | 33 | 1 | ~ | 310 | 0 / 12 | | | | | 1 |
| П | 11一、イリン抽山物貝_佃刀守 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 全燐 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| Ì | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | LAS | mg/L | | | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0 / 10 |
| \vdash | 底層溶存酸素量 カドミウム | mg/L mg/L | | | | | | 6.6 | 2.6 | ~ | 9.6 | 0 / 12 |
| | 全シアン | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 治 六価クロム | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| - | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | ふっ素 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | ほう素 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| <u> </u> | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ľ | 700 | mg/L | 10000 | 0500 | | 15000 | / | | 1 | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | 16300 | 8700 | ~ | 17900 | - / 12 | | - | | | |
| | 有機態窒素 アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | が が が が が は が は が は に に に に に に に に に に に に に | mg/L mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | が TOC | mg/L mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| そ | | mg/L mg/m3 | | | | | | | | | | |
| 0 | 電信 仁道中 | mg/m3 μS/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | 电水伝等及 メチレンブルー活性物質 | μ S/CIII mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | |
| H | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | 1 | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | | ## he we he we 1 .h. | <u> </u> | | | 1 | I | 1 | | | 1 |

| _ | | | 1.44.0 | | | | | T. 1. 44 - 11 | | | | (2024年 | F度) |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------|---------------|----------|-----|
| | 系名 字機問 | | 広島湾 | △ =## | | | | 広島湾 | △ #⊞ | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000027(61 | | | | | 広島市環境保 32000028(61 | | | | | |
| _ | 定地点备亏 定地点名 | | 広島湾27 | 5-02) | | | | 52000028 (6) 広島湾28 | .6-06) | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | | 海田湾 | | | | | 広島湾 | | | | | |
| _ | OD等に係る環境基準類型 | | ## B イ | | | | | ※ A イ | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅲ イ | | | | | III 1 | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | 域名 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 善類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 査名 | | | | 調査 슄 | | , | | 年間調査 | | | | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | |
| | 流量 pH | m3/S | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.9* | 6 / 24 | 8.3 | 8.0 | ~ | 8.8* | 3 / | 12 |
| | | mg/L | 8.9 | 6.0 | ~ | 12 | 0 / 24 | 9.2 | 6.7* | ~ | 11 | | 12 |
| | | mg/L | 0.5 | 0.0 | | 12 | 0 / 21 | 0.2 | 0.14 | | 11 | 2 / | 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 3.3* | 1.4 | ~ | 6.4* | 11 / 24 | 3.0* | 1.5 | \sim | 5.1* | 8 / | 12 |
| _ | | mg/L | (4.4*) | | | | | (3.7*) | | | | | |
| 般 | SS 1 | mg/L | 4 | <1 | ~ | 10 | 0 / 24 | 3 | 1 | \sim | 7 | 0 / | 12 |
| 項日 | 7 VIII (III)) V | FU/100mL | 32 | 1 | ~ | 310 | 0 / 24 | 5 | <1 | \sim | 14 | | 12 |
| 目 | | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | | 12 |
| 1 | | mg/L | 0.45 | 0.20 | ~ | 0.90* | 1 / 12 | 0.22 | 0.13 | ~ | 0.32 | | 12 |
| 1 | | mg/L | 0.050 | 0.032 | ~ | 0.11* | 2 / 12 | 0.033 | 0.015 | ~ | 0.048 | | 12 |
| | | mg/L | 0.003 | 0.001 | ~ | 0.007 | 0 / 12 | 0.001 | <0.001 | ~ | 0.003 | 0 / | 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L mg/L | 6.6 | 2.6 | ~ | 9.6 | 0 / 12 | | | | | | |
| | | mg/L | <0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 12 | < 0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | < 0.005 | <0.005 | ~ | < 0.005 | 0 / 2 | < 0.005 | < 0.005 | ~ | < 0.005 | 0 / | 2 |
| | 六価クロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | (0.0005 | /o.o.o.= | | /0.000 = | | (0.0005 | (0.000 | | /o.ooo= | 0 / | |
| | | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | - | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | - | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / | 2 |
| 殊佰 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / | 2 |
| 項目 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 2 |
| F | | mg/L | <0.1 15500 | <0.1 5080 | ~ | <0.1 17900 | - / 2 - / 24 | <0.1 15500 | <0.1 4280 | ~ | <0.1 17700 | - / | 12 |
| 1 | | mg/L mg/L | 19900 | 9000 | . ~ | 11900 | / 24 | 10000 | 4200 | | 11100 | - / | 14 |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | TOC | mg/L | | | | | | | | | | | |
| その | | ng/m3 | | | | | | | | | | | |
| の他 | | μS/cm | | | - | - | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L ¶/100mL | | | | | | | | | | | |
| Щ | 赤ん灰性人勝困群数 | | 生 占っぺま ファ しょ | ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニ | | | 1 | I | I | | | <u> </u> | |

| | | | I | | | | | I . r. de Sale | | | | (2024年月 |
|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|------------|-------|--------|----------------------|---------|--------|-------|-------------|
| _ | :系名 定機関 | | 広島湾 | | | | | 広島湾 | 2 A=== | | | |
| | 定地点番号 | | 広島市環境保 32000028(61 | | | | | 広島市環境仍 32000028(6 | | | | |
| _ | 定地点名 | | 広島湾28 | .00 / | | | | 広島湾28 | 10 00 / | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾 | | | | | 広島湾 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | ※ A イ | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲ イ | | | | | Ⅲ イ | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | 1 | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | 基準類型 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | 竞基準類型 | | fr B | B=B+ 4 | . 🖯 | | | F FI | 1=m→ - | · E | |
| 詢 | 酒 在名 | 114 f.L. | 平均 | , | 引調査 中 ~ | | / | 平均 | _ | 調査下 | | / |
| | 測定項目流量 | 単位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | pH | 1113/3 | 8.2 | 8.0 | ~ | 8.4* | 1 / 12 | 8.0 | 7.8 | ~ | 8.2 | 0 / 1 |
| | DO | mg/L | 8.6 | 6.9* | ~ | 10 | 3 / 12 | 7.7 | 5.6* | ~ | 9.7 | 5 / 1 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.9* | 1.7 | ~ | 5.5* | 8 / 12 | 1.9 | 1.3 | ~ | 2.5* | 5 / 1 |
| _ | (75%値) | mg/L | (3.3*) | | | | | (2.1*) | | | | |
| 般西 | | mg/L | 3 | <1 | ~ | 5 | 0 / 12 | 3 | 1 | ~ | 4 | 0 / 1 |
| 項目 | 5 4335 EL 594 | CFU/100mL | 16 | <1 | ~ | 150* | 1 / 12 | 8 | <1 | ~ | 71* | 1 / 1 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 全燐 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | 6.5 | 2.2 | \sim | 8.9 | 0 / 1 |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 アルキル水銀 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| /esta. | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1 //// 0 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | ほう素 1,4-ジオキサン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + |
| d.i. | 銅 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + |
| 特殊 | | mg/L | | | | | | | | | | + |
| 殊項 | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| ш | クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | 16500 | 11700 | ~ | 17900 | - / 12 | 17600 | 16100 | \sim | 18300 | - / 1 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 TOC | mg/L | | | | | | | | | | + |
| 7 | TOC クロロフィルa | mg/L | | | | | | | | | | + |
| の | 愛与仁道在 | mg/m3 μ S/cm | | | | | | | | | | + |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | μ S/cm mg/L | | | | | | | | | | + |
| 項目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | + |
| П | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン 2, 4-ジクロロフェノール ふん便性大腸菌群数 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | (20) | 24 호 | F度) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|--------|---------|---------|----------------------|---------|--------|----------|------|------|-----|
| 水系名 | | | 広島湾 | A am | | | | 広島湾 | ı A am | | | | | |
| 測定機関 | | | 広島市環境保 | | | | | 広島市環境保 | | | | | | |
| 測定地点番号 | | | 32000028 (61 広島湾28 | 8-06) | | | | 32000029(61 広島湾29 | 16-01) | | | | | |
| 側 正 地 に 名 COD等 に 係る る | ・アけみ水はタ | | 広島湾28 | | | | | 広島荷29 | i telt | | | | | |
| COD等に係るが COD等に係るが | | | 広局停 ※ A イ | | | | | 丛局印地元供 ※ A □ | | | | | | |
| 全窒素・全燐に | | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | | | |
| | 係る環境基準類型 | | Ⅲイ | | | | | Ⅲイ | | | | | | |
| | 状況の適応性に係る水域名 | Ż. | III *1 | | | | | III *1 | | | | | | |
| | 状況の適応性に係る係る環境 | | | | | | | | | | | | | |
| | ・再生産する場の適応性に任 | | | | | | | | | | | | | |
| | 再生産する場の適応性に係る環 | | | | | | | | | | | | | |
| 調査名 | | | | 年間 | 調査 🛭 | è層 | | | 年間調 | 査 上層 | (表層) | | | |
| 測定項目 | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | | m/n | |
| 流量 | | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| рН | | | 8.2 | 7.8 | ~ | 8.8* | 4 / 36 | 8.2 | 8.0 | ~ | 8.8* | 2 | / | 12 |
| DO | | mg/L | 8.5 | 5.6* | \sim | 11 | 10 / 36 | 8.8 | 6.4* | \sim | 10 | 2 | / | 12 |
| BOD | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| (75%値) | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| COD | | mg/L | 2.6* | 1.3 | \sim | 5.5* | 21 / 36 | 2.9* | 1.6 | \sim | 6.7* | 7 | / | 12 |
| (75%値) | | mg/L | (3.0*) | | | | | (3.8*) | | | | | | |
| 般 SS | | mg/L | 3 | <1 | ~ | 7 | 0 / 36 | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 | / | 12 |
| 項 大腸菌数 | 上山北京学、小、小、神 | CFU/100mL | 10 | <1 | \sim | 150* | 2 / 36 | 28* | <1 | \sim | 200* | 3 | / | 12 |
| 11 (4) 2 1 | 由出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 | / | 12 |
| 全窒素 | | mg/L | 0.22 | 0.13 | ~ | 0.32 | 0 / 12 | 0.22 | 0.13 | ~ | 0.32 | 0 | / | 12 |
| 全燐 | | mg/L | 0.033 | 0.015 | ~ | 0.048 | 0 / 12 | 0.033 | 0.014 | ~ | 0.052* | 1 | / | 12 |
| 全亜鉛 | — il. | mg/L | 0.001 | <0.001 | ~ | 0.003 | 0 / 12 | 0.002 | <0.001 | ~ | 0.006 | 0 | / | 12 |
| ノニルフェノ | -/V | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| LAS 底層溶存酸 | 表.导. | mg/L mg/L | 6.5 | 2.2 | ~ | 8.9 | 0 / 12 | | | | | 1 | | |
| 広信俗行政 カドミウム | 术 里 | mg/L | <0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 12 | < 0.0017 | <0.0003 | ~ | < 0.0003 | 0 | / | 2 |
| 全シアン | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | -/- | 2 |
| 鉛 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | -/- | 2 |
| 六価クロム | | mg/L | <0.01 | <0.00 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | <0.01 | <0.003 | ~ | <0.003 | 0 | / | 2 |
| 砒素 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | 7 | 2 |
| 総水銀 | | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | 7 | 2 |
| アルキル水気 | 根 | mg/L | 101000 | (0.0000 | | (0.0000 | 0 / 2 | (0.0000 | (0.0000 | | (0.0000 | 0 | | |
| PCB | | mg/L | <0.0005 | < 0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / | 2 |
| ジクロロメタン | / | mg/L | | | | | - / - | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロ | エタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロ | エチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジ | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健 1,1,1-トリクロ | ロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 康 1,1,2-トリクロ | ロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 目トリクロロエラ | シレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロン | エチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロ | プロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカバ | レブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| セレン | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| ふっ素 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | 1. | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキナ | アン | mg/L | /0 **= | /0.00= | | /0.00= | | (0.00= | /6.005 | | /0 00= | | , | - |
| 特銅 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - | / | 2 |
| 殊鉄。溶解性 ダンガン 溶 | 1677 ktt. | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / | 2 |
| 項 マンガン_溶: クロム | 弊性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / | 2 |
| | | mg/L | <0.1 16500 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | <0.1 14500 | <0.1 | ~ | <0.1 | _ | / | 2 |
| 塩素イオン | | mg/L | 00001 | 4280 | ~ | 18300 | - / 36 | 14000 | 3690 | ~ | 17900 | - | / | 12 |
| 有機態窒素 アンモニア能 | 6空表 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| 燐酸態燐 | 2.土不 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| TOC | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| そ クロロフィル | 1 | mg/L mg/m3 | | | | | | | | | | 1 | | |
| の 電気伝道度 | • | μ S/cm | | | | | | | | | | 1 | | |
| 他 , , , , , , , , , | 一活性物質 | μ S/ CIII mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| 項 メチレンブル 目 濁度 | 山江70月 | mg/L 度 | | | | | | | | | | 1 | | |
| トリハロメタン | 生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 4-t-オクチ | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| アニリン | - // /* | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| 2, 4-ジクロ | コフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| ふん便性大 | | 個/100mL | | | | | | | | | | | | |
| | ∞国研数 基準類型の「※」印は各水均 | | L 毎上ポセファした | | | | 1 | l . | 1 | | | 1 | | |

| _ | | | . 1 . 1 . 1 . 1 | | | | | I . I . ata sata | | | | (2024 年度) |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|-------|--------|-----------------------|----------------------|------------|-----|-----------|
| | (系名 安 | | 広島湾 | △ ## | | | | 広島湾 | 1 △ 1 111 | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000029(61 | | | | | 広島市環境係 32000029(6: | | | | |
| _ | 定地点名 | | 広島湾29 | 0-01) | | | | 広島湾29 | 10-01) | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島市地先海 | 域 | | | | 広島市地先海 | E域 | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A □ | | | | | ※ A □ | , ,, | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾北部 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲ イ | | | | | Ⅲ イ | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | 準類型 | | F-B | B=0-+ | . 🖯 | | | tr F | B==+ - | | |
| ī/i | 査名 | 単位 | 平均 | | 引調査 中 ~ | | m/n | 平均 | | 間調査 下 ~ | | m /n |
| | 測定項目流量 | 甲位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | рН | 1110/0 | 8.2 | 8.0 | ~ | 8.8* | 1 / 12 | | | | | |
| | DO | mg/L | 8.4 | 6.7* | ~ | 10 | 3 / 12 | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.9* | 1.4 | ~ | 7.0* | 6 / 12 | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | (3.8*) | | | | | | | | | |
| 般 | SS | mg/L | 3 | 2 | ~ | 6 | 0 / 12 | | | | | |
| 項目 | 2 C/100 EEE 95C | CFU/100mL | 34* | <1 | ~ | 300* | 2 / 12 | | | | | <u> </u> |
| ľ | 11一、イリン抽山物貝_佃刀守 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 | mg/L mg/L | | | | | | | - | | | |
| 1 | 三里昭 | mg/L mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | 7.0 | 3.9 | ~ | 8.8 | 0 / 12 |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB ジクロロメタン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1 /// | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| É | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジンチオベンカルブ | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | セレン | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | · | |
| 1 | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 特 | 銅 44- ×2-677-bb | mg/L | | | | | | | - | | | |
| 殊項目 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | 15800 | 5400 | ~ | 17600 | - / 12 | | 1 | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | , 15 | | | | | |
| | アンモニア能窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| 他 | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項1 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | 度 | | | | | | | 1 | | | |
| | トリハロメタン生成能 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | - | | | |
| | 4-t-オクナルフェノール アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |
| - | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | | 世上 ポナファしょ | — <u>+</u> _ | | | 1 | 1 | 1 | | | |

| | - T. h | | | | | | | | | | | (202 | 4 年度) |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------|------------|-----------------|-----------------------|---------|---------------------|--------|------|-------|
| | (系名 字 # | | 広島湾 | △ #⊞ | | | | 広島湾 | △細 | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島市環境保 32000029(61 | | | | | 広島県環境係 32000030(6) | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 広島湾29 | 0 01 / | | | | 広島湾30 | 10 31 / | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島市地先海 | 域 | | | | 広島湾 | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A □ | | | | | A 1 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 広島湾北部 | | | | | 広島湾南部 | | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲ イ | | | | | ※ Ⅱ □ | | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域 | 名 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る野 | ^{景境基準類型} | | 左囲 | 細木 / | ∠ 🖂 | | | 左明細 | 木 L.豆/ | 丰四/ | | |
| <u>i</u>)(i |]査名 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | 調査 🖆 | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | 査 上層(~ | 最大 | n | n/n |
| | 流量 | m3/S | 十秒 | 取小 | | 取八 | 111/11 | 7-80 | 取小 | | 取八 | - 11 | 1/ 11 |
| | pH | mo, c | 8.2 | 8.0 | ~ | 8.8* | 3 / 24 | | | | | | |
| | DO | mg/L | 8.6 | 6.4* | ~ | 10 | 5 / 24 | | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 3.0* | 1.4 | \sim | 7.0* | 13 / 24 | | | | | | |
| 1- | (75%値) | mg/L | (3.9*) | | | | | | | | | | |
| 般 | | mg/L | 3 | 1 | \sim | 6 | 0 / 24 | | | | | | |
| 項目 | 7 C/100 EEE 50C | CFU/100mL | 31* | <1 | \sim | 300* | 5 / 24 | | | | | | |
| | 11 ペイリン抽山物貝_加刀寺 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | 0.01 | 0.14 | ~ | 0.20- | 1 | / 10 |
| | 全霉素 | mg/L mg/L | 0.22 | 0.13 0.014 | \sim | 0.32 | 0 / 12 | 0.21 0.023 | 0.14 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.32* | 1 2 | / 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L mg/L | 0.003 | <0.001 | \sim | 0.052* | 0 / 12 | 0.023 | 0.015 | | ს.სამক | 4 | , 12 |
| | 土 里 卯 ノニルフェノール | mg/L | 0.002 | \0.001 | - | 0.000 | 0 / 12 | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 7.0 | 3.9 | ~ | 8.8 | 0 / 12 | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | < 0.0017 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | | |
| | アルキル水銀 PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L mg/L | ₹0.0005 | (0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン チオベンカルブ | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | インゼン | mg/L mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | セレン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.03 | <0.01 | ~ | 0.09 | 0 | / 6 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | - | | |
| 特 | 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / 2 | | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 2 | | | | | | |
| 月日 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 2 | 1 | | | | | |
| É | 塩素イオン | mg/L | <0.1 15100 | <0.1 3690 | ~ | <0.1 | - / 2 - / 24 | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L mg/L | 19100 | 9690 | ~ | 17900 | - / 24 | | | | | | |
| | 日機態至糸 アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | | | | | | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.03 | - | / 6 |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | 0.007 | <0.003 | ~ | 0.019 | - | / 6 |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | | |
| そ | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | 4.1 | 2.0 | ~ | 8.1 | - | / 6 |
| の組 | | μS/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | - | | | | | - | | |
| f | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | 1 | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L 個/100mL | | | | | | | 1 | | | - | |
| <u> </u> | ふん便性大腸菌群数 備考: 環境基準類型の「※」印は各水 | | <u> </u> | L | | | 1 | L | 1 | | | 1 | |

| _ | | | | | | | | | | | | (20) | 24 年 | :度) |
|-------------|--|-------------------|----------------|-------|-------|-----|--------|--|--------|--------|--------|------|------|-----|
| _ | · 系名 | | 広島湾 | A am | | | | 広島湾 | A am | | | | | |
| | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境保 | | | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 32000030 (61 | 8-51) | | | | 32000030 (61 | 8-51) | | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 広島湾30 広島湾 | | | | | 広島湾30 広島湾 | | | | | | _ |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ム局傳 A イ | | | | | ム局偽 A イ | | | | | | _ |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 広島湾南部 | | | | | 広島湾南部 | | | | | | _ |
| | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | <u>※</u> Ⅱ □ | | | | | ※ II ロ | | | | | | _ |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | X 11 □ | | | | | Ж П □ | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 生粗刑 | | | | | | | | | | | | _ |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るか | | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | | | _ |
| _ | 五五物の主心 行工座・の物の画心はに成る来発室・ | 中規土 | | 年1 | 間調査 下 | . 国 | | | 年間 - | 調査 全 | · 届 | | | |
| ци | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | 1 | m/n | _ |
| | | m3/S | 1.3 | AK 1 | | AKI | 111/11 | 15 | NX.1 | | ALI | | | _ |
| | pH | 1110, 0 | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| | | mg/L | | | | | | | | | | + | | _ |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| <u>μ</u> n. | | mg/L | | | | | | 1 | | | | 1 | | — |
| 般項 | | mg/L CFU/100mL | | | | | | | | | | 1 | | — |
| 目 | 7 VIII0 EE 9/4 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 川一、イリン抽山初貝_加刀寺 | mg/L | | | | | | 0.21 | 0.14 | ~ | 0.32* | 1 | / | 12 |
| 1 | | | | | | | | 0.21 | 0.14 | ~ | 0.32* | 2 | | 12 |
| 1 | | mg/L | | | | | - | 0.023 | 0.013 | ~ | v.uəə* | Z | / | 14 |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | - | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 6.0 | 4 = | | 0.0 | 0 / 2 | 6.0 | 4 - | | 0.0 | _ | - | _ |
| \vdash | | mg/L | 6.8 | 4.5 | ~ | 8.9 | 0 / 6 | 6.8 | 4.5 | ~ | 8.9 | 0 | / | 6 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | - | | | | 1 | | |
| | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | - | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 伷 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 康 | | mg/L | | | | | | - | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | - | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | - | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | - | | | | - | | |
| | | mg/L | | | | | | - | | | | 1 | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | - | | | | - | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | - | | | | - | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 0.00 | /0.01 | | 0.00 | ^ | | c |
| | | mg/L | | | | | | 0.03 | <0.01 | ~ | 0.09 | 0 | / | 6 |
| | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - | | |
| - | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 項日 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| П | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | ~ | | | | | _ |
| 1 | | mg/L | | | | | | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.03 | - | | 6 |
| | | mg/L | | | | | | 0.007 | <0.003 | \sim | 0.019 | - | | 6 |
| ッ | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| その | | ng/m3 | | | | | | 4.1 | 2.0 | ~ | 8.1 | - | /_ | 6 |
| 他 | 电双位得及 | μ S/cm | | | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | . | | | | | | |
| 目 | | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| L | | 圆/100mL | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| _ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 特主 》 | 伸占であること | テ-ナ- | | | - | - | | | | | _ | _ |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----------|----------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------|------|-----------|
| | 系名 | | 呉地先 | 1-5 - 29 | | | | 呉地先 | A 1> . hr | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 3300001(60 | | | | | 呉市環境試験 33000001(60 | | | | |
| _ | 定地点名 定地点名 | | 33000001 (60 呉地先1 | 0-01) | | | | 33000001 (b) 呉地先1 | 06-51) | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A 1 | → / | | | | A 1 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Πイ | | | | | Пイ | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | W/ /II. | 77 H | 年間調査 | | | , | | | 間調査 中 | | |
| | 測定項目流量 | 単位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | のに里 pH | III 3/ S | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.6* | 2 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.6* | 2 / 12 |
| | DO | mg/L | 8.3 | 4.3* | ~ | 12 | 3 / 12 | | 3.9* | ~ | 11 | 4 / 12 |
| | BOD | mg/L | 0.0 | 4.5* | | 12 | 3 / 12 | 0.0 | 0.54 | | 11 | 4 / 12 |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.1* | 1.3 | ~ | 4.6* | 3 / 12 | 1.9 | 1.2 | ~ | 4.6* | 3 / 12 |
| <u> </u> | (75%値) | mg/L | (2.0*) | | | | | (1.9*) | | | | |
| 般 | SS | mg/L | 2 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 | 2 | 1 | ~ | 3 | 0 / 12 |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | 2 | <1 | \sim | 10 | 0 / 12 | | | | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / 12 | _ | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.15 | 0.05 | \sim | 0.28 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.024 | 0.014 | ~ | 0.045* | 2 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.001 | 0.001 | ~ | 0.001 | 0 / 1 | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | LAS 底层溶方硷素具 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 カドミウム | mg/L mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | - / - | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| /esta. | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.022 | <0.005 | ~ | 0.084 | 0 / 12 | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.007 | <0.005 | ~ | 0.014 | 0 / 12 | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | - | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / 1 | | | | | |
| 殊巧 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| 項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| Ë | クロム 塩素イオン | mg/L | <0.1 16600 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 - / 12 | | | | | |
| | 塩素イオン 有機態窒素 | mg/L mg/L | 0.11 | 10400 0.03 | \sim | 18300 0.26 | - / 12 - / 12 | | 1 | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | 0.11 | <0.03 | ~ | 0.26 | - / 12 | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | 0.014 | <0.003 | ~ | 0.02 | - / 12 | | 1 | | | |
| | TOC | mg/L | - | | | | , 12 | | | | | |
| そ | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | 1 |
| の | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | - | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | l | | | | | Ī | 1 | | | i i |

| - | | | Leve | | | | | | | | | (202 | 24 年度) |
|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|------------------|---------|---------|------|--------|
| | 系名 字機即 | | 呉地先 _{巴士} 安計 | Jen / 17. | | | | 呉地先 『古母母社学 | - h- h- | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 33000001(60 | | | | | 呉市環境試験 33000001(60 | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 55000001 (60 呉地先1 | 0-91 / | | | | 55000001 (60 呉地先1 | 0-91) | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(3 | =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A 1 | | | | | A 1 | | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅱ イ | | | | | Ⅱ イ | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境。 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係 | | | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | 基準類型 | | 4-9 | D.SM | | | | | asm -L- | | | |
| 調 | 查名 | 334 644 | 平均 | | 引調査 下 | | , | 平均 | | 調査 | | _ | , |
| | 測定項目 流量 | 単位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | I | n/n |
| | pH | 1110/0 | 8.0 | 7.9 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.6* | 4 | / 36 |
| | DO | mg/L | 7.1* | 3.9* | ~ | 9.9 | 6 / 12 | 7.9 | 3.9* | ~ | 12 | 13 | / 36 |
| | BOD | mg/L | | | | | - , | | | | | | , |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.6 | 1.2 | ~ | 1.9 | 0 / 12 | 1.9 | 1.2 | \sim | 4.6* | 6 | / 36 |
| <u> </u> | (75%値) | mg/L | (1.6) | | | | | (1.9*) | | | | | |
| 般 | SS | mg/L | 2 | 1 | ~ | 4 | 0 / 12 | 2 | 1 | \sim | 5 | 0 | / 36 |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | 2 | <1 | ~ | 10 | 0 | / 12 |
| 1 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 | / 12 |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | 0.15 | 0.05 | ~ | 0.28 | 0 | / 12 |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | 0.024 0.001 | 0.014 | ~ | 0.045* | 2 | / 12 |
| | 全亜鉛 ノニルフェノール | mg/L mg/L | | | | | | 0.001 | 0.001 | ~ | 0.001 | 0 | / 1 |
| | LAS | mg/L | | | | | | | + | | | 1 | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 2 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 2 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | < 0.005 | < 0.005 | \sim | < 0.005 | 0 | / 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | \sim | < 0.01 | 0 | / 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 2 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | 1,1-ジクロロエタン | mg/L mg/L | - | | | | | | - | | | 1 | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| _ | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | セレン 四部州空事 | mg/L | | | | | | 0.022 | /0.00F | | 0.004 | 0 | / 10 |
| | 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 | mg/L mg/L | | | | | | 0.022 | <0.005 <0.005 | ~ | 0.084 | 0 | / 12 |
| | 明酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.001 | \0.000 | | 0.014 | U | / 12 |
| | いた かっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - | / 1 |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - | / 1 |
| 項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| Ħ | クロム | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | 16600 | 10400 | \sim | 18300 | - | / 12 |
| | 有機能窒素 | mg/L | | | | | | 0.11 | 0.03 | ~ | 0.26 | - | / 12 |
| | アンモニア態窒素 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | 0.01 0.014 | <0.01 <0.003 | ~ | 0.02 | - | / 12 |
| | 解酸態解 TOC | mg/L mg/L | | | | | | 0.014 | √0.003 | ~ | 0.047 | +- | / 12 |
| そ | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | + | | | 1 | |
| の | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | 濁 度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| i | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール ふん便性大腸菌群数 | mg/L | | | | | | | | | | | |

| _ | | | A A /// | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------|----------|------|-----------|
| | 系名 | | 呉地先 | 1-2-2 | | | | 呉地先 | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 33000003(60 | | | | | 呉市環境試験 33000003(60 | | | | |
| _ | 定地点备亏 定地点名 | | 33000003 (60 呉地先3 | 6-52) | | | | 33000003 (60 呉地先3 | J6-5Z) | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A 1 | → / | | | | A 1 | | | | |
| | 金素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | П / | | | | | П 1 | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | 基準類型 | | | | (1.0) | | | | man I. I | _ | |
| 誹 | 直名 | 277.71. | 77 lb | 年間調査 | | | , | 77.16 | | 間調査 中 | | , |
| | 測定項目流量 | 単位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | がL単 pH | 1113/3 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.6* | 2 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.6* | 1 / 12 |
| | DO | mg/L | 8.3 | 4.6* | ~ | 9.9 | 4 / 12 | 8.3 | 3.8* | ~ | 10 | 3 / 12 |
| | BOD | mg/L | | 110 | | 010 | 1 / 15 | | 0,0 | | | 0 / 12 |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.9 | 1.2 | ~ | 4.5* | 2 / 12 | 1.9 | 1.2 | ~ | 4.5* | 2 / 12 |
| _ | (75%値) | mg/L | (1.8*) | | | | | (1.8*) | | | | |
| 般 | | mg/L | 2 | 1 | ~ | 3 | 0 / 12 | 2 | <1 | ~ | 3 | 0 / 12 |
| 項目 |) V100 ELL 900 | CFU/100mL | 5 | <1 | \sim | 36* | 1 / 12 | | | | | |
| П | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.14 | 0.06 | ~ | 0.25 | 0 / 12 | | 1 | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.022 | 0.013 | ~ | 0.049* | 2 / 12 | | 1 | | | |
| 1 | 全亜鉛 ノニルフェノール | mg/L mg/L | 0.001 | 0.001 | ~ | 0.001 | 0 / 1 | | | | | |
| 1 | LAS | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | < 0.005 | < 0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | < 0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化灰糸 1,2-ジクロロエタン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | ベンゼン セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 硝酸性窒素 | mg/L mg/L | 0.022 | <0.005 | ~ | 0.074 | 0 / 12 | - | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.022 | <0.005 | ~ | 0.074 | 0 / 12 | | 1 | | | |
| 1 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | - , 12 | | | | | |
| 1 | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / 1 | | | | | |
| 殊 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | 1 | | | |
| 項目 | · • /• • HE/III | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| Ë | 7114 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| | 塩素イオン を操作容表 | mg/L mg/L | 16700 0.10 | 11800 0.04 | ~ | 17900 0.23 | - / 12 - / 12 | | 1 | | | |
| 1 | 有機態窒素 アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | 0.10 | <0.04 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.23 | - / 12 | | | | | |
| 1 | | mg/L | 0.01 | <0.003 | ~ | 0.01 | - / 12 | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | , 12 | | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Î | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| 1 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L 個/100mL | | | | | | | | | | |
| ட | ふん便性大腸菌群数 備考:環境基準類型の「※」印は各水域の | | ## ha -a h wr 1 -2 | | | | | 1 | 1 | | | 1 |

| _ | T 10 | | Lande | | | | | an or the | | | | (202 | 4 年度) |
|----|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|----------------|------|--------|
| | 系名 字機即 | | 呉地先 口主四倍計略 | Je> / /7. | | | | 呉地先 『古母母社学 | J-> / /7. | | | | |
| - | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 33000003(60 | | | | | 呉市環境試験 33000003(60 | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 呉地先3 | 0 32) | | | | 呉地先3 | 0 32 / | | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(3 | =) | | | | 呉地先海域(| =;) | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A 1 | / | | | | A 1 | | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Π イ | | | | | II イ | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | 基準類型 | | ケ目 | B=B+ ¬ | | | | / c BB | =m - | | | |
| 司间 | <u> </u> | 単位 | 平均 | 最小 | 引調査 ↑ ~ | <u>*</u> 最大 | m/n | 平均 | 最小 | 調査 🖆 | E/目 最大 | | n/n |
| | 流量 | #W. m3/S | 7-20 | 取小 | | 取八 | 111/11 | +≈ | 取小 | | 取八 | 1. | 11/ 11 |
| | pH | mo, b | 8.0 | 7.9 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.6* | 3 | / 36 |
| | DO | mg/L | 7.2* | 3.9* | ~ | 9.8 | 6 / 12 | 7.9 | 3.8* | ~ | 10 | 13 | / 36 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.6 | 1.1 | \sim | 2.3* | 2 / 12 | 1.8 | 1.1 | \sim | 4.5* | 6 | / 36 |
| - | (75%値) | mg/L | (1.8*) | | | | | (1.8*) | | | | | |
| 般恆 | SS | mg/L | 1 | 1 | ~ | 2 | 0 / 12 | 2 | <1 | \sim | 3 | 0 | / 36 |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | 5 | <1 | ~ | 36* | 1 | / 12 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 0.06 | ~ | <0.5 | 0 | / 12 |
| | 全 全 素 | mg/L mg/L | | | | | | 0.14 0.022 | 0.06 | ~ | 0.25 0.049* | 2 | / 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L mg/L | | | | | | 0.022 | 0.013 | \sim | 0.049* | 0 | / 12 |
| | 三里町 ノニルフェノール | mg/L | | | | | | 0.001 | 0.001 | | 0.001 | 0 | / 1 |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 | / 2 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 2 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 | / 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 2 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | PCB ジクロロメタン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ ベンゼン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.022 | < 0.005 | ~ | 0.074 | 0 | / 12 |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.008 | <0.005 | ~ | 0.026 | 0 | / 12 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | - | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - | / 1 |
| 殊佰 | 鉄、溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - | / 1 |
| 項目 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| Ë | | mg/L | | | | | | <0.1 16700 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| | 塩素イオン 有機態窒素 | mg/L mg/L | | | | | | 0.10 | 11800 0.04 | \sim | 17900 0.23 | - | / 12 |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | 0.10 | <0.04 | \sim | 0.23 | _ | / 12 |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | 0.013 | <0.003 | ~ | 0.048 | - | / 12 |
| | TOC | mg/L | | | | | | _ | | | | | |
| そ | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Î | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | アニリン 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | 1 | I | | | | | 1 | | | ĺ | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|--|-------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 水系名 | | 呉地先 | | | | | 呉地先 | ^ 1 · 1- | | | |
| 測定機関 | | 呉市環境試験 33000005(60 | | | | | 呉市環境試験 3300005(60 | | | | |
| 測定地点番号 測定地点名 | | 33000003 (60 呉地先5 | J0-01) | | | | 33000005 (b) 呉地先5 | 06-01) | | | |
| COD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(| =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | |
| COD等に係る環境基準類型 | | ※ A ✓ | | | | | ※ A イ | → / | | | |
| 全窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Πイ | | | | | Πイ | | | | |
| 水生生物の生息状況の適応性に係るオ | 〈域名 | | | | | | | | | | |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る係る | る環境基準類型 | | | | | | | | | | |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応付 | | | | | | | | | | | |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係 | る環境基準類型 | | F BB ≅W ¬ | - I = | (+ D) | | | ケロ | B=m + .b. | R | |
| 調査名 | 単位 | 平均 | 年間調査 | 全上僧 | | m /n | 平均 | _ | 問蓋 中 ∼ | | m /n |
| 測定項目流量 | #1½ m3/S | 十均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 十均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| pH | ino, s | 8.1 | 7.8 | ~ | 8.6* | 1 / 12 | 8.1 | 7.8 | ~ | 8.6* | 1 / 12 |
| DO | mg/L | 8.2 | 4.5* | \sim | 9.7 | 3 / 12 | 8.3 | 4.3* | ~ | 9.8 | 2 / 12 |
| BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| COD | mg/L | 2.0 | 1.2 | \sim | 4.3* | 2 / 12 | 2.0 | 1.4 | \sim | 4.4* | 2 / 12 |
| (75%値) | mg/L | (1.9*) | | | | | (2.0*) | | | | |
| 般 SS 項 大腸菌数 | mg/L CFU/100mL | 1 | <1 | ~ | 2 | 0 / 12 | 2 | <1 | ~ | 3 | 0 / 12 |
| 耳 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/L | 9 <0.5 | <1 <0.5 | ~ | 87* <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| 1-ペキザン抽口物質_油分等 全窒素 | mg/L mg/L | 0.16 | 0.09 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.26 | 0 / 12 | | | | | |
| 全燐 | mg/L | 0.16 | 0.09 | ~ | 0.051* | 3 / 12 | | | | | |
| 全亜鉛 | mg/L | 0.003 | 0.003 | ~ | 0.003 | 0 / 1 | | | | | |
| ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| LAS | mg/L | | | | | | | | | | |
| 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 2 | | | | | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| 六価クロム | mg/L | <0.01 <0.005 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | | | | | |
| 砒素 総水銀 | mg/L mg/L | <0.005 | <0.005 <0.0005 | ~ | <0.005 <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| アルキル水銀 | mg/L | 10.0003 | \0.0003 | | ₹0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン 健 1.1 1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| is 1,1,1 1//// | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| セレン | mg/L | | 1 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | mg/L | | - | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L mg/L | | 1 | | | | | | | | |
| 明酸性量素及び亜明酸性量素 ふっ素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| ほう素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 1 | | | | | |
| 殊 鉄 溶解性 項 マンガン 溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| 目クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| 塩素イオン | mg/L | 16900 | 12900 | \sim | 18200 | - / 12 | 16900 | 12700 | ~ | 18100 | - / 12 |
| 有機態窒素 アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | | 1 | | | | | | | | |
| が が が が が が が に が に が に が に に に に に に に に に に に に に | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| の電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | |
| 他 メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | 1 | | | | | | | | |
| アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L 個/100mL | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 備者・環境基準類型の「※」印は名 | | 1 | 1 | | | 1 | L | | | | 1 |

| _ | | | | | | | | Leve | | | | (2024 | 年度 |
|----------|---|------|--------------------------|--------|-----|-------|--------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|-------|----|
| _ | :系名 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (*********************************** | | 呉地先 | 1-2-27 | | | | 呉地先 | 1-2-27 | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験· 33000005 (606 | | | | | 呉市環境試験 33000005(60 | | | | | |
| _ | 定地点名 定地点名 | | 33000005 (606 呉地先5 | 5-01) | | | | 33000005 (60 呉地先5 | 0-01) | | | | |
| - | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地元3 呉地先海域(三 | -) | | | | 呉地先海域(| =) | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ Aイ | -/ | | | | ※ A イ | → / | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | _ | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II イ | | | | | Пイ | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | i型 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | [型 | | | | | | | | | | | |
| 訓 | <u> </u> 查名 | | | | 調査下 | | , | 77.16 | | 調査 组 | | , | |
| | 測定項目単 | | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/ı | n |
| | 流量 m3 pH | /5 | 8.0 | 7.9 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.8 | ~ | 8.6* | 2 / | 36 |
| | DO mg | ·/I | 7.3* | 4.4* | ~ | 9.5 | 5 / 12 | 7.9 | 4.3* | ~ | 9.8 | 10 / | 36 |
| | BOD mg | | 1.0** | 4.4* | | 3.0 | 3 / 12 | 1.5 | 4.5* | | 5.0 | 10 / | 30 |
| | (75%值) mg | | | | | | | | | | | | |
| | COD mg | | 1.6 | 1.0 | ~ | 2.2* | 1 / 12 | 1.9 | 1.0 | ~ | 4.4* | 5 / | 36 |
| <u> </u> | (75%值) mg | | (1.7*) | | | | , | (1.8*) | | | | - / | 0 |
| 般 | | | 2 | <1 | ~ | 3 | 0 / 12 | 2 | <1 | ~ | 3 | 0 / | 36 |
| 項 | 大腸菌数 CFU/i | _ | | | | | | 9 | <1 | ~ | 87* | 1 / | 12 |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg | /L | | | | | | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / | 12 |
| | 全窒素 mg | | | - | | - | | 0.16 | 0.09 | \sim | 0.26 | 0 / | 12 |
| | 全燐 mg | | | | | | | 0.028 | 0.016 | \sim | 0.051* | 3 / | 12 |
| Ì | 全亜鉛 mg | /L | | | | | | 0.003 | 0.003 | \sim | 0.003 | 0 / | 1 |
| | ノニルフェノール mg | | | | | | | | | | | | |
| Ì | LAS mg | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 底層溶存酸素量 mg | | | | | | | /0.00 | / | | /0.00 | | |
| Ì | カドミウム mg | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / | 2 |
| Ì | 全シアン mg | | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / | 2 |
| | 鉛 mg 京価なける mg | | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / | 2 |
| 1 | 六価クロム mg W 表 | | | | | | | <0.01 <0.005 | <0.01 <0.005 | ~ | <0.01 | 0 / | 2 |
| 1 | 砒素mg総水銀mg | | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 <0.0005 | 0 / | 2 |
| | 形が歌 mg アルキル水銀 mg | | | | | | | ₹0.0005 | (0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / | 2 |
| 1 | PCB mg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ジクロロメタン mg | _ | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg | _ | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg | _ | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | | |
| 月 | トリクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg | /L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg | /L | | | | | | | | | | | |
| 1 | シマジン mg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ mg | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン mg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン mg | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | | |
| Ì | 亜硝酸性窒素 mg 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | | |
| Ì | | _ | | | | | | | | | | | |
| Ì | ふっ素 mg ほう素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | Ing 1,4-ジオキサン mg | | | | | | | | | | | | |
| pl.i. | 1,4=シオギリン mg 銅 mg | / L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | < 0.005 | - / | 1 |
| 特殊 | | | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | _ |
| 殊項 | マンガン_溶解性 mg | _ | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 |
| 目 | クロム mg | | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 |
| | 塩素イオン mg | | 17600 | 16700 | ~ | 18500 | - / 12 | 17100 | 12700 | ~ | 18500 | - / | 36 |
| | 有機態窒素 mg | _ | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 mg | /L | | | | | | | | | | | |
| | TOC mg | | | | | | | | | | | | |
| そか | クロロフィルa mg/ | _ | | - | | | | | | | - | | |
| の他 | 电双体导及 4.3 | /cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 mg | | | | | | | | | | | | |
| Ħ | 濁度 厚 | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | 4-t-オクチルフェノール mg | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | アニリン mg | | | | | | | | | | | | |
| i | 2, 4-ジクロロフェノール mg | | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 個/10 | 00mL | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | (202 | 24 4 | 年度) |
|----------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|----------|--------|-------|------|------|-----|
| _ | · 系名 | | 呉地先 | 1 | | | | 呉地先 | ^ 1 · 1- | | | | | |
| | 定機関 | | 呉市環境試験 | | | | | 呉市環境試験 | | | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 33000007 (60 | 5-02) | | | | 33000007 (6 | 06-02) | | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先7 呉地先海域(3 | =) | | | | 呉地先7 呉地先海域(| =1 | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | 共地元(#域(□ ※ A イ | _) | | | | | 二) | | | | | |
| _ | ○D等に床る床現室中類至 ・室素・全燐に係る水域名 | | メ A 7 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | | |
| | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | 八元四次 | | | | | 川イ | | | | | _ | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | П -1 | | | | | 11 *1 | | | | | _ | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 維粗型 | | | | | | | | | | | _ | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | | _ | |
| _ | | , | | 年間調査 | 上層 | (表層) | | | 年間 | 調査中 | 層 | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | 1 | m/r | 1 |
| | | m3/S | | .,,, | | | | | | | .,,,, | | | |
| | pH | | 8.1 | 7.8 | ~ | 8.6* | 1 / 12 | 8.1 | 7.8 | ~ | 8.5* | 1 | / | 12 |
| | DO | mg/L | 8.1 | 4.1* | \sim | 9.6 | 4 / 12 | 7.9 | 3.1* | ~ | 9.7 | 5 | / | 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.0 | 1.2 | \sim | 4.5* | 3 / 12 | | 1.1 | ~ | 4.5* | 4 | / | 12 |
| 1- | | mg/L | (1.9*) | | | | | (2.1*) | | | | | | |
| 般 | | mg/L | 2 | 1 | \sim | 4 | 0 / 12 | | 1 | \sim | 5 | 0 | / | 12 |
| 項目 | 7 (10) EL 9/4 | FU/100mL | 10 | <1 | ~ | 34* | 2 / 12 | | | | | | | |
| П | 川一、イリン抽山初貝_佃刀寺 | mg/L | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / 12 | | | | | | | |
| | | mg/L | 0.16 | 0.08 | \sim | 0.30 | 0 / 12 | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | 0.027 | 0.016 | \sim | 0.057* | 3 / 12 | | | | | 1 | | |
| 1 | | mg/L | 0.004 | 0.004 | \sim | 0.004 | 0 / 1 | | | | | 1 | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | Z0.0002 | <0.0003 | ~ . | /0.0002 | 0 / 2 | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | <0.0003 <0.1 | <0.0003 | ~ | <0.0003 <0.1 | 0 / 2 | 1 | | | | 1 | | |
| | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | <0.003 | <0.005 | ~ | <0.003 | 0 / 2 | | | | | | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | | | |
| | | mg/L | (0.0000 | \0.0003 | | (0.0003 | 0 / 2 | | | | | | _ | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 月 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| \vdash | ATT | mg/L | /0.005 | /0.005 | | /0.005 | _ / • | | | | | 1 | | |
| 特础 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 1 | | | | | | | |
| 殊項 | | mg/L | 0.1 | 0.1 | ~ | 0.1 | , - | | | | | | | |
| 日 | TO SEE SEEDING IN | mg/L | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | ~ | <0.1 <0.1 | - / 1 | 1 | | | | | | |
| H | | mg/L mg/L | 16600 | 12100 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 17700 | - / 12 | 16800 | 12400 | ~ | 17700 | _ | 7 | 12 |
| 1 | | mg/L | 10000 | 14100 | | 11100 | / 12 | 10000 | 14400 | | 11100 | H | | 14 |
| 1 | | mg/L | | | | | | 1 | | | | 1 | _ | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | |
| そ | | ng/m3 | | | | | | | | | | | _ | |
| の | | u S/cm | | | | | | | | | | | _ | |
| 他項 | 17 | mg/L | | | | | | | | | | | _ | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 周/100mL | | | | | | | | | | | | |
| _ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 4. 住谷里 | 年上 ポモファした | =+ | | _ | | _ | | | _ | | _ | |

| | | | | | | | | 10 10 | | | | (2024年 | 度) |
|----------|---|--------------|------------------------|--------|--------|-------|--------|-----------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------|
| 水系名 | | | 呉地先 | 1-2-27 | | | | 呉地先 | 1-2-27 | | | | _ |
| 測定機 | i网 l点番号 | | 呉市環境試験 33000007(606 | | | | | 呉市環境試験 33000007(60 | | | | | |
| 測定地 | | | 33000007 (600 呉地先7 | 5-02) | | | | 33000007 (60 呉地先7 | 10-02) | | | | |
| | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 呉地先海域(三 | :) | | | | 呉地先海域(| =) | | | | \dashv |
| | に係る環境基準類型 | | ※ A イ | -/ | | | | ※ A ſ | | | | | \dashv |
| | ・・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | \dashv |
| | ・全燐に係る環境基準類型 | | II イ | | | | | II / | | | | | \neg |
| | 物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | \neg |
| | 物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 準類型 | | | | | | | | | | | |
| | 物の生息・再生産する場の適応性に係るな | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物 | の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | | |
| 調査名 | 1 | | | 年間 | 調査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 🛭 | 2層 | | \Box |
| 測定 | 三項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | |
| 流量 | ŧ | m3/S | | | | | | | | | | | |
| pН | | | 8.0 | 7.8 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.8 | \sim | 8.6* | 2 / 3 | 36 |
| DO | | mg/L | 7.0* | 3.2* | ~ | 9.4 | 6 / 12 | 7.7 | 3.1* | \sim | 9.7 | 15 / 3 | 36 |
| BOI | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| (75% | " . | mg/L | | | | | | | | | | | |
| COI | | mg/L | 1.8 | 1.1 | \sim | 5.1* | 1 / 12 | 2.0 | 1.1 | \sim | 5.1* | 8 / 3 | 36 |
| (75% | 6值) | mg/L | (1.9*) | | | | | (2.1*) | | | | | |
| 般 SS | | mg/L | 2 | 1 | ~ | 7 | 0 / 12 | 2 | 1 | ~ | 7 | | 36 |
| | 易菌数 | CFU/100mL | | | | | | 10 | <1 | \sim | 34* | | 12 |
| 11-4 | 、キサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | | 12 |
| 全室 | | mg/L | | | | | 1 | 0.16 | 0.08 | \sim | 0.30 | | 12 |
| 全燃 | | mg/L | | | | | | 0.027 | 0.016 | \sim | 0.057* | | 12 |
| 全里 | | mg/L | | | | | | 0.004 | 0.004 | \sim | 0.004 | 0 / | 1 |
| | ルフェノール | mg/L | | | | | 1 | | | | | - | _ |
| LAS | | mg/L | | | | | | | | | | | _ |
| | 弱溶存酸素量 S.ウ.t. | mg/L | | | | | 1 | <0.0003 | /0.0000 | | /0.0000 | 0 / | 9 |
| | ミウム | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 <0.1 | ~ | <0.0003 <0.1 | | 2 |
| _ | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | | | | |
| 鉛 | Tクロム | mg/L mg/L | | | | | | <0.003 | <0.005 | ~ | <0.005 <0.01 | | 2 |
| 八加 砒素 | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | | 2 |
| 総オ | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | | 2 |
| | キル水銀 | mg/L mg/L | | | | | | ₹0.0005 | (0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / | 2 |
| PCE | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| | 11人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人 | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| | -ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| | -ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| | -1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| | 1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| 康 , , | 2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| 坦一 | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| j | ラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| | -ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| | ラム | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| _ | ジン | mg/L | | | | | | | | | | | - |
| | ベンカルブ | mg/L | | | | | 1 | | | | | | _ |
| | イゼン | mg/L | | | | | | | | | | | _ |
| セレ | | mg/L | | | | | | | | | | | _ |
| 1 - | 後性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | _ |
| | 肖酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | _ |
| | 後性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 80 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| ほう | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | -ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | \exists |
| 特銅 | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / | 1 |
| 殊 鉄 | 容解性 | mg/L | | | | | | 0.1 | 0.1 | \sim | 0.1 | - / | 1 |
| 項マン | ガン_溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / | 1 |
| 目クロ | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 |
| 塩素 | ミイオン | mg/L | 17500 | 16700 | ~ | 18000 | - / 12 | 17000 | 12100 | ~ | 18000 | - / 3 | 36 |
| 有機 | &態窒素 | mg/L | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| | モニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| TOO | C | mg/L | | | | | | | | | | | |
| n | ロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | | |
| 411 | [伝導度 | μ S/cm | | _ | - | _ | | | | | | | |
| 恒メチ | レンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 日 濁度 | | 度 | | | | | | | | | | | |
| | ハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | -オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | リン | mg/L | | | | | | | | | | |] |
| _ | 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| ふん | 便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | | |
| | プ 民主 ス 協圏 杆 数 言: 環境 基準類型の「※」 印は 各 水 域 の 3 | | 生占づもステした。 | テオ | | | 1 | 1 | 1 | | | | _ |

| | | | | | | | | 10 10 | | | | (2024 年度) |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|----------|--------|-------|-----------|
| _ | 系名 | | 呉地先 | 1. 2 | | | | 呉地先 | V 1 . 3- | | | |
| _ | 定機関 | | 呉市環境試験 33000010(60 | | | | | 呉市環境試験 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | , | b-03) | | | | 33000010(60 呉地先10 | 06-03) | | | |
| | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先10 呉地先海域(3 | =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | |) | | | | | _) | | | |
| | 金素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | 八四八四級 | | | | | 八元四級 Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | п и | | | | | 11 /1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | 上進類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係 | | | | | | | | | | | |
| | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年間調査 | 至 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | 7層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | .,,, | | .,,,, | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 7.9 | \sim | 8.6* | 1 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.6* | 1 / 12 |
| | DO | mg/L | 8.2 | 4.6* | \sim | 9.9 | 2 / 12 | 8.3 | 4.4* | ~ | 9.8 | 2 / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.0 | 1.4 | \sim | 4.0* | 3 / 12 | 2.0 | 1.2 | \sim | 4.3* | 3 / 12 |
| <u> </u> | (75%値) | mg/L | (2.0*) | | | | | (1.9*) | | | | |
| 般 | SS | mg/L | 2 | 1 | \sim | 3 | 0 / 12 | 2 | <1 | \sim | 4 | 0 / 12 |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | 3 | <1 | \sim | 7 | 0 / 12 | | | | | |
| | 川- ペイリン抽山初貝_佃刀守 | mg/L | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.14 | 0.06 | ~ | 0.26 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.025 | 0.017 | ~ | 0.050* | 2 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.003 | 0.003 | ~ | 0.003 | 0 / 1 | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | /0.0000 | /0.0000 | | /0.00°° | 0 / 1 | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | + |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | + |
| | アルキル水銀 PCB | mg/L mg/L | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | \sim | <0.0005 <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | ₹0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | + |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項日 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| П | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 1 | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | 0.1 | 0.1 | \sim | 0.1 | - / 1 | | | | | |
| 項日 | マンガン_溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| П | クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | 16800 | 12600 | ~ | 17800 | - / 12 | 16900 | 12600 | ~ | 18000 | - / 12 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | - | | | | |
| | 燐酸態 燐 | mg/L | | | | | | - | | | | |
| .z- | TOC | mg/L | | | | | | - | | | | |
| て の | クロロフィルa 赤与に逆中 | mg/m3 | | | | | 1 | | | | | |
| 他 | 电双位得及 | μ S/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L ⊯ | | | | | | | | | | |
| 日 | 濁度 トルカロメケンと中部 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L 個/100mL | | | | | | - | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | | <u> </u> | | | | 1 | I | 1 | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | (2024 | 年度) |
|----------|-------------------------|--------------|------------------------|----------|--------|-------|--------|------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|------|
| | :系名 | | 呉地先 | 1-3 - 27 | | | | 呉地先 | 1-2-27 | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 33000010(600 | | | | | 呉市環境試験 33000010(60 | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 呉地先10 | 5-03) | | | | 53000010 (60 呉地先10 | 10-03) | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | -/ | | | | ※ A イ | | | | | |
| | 金素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | II 1 | | | | | II 1 | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 準類型 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るな | | | | | | | | | | | | |
| 水生 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 査名 | | | 年間 | 間調査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 🛭 | 全層 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m | /n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.0 | 7.9 | \sim | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | \sim | 8.6* | 2 , | / 36 |
| | DO | mg/L | 7.3* | 4.3* | ~ | 9.5 | 6 / 12 | 7.9 | 4.3* | \sim | 9.9 | 10 , | / 36 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.6 | 1.0 | \sim | 2.2* | 3 / 12 | 1.9 | 1.0 | \sim | 4.3* | 9 , | / 36 |
| - | (75%値) | mg/L | (1.7*) | | | | | (1.9*) | | | | | |
| 般 | | mg/L | 2 | 1 | ~ | 3 | 0 / 12 | 2 | <1 | ~ | 4 | 0 , | / 36 |
| 項目 | 7 V100 EE 9/V | CFU/100mL | | | | | | 3 | <1 | ~ | 7 | 0 , | / 12 |
| Н | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 , | / 12 |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | 1 | 0.14 | 0.06 | ~ | 0.26 | 0 , | / 12 |
| | 全燐 | mg/L | | | | | 1 | 0.025 | 0.017 | ~ | 0.050* | 2 , | / 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | 1 | 0.003 | 0.003 | ~ | 0.003 | 0 , | / 1 |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | LAS 序层次方确主具 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| \vdash | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | 1 | /0.0000 | /0.0000 | | /0.0000 | 0 | / 0 |
| | カドミウム 全シアン | mg/L | | | | | | <0.0003 <0.1 | <0.0003 <0.1 | ~ | <0.0003 <0.1 | 0 , | / 2 |
| | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | | | | |
| | 鉛 六価クロム | mg/L mg/L | | | | | | <0.003 | <0.005 | ~ | <0.005 <0.01 | 0 , | / 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | 総水銀 | | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | PCB | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | (0.0003 | ₹0.0005 | | (0.0000 | 0 , | / 4 |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Н | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - , | / 1 |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | 0.1 | 0.1 | ~ | 0.1 | - , | / 1 |
| 項 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - , | / 1 |
| 目 | クロム | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - , | / 1 |
| | 塩素イオン | mg/L | 17600 | 16600 | ~ | 18900 | - / 12 | 17100 | 12600 | \sim | 18900 | - , | / 36 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μ S/cm | | | - | | | | | | | | |
| 旭項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| L | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の野 | | L 惟占である►レか | | | | 1 | l | 1 | | | | |

| _ | | | Lews | | | | | Lace | | | | (2024 年度) |
|----|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| | 系名 | | 呉地先 口志四倍計略 | Jen 7 17. | | | | 具地先 口主母母 計画 | 4.14.4 | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 33000015(60 | | | | | 呉市環境試験 33000015(6 | | | | |
| _ | 定地点名 | | 33000015 (60 呉地先15 | 0-04) | | | | 呉地先15 | 06-04) | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | / | | | | ※ Aイ | → / | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | |
| _ | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境を | 基準類型 | | | | (1.17) | | | t 17 | nem I. I | | |
| 誹 | 査名 | W 11. | 77 lb | 年間調査 | | | , | Ti lb | | 間調査 中 | | , |
| _ | 測定項目 流量 | 単位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | が、基 pH | 1113/3 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.6* | 1 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.5* | 1 / 12 |
| | DO | mg/L | 8.4 | 5.9* | ~ | 9.7 | 2 / 12 | | 4.6* | ~ | 10 | 2 / 12 |
| | BOD | mg/L | | 010 | | 0.1 | 5 , 11 | | 110 | | 10 | 2 / 15 |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.9 | 1.2 | ~ | 4.0* | 2 / 12 | 1.8 | 1.1 | ~ | 3.9* | 2 / 12 |
| _ | (75%値) | mg/L | (1.8*) | | | | | (1.8*) | | | | |
| 般 | SS | mg/L | 2 | 1 | \sim | 4 | 0 / 12 | | <1 | \sim | 3 | 0 / 12 |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | 110* | <1 | ~ | 1300* | 1 / 12 | | | | | 1 |
| П | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | 1 |
| 1 | 全窒素 | mg/L | 0.13 | 0.05 | ~ | 0.25 | 0 / 12 | | 1 | | | 1 |
| | 全燐 | mg/L | 0.023 0.001 | 0.013 | ~ | 0.047* | 2 / 12 | | | | | 1 |
| | 全亜鉛 ノニルフェノール | mg/L mg/L | 0.001 | 0.001 | ~ | 0.001 | 0 / 1 | | | | | + |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | < 0.0003 | < 0.0003 | ~ | < 0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | < 0.005 | <0.005 | ~ | < 0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | < 0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化灰糸 1,2-ジクロロエタン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | 1 | | | | |
| 1 | ベンゼン セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L mg/L | 0.019 | <0.005 | ~ | 0.098 | 0 / 12 | , | | | | + |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.013 | <0.005 | ~ | 0.098 | 0 / 12 | | | | | + |
| 1 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | - , 12 | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / 1 | | | | | |
| 殊 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | _ | | | | 1 |
| 項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| Ë | クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | _ | 10000 | | 10100 | / 10 |
| | 塩素イオン 有機態窒素 | mg/L mg/L | 16900 0.09 | 12700 0.03 | ~ | 18500 0.21 | - / 12 - / 12 | _ | 12600 | ~ | 18100 | - / 12 |
| 1 | 月機態室系 アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | 0.09 | <0.03 | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | 0.21 | - / 12 | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | 0.012 | 0.003 | ~ | 0.045 | - / 12 | | | | | |
| 1 | TOC | mg/L | 1.6 | 1.1 | ~ | 2.7 | - / 6 | | | | | |
| そ | クロロフィルa | mg/m3 | 2.0 | 0.5 | ~ | 6.8 | - / 12 | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | - | | | | | | |
| Î | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| 1 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | アニリン | mg/L | | | | | | 1 | 1 | | | - |
| 1 | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | 1 | | | | |
| ı | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | 単点であることを | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (202 | 4 年度) |
|-------|---|-------------------|--------------------------|------------|--------|-------|--------------|--|--|---------------------|---------|--|-------|
| | 系名 | | 呉地先 _{巴志德辞計略} | Jen 77. | | | | 呉地先 口主四倍計略 | - J-> / /7. | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 33000015 (606 | | | | | 呉市環境試験 33000015(60 | | | | | |
| | 定地点名 定地点名 | | 33000015 (600 呉地先15 | 0-04) | | | | 33000015 (60 呉地先15 | 0-04) | | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | =) | | | | 呉地先海域(三 | =) | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | → / | | | | ※ A イ | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | ま準類型 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | | |
| 水! | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境: | 基準類型 | | | | | | | | | | | |
| 誹 | 查名 | | | 年間 | 調査下 | 7層 | | | 年間 | 調査 🛭 | 2層 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m | ı/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.0 | 7.8 | \sim | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.8 | \sim | 8.6* | 2 | / 36 |
| | DO | mg/L | 7.2* | 4.3* | \sim | 10 | 6 / 12 | 8.0 | 4.3* | \sim | 10 | 10 | / 36 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.5 | 1.1 | \sim | 2.0 | 0 / 12 | 1.7 | 1.1 | \sim | 4.0* | 4 | / 36 |
| | (75%値) | mg/L | (1.7) | | | | 0 / 10 | (1.8*) | | | | | / 00 |
| 般項 | SS 上眼苹粉 | mg/L CFU/100mL | 2 | 1 | ~ | 4 | 0 / 12 | 2 | <1 | ~ | 12004 | 0 | / 36 |
| 月 | 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質」油分等 | | | | | | | 110* <0.5 | <1 <0.5 | ~ | 1300* | 0 | / 12 |
| | n-ペキザン抽口物質_油分等 全窒素 | mg/L mg/L | 0.13 | 0.05 | ~ | 0.24 | 0 / 12 | 0.13 | 0.05 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.25 | 0 | / 12 |
| | 全燐 | mg/L mg/L | 0.13 | 0.05 | ~ | 0.24 | 4 / 12 | 0.13 | 0.05 | \sim | 0.25 | 6 | / 24 |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.021 | 0.010 | | 0.000 | 4 / 12 | 0.023 | 0.013 | ~ | 0.000* | 0 | / 24 |
| | 三里町 ノニルフェノール | mg/L | <u> </u> | | | | + | 0.001 | 0.001 | | 0.001 | - | , 1 |
| | LAS | mg/L | | | | | + | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 5.9 | 1.7 | ~ | 9.8 | 0 / 12 | 5.9 | 1.7 | ~ | 9.8 | 0 | / 12 |
| | カドミウム | mg/L | | 1.1 | | | 7 / 12 | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 2 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | + | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 2 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | 1 | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 | / 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | - | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 2 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | |
| fr:to | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | 1 | | | | | <u> </u> | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | ₩ | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | + | - | | | | _ | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | + | - | | | | _ | |
| 1 | チウラム | mg/L | | | | | + | - | | | | - | |
| | シマジン チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | - | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | + | + | | | | - | |
| | セレン | mg/L mg/L | | | | | + | 1 | | | | - | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.019 | <0.005 | ~ | 0.059 | 0 / 12 | 0.019 | <0.005 | ~ | 0.098 | 0 | / 24 |
| | 一 一 一 可 的 的 性 空 素 | mg/L | 0.019 | <0.005 | ~ | 0.059 | 0 / 12 | 0.019 | <0.005 | ~ | 0.098 | 0 | / 24 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 3.000 | 10.000 | | 5.021 | 0 / 14 | 3.000 | .0.000 | | 5.021 | <u> </u> | , 21 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | + | † | | | | + | |
| 1 | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | † | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | † | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - | / 1 |
| 特殊 | | mg/L | | | | | 1 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| 項 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | - | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - | / 1 |
| 目 | クロム | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| | 塩素イオン | mg/L | 17600 | 16800 | ~ | 18100 | - / 12 | 17200 | 12600 | ~ | 18500 | - | / 36 |
| | 有機態窒素 | mg/L | 0.09 | 0.03 | ~ | 0.16 | - / 12 | 0.09 | 0.03 | \sim | 0.21 | - | / 24 |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.04 | - / 12 | 0.01 | <0.01 | \sim | 0.04 | - | / 24 |
| | 燐酸態燐 | mg/L | 0.017 | 0.005 | ~ | 0.045 | - / 12 | 0.015 | 0.003 | \sim | 0.045 | - | / 24 |
| | TOC | mg/L | | | | | | 1.6 | 1.1 | ~ | 2.7 | - | / 6 |
| その | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | 2.0 | 0.5 | \sim | 6.8 | - | / 12 |
| の他 | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | |
| 目 | 濁度 | 度 | ļ | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | | | | i | 1 | | | | |
| 1 | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | I | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------|--------|---------|----------|---------------|---|---------|-------|-----------------------|
| | 系名 | | 呉地先 | 1-2-2- | | | | 呉地先 | . 1-> . 2- | | | |
| _ | 定機関 | | 呉市環境試験 | | | | | 呉市環境試験 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 33000019 (60 | 6-05) | | | | 33000019 (60 | 05) | | | |
| _ | 定地点名 | | 呉地先19 | -\ | | | | 呉地先19 | | | | |
| | OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | _) | | | | 呉地先海域(| <u>=)</u> | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | ※ A ✓ | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II イ | | | | | II イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | Ballo Opplia street and of | <u></u> | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係 | | ļ | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 *** 7 | 基準類型 | | he oo see 1 | 2 1 🗁 | (+==) | | | L | 3 502 ' | . 🖂 | |
| 調 | 查名 | 202.21 | 77.16 | 年間調査 | | | | 77.15 | | 間調査 中 | | , |
| \vdash | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| ĺ | 流量 | m3/S | 0.1 | | | 0.0 | Λ / | 0.1 | | | 0.1 | A / |
| Ì | pH | - | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 |
| | DO | mg/L | 8.4 | 6.4* | ~ | 9.6 | 2 / 12 | 8.3 | 6.6* | ~ | 10 | 3 / 12 |
| 1 | BOD | mg/L | ĺ | | | | | | | | | |
| 1 | (75%値) | mg/L | 1.0 | 1.4 | | 0.0: | 0 / 10 | 1.0 | 1.0 | | 0.1: | 1 / 12 |
| 1 | COD | mg/L | 1.9 | 1.4 | \sim | 2.8* | 3 / 12 | 1.6 | 1.2 | ~ | 2.1* | 1 / 12 |
| <u></u> | (75%値) | mg/L | (2.0*) | | | | 0 / 10 | (1.8*) | | | | 0 / 10 |
| 般項 | | mg/L | 3 | 1 | ~ | 4 | 0 / 12 | 3 | 1 | ~ | 6 | 0 / 12 |
| 月日 | 7 (1)0 El 3/4 | CFU/100mL | 3 | <1 | ~ | 18 | 0 / 12 | ļ | | | | - |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | + | | | + |
| ĺ | 全窒素 | mg/L | 0.27 | 0.13 | ~ | 0.95* | 2 / 12 | | + | | | + |
| 1 | 全燐 | mg/L | 0.027 | 0.019 | ~ | 0.052* | 4 / 12 | ļ | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | <0.001 | <0.001 | ~ | <0.001 | 0 / 1 | ļ | | | | |
| 1 | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | ļ | | | | |
| ĺ | LAS | mg/L | ļ | | | | - | | + | | | |
| L | 底層溶存酸素量 | mg/L | 40.00 | /* | | /0.00 | | | + | | | |
| ĺ | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | ļ | + | | | 1 |
| ĺ | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 2 | | + | | | |
| 1 | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | + | | | |
| 1 | 六価クロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | ļ | | | | |
| 1 | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | + | | | |
| ĺ | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | ļ | | | | 1 |
| 1 | アルキル水銀 | mg/L | <u> </u> | | | | | | | | | |
| 1 | PCB | mg/L | <u> </u> | | | | | | | | | |
| 1 | ジクロロメタン | mg/L | <u> </u> | | | | | | | | | |
| ĺ | 四塩化炭素 | mg/L | 1 | 1 | | | | ļ | | | | 1 |
| 1 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <u> </u> | | | | | | | | | |
| 1 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <u> </u> | | | | | | | | | |
| Ird- | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <u> </u> | 1 | | | | ļ | | | | 1 |
| 健康 | 1,1,1 //// 0 | mg/L | <u> </u> | ļ | | | | ļ | | | | 1 |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <u> </u> | | | | | <u> </u> | | | | |
| 1 | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | L | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ | mg/L | <u> </u> | | | | | <u> </u> | | | | |
| 1 | ベンゼン | mg/L | <u> </u> | <u> </u> | | | <u></u> | | <u> </u> | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| ĺ | 硝酸性窒素 | mg/L | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | <u> </u> |
| ĺ | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | <u> </u> | | | | | <u> </u> |
| ĺ | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | \bot | | $\bot \!$ | | | $\perp \perp \perp =$ |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / 1 | | | | | |
| 殊 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | \bot | | | |
| 殊項口 | | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 1 | L | L | | | $L^{}$ |
| 目 | クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | 16000 | 6710 | \sim | 17900 | - / 12 | 17500 | 16800 | ~ | 18100 | - / 12 |
| l | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | L |
| 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | TOC | mg/L | | | | | | 1 | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | | 1 | | | | |
| の | 季 与 仁 道 在 | μ S/cm | | | | | | 1 | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| ~ | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | İ | <u> </u> | | | |
| l | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | İ | <u> </u> | | | |
| l | アニリン | mg/L | 1 | | | | | | T | | | |
| l | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | İ | <u> </u> | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |
| ь | 佐老, 漂倍甘淮和刑の「※」FDはタルは | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 |

| _ | | | Leve | | | | | 10 40 | | | | (2024 | 年度) |
|----|------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|-------|--------|-----------------------|------------|--------|-----------------|-------|-----|
| | 系名 | | 呉地先 『古母母社会 | -b-> / /7 | | | | 呉地先 『古禮辞書解 | hales / /7 | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 33000019(600 | | | | | 呉市環境試験 33000019(60 | | | | | |
| _ | 定地点名 定地点名 | | 33000019 (600 呉地先19 | J VJ / | | | | 33000019 (60 呉地先19 | 10 Vd) | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | Ξ) | | | | 呉地先海域(| 三) | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | -/ | | | | ※ A イ | | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II イ | | | | | П / | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るフ | | | | | | | | | | | | |
| _ | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 *** な | 準類型 | | ケ目 | B=□ + - | · E | | | AT BB | -m-+ | ^ □ | | |
| 司间 | 査名 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | 問調査 下 ∼ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | 調査 3 | 最大 | m/i | |
| | 流量 | #1½ m3/S | 7-10 | 取小 | | 取八 | 111/11 | T*0 | 取小 | | 取八 | 111/ | 11 |
| | pH | mo, o | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.2 | 0 / | 36 |
| | DO | mg/L | 8.1 | 6.4* | ~ | 10 | 4 / 12 | 8.3 | 6.4* | ~ | 10 | 9 / | 36 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.7 | 1.1 | \sim | 2.6* | 3 / 12 | 1.7 | 1.1 | \sim | 2.8* | 7 / | 36 |
| _ | (75%値) | mg/L | (1.7*) | | | | | (1.9*) | | | | | |
| 般 | SS | mg/L | 5 | 2 | ~ | 9 | 0 / 12 | 4 | 1 | ~ | 9 | 0 / | 36 |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | 3 | <1 | \sim | 18 | 0 / | 12 |
| Н | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | 1 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / | 12 |
| | 全 全 | mg/L | | | | | 1 | 0.27 0.027 | 0.13 | ~ | 0.95* 0.052* | 2 / | 12 |
| | | mg/L | | | | | | <0.001 | | \sim | | | |
| | 全亜鉛 ノニルフェノール | mg/L mg/L | | | | | | \U.UU1 | <0.001 | ~ | <0.001 | 0 / | 1 |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | < 0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / | 2 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | < 0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / | 2 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / | 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / | 2 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / | 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | PCB ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | ベンゼンセレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | - | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | + | | | | | | |
| | 明酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | • | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / | 1 |
| 殊 | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 |
| 項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | 1 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 |
| П | クロム | mg/L | 15000 | | | 1017 | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / | 1 |
| 1 | 塩素イオン | mg/L | 17600 | 16700 | ~ | 18400 | - / 12 | 17000 | 6710 | ~ | 18400 | - / | 36 |
| | 有機態窒素 アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | が自然では TOC | mg/L | | | | | | | | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | | | | | | | |
| の | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| 月目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | - | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | - | - | | | | | | | |
| 1 | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | 個/100mL | | | | | 1 | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の野 | (基) | 售点であることを: | 示す | | | | | | | | | |

| | | | T = | | | | | | 1 | | | | (2024 生 | 年度) |
|------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------|---------------------|------------|----------|------|------------------------|---------|--------------------|-------|--|-----|
| 水系名 | | | 呉地先 | | | | | | 呉地先 | V 1 | | | | |
| 測定機関 | | | 呉市環境試験 33000025 (60 | | | | | | 呉市環境試験 33000025(60 | | | | | |
| 測定地点番号 | | | 33000025 (60 呉地先25 | 4-02) | | | | | 33000025 (60 呉地先25 | J4=02) | | | | |
| (COD等に係るあて | けめ水域名 | | 呉地先海域(- | →) | | | | | 呉地先海域(| —) | | | | |
| COD等に係る環境 | | | ※ C □ | | | | | | ※ C □ | | | | | |
| 全窒素・全燐に係る | | | 呉地先海域 | | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| 全窒素・全燐に係る | | | П / | | | | | | П / | | | | | |
| 水生生物の生息状 | 児の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物の生息状況 | 兄の適応性に係る係る環境基準類 | 壓 | | | | | | | | | | | | |
| | 生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | | | | |
| | 産する場の適応性に係る環境基準数 | 頁型 | | Ar BB SW > | ₽ I B | (+ | | | | F.B | 350 1 4 | . 🖂 | | |
| 調査名 測定項目 | 出 | 位 | 平均 | 年間調3 | 至 上唐 | 最大 | m | /n | 平均 | 最小 | 引調査 中 ~ | 最大 | m/n | , |
| 流量 | | 3/S | 十均 | 取小 | ~ | 取八 | 111 | / 11 | 十均 | 取小 | ~ | 取八 | 111/11 | 1 |
| pH | | 0, 0 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.2 | 0 | / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / | 12 |
| DO | m | g/L | 8.1 | 5.9 | ~ | 9.5 | 0 | / 12 | 8.1 | 5.8 | ~ | 9.6 | 0 / | 12 |
| BOD | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| (75%値) | m | g/L | | | | | | | | | | | | |
| COD | | g/L | 2.4 | 1.6 | \sim | 4.8 | 0 , | / 12 | 1.9 | 1.4 | \sim | 2.8 | 0 / | 12 |
| (75%値) | | g/L | (2.6) | | | | | , | (2.0) | | | | <u> </u> | |
| 般 SS 項 大腸菌数 | | g/L /100mL | 4 7 | 1 | ~ | 8 | 0 | / 12 | 5 | 1 | ~ | 9 | 0 / | 12 |
| 項 大腸菌数 n-ヘキサン抽出 | | /100mL g/L | 7 <0.5 | <1 <0.5 | ~ | 25 <0.5 | 0 | / 12 | | | | | + | |
| n=ペキザン抽圧 全窒素 | | g/L g/L | 0.23 | 0.11 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.32* | 2 | / 12 | | | | | 1 | |
| 全燐 | | g/L g/L | 0.23 | 0.021 | ~ | 0.044* | 4 | / 12 | | | | | | |
| 全亜鉛 | | g/L | 0.002 | 0.002 | ~ | 0.002 | 0 | / 1 | | | | | 1 | |
| ノニルフェノール | | g/L | | | | | <u> </u> | | | | | | | |
| LAS | m | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 底層溶存酸素量 | | g/L | | | - | | | - | | | | | | |
| カドミウム | m | g/L | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 . | / 2 | | | | | | |
| 全シアン | | g/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 , | / 2 | | | | | | |
| 鉛 | | g/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 , | / 2 | | | | | | |
| 六価クロム | | g/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 , | / 2 | | | | | + | |
| 砒素 ※水部 | | g/L | <0.005 <0.0005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 | | | | | - | |
| 総水銀 アルキル水銀 | | g/L g/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 , | / 2 | | | | | + | |
| PCB | | g/L | | | | | | | | | | | + | |
| ジクロロメタン | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | g/L | | | | | | | | | | | _ | |
| 1,2-ジクロロエタ | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエラ | ・レン mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロ | · | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 康 1,1,1-トリクロロニ | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 項 1,1,2-トリクロロ | | g/L | | | | | | | | | | | - | |
| 自トリクロロエチレン | | g/L | | | | | | | | | | | - | |
| テトラクロロエチ 1,3-ジクロロプロ | | g/L | | | | | | | | | | | - | |
| チウラム | · | g/L g/L | | | | | | | | | | | + | |
| シマジン | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | g/L | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| ベンゼン | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| セレン | | g/L | | | | | | | | | | | 1 | |
| 硝酸性窒素 | mį | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン 株 銅 | | g/L g/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - | / 1 | | | | | | |
| | | g/L g/L | <0.005 | <0.1 | ~ | <0.005 | - | | | | | | + | |
| 項 マンガン 溶解性 | | g/L g/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | + | / 1 | | | | | | |
| 目クロム | | g/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - : | / 1 | | | | | <u> </u> | |
| 塩素イオン | | g/L | 17100 | 15500 | ~ | 18000 | | / 12 | 17600 | 16800 | ~ | 18200 | - / | 12 |
| 有機態窒素 | mi | g/L | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒 | | g/L | | | | | | | | | | | | - |
| 燐酸態燐 | | g/L | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| TOC | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| そ クロロフィルa の 素与に道由 | | /m3 | | | | | - | | | | | | - | |
| 他見る仏学及 | | S/cm | | | | | | | | | | | - | |
| 項メナレンフルー | | g/L 变 | | | | | | | | | | | | |
| 目 濁度 トリハロメタン生 | | 旻 g/L | - | | | | 1 | | | | | | + | |
| 4-t-オクチルフ | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| アニリン | | g/L | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| 2, 4-ジクロロフ | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌 | | 00mL | | | | | | | | | | | | |
| 借去・ 得倍其注 | 連縮型の「※」印け各水域の環境 | 5 H 3 | 半上ポナファルナ | | | | | | | | | | | |

| | | | I | | | | | 10 40 | | | | (2024 | 年度) |
|----|--------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------|-------|--------|------------------------|--|--------|---------|-------|-----|
| | 系名 | | 呉地先 中土環境計画 | las de | | | | 呉地先 四本環境計略 | . las , 24 | | | | |
| _ | 定機関 | | 呉市環境試験: 33000025(604 | | | | | 呉市環境試験 33000025 (60 | | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 33000025 (604 呉地先25 | 4-02) | | | | 33000025 (60 呉地先25 | 4-02) | | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(- | -) | | | | 呉地元25 呉地先海域(- | -) | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | 共地元海域(¯ ※ C ロ | / | | | | | / | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II イ | | | | | II / | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 隼類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 査名 | | | | 間調査 下 | | | | | 調査 🛭 | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/ | n |
| | 流量 pH | m3/S | 8.1 | 8.0 | ~ | 0.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 0.0 | 0 / | 36 |
| | | mg/L | 7.7 | 6.0 | ~ | 9.3 | 0 / 12 | 8.0 | 5.8 | ~ | 9.6 | 0 / | 36 |
| | | mg/L | 1.1 | 0.0 | | 5.5 | 0 / 12 | 0.0 | 5.0 | | 5.0 | 0 / | 50 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.6 | 1.1 | ~ | 2.4 | 0 / 12 | 2.0 | 1.1 | ~ | 4.8 | 0 / | 36 |
| _ | | mg/L | (1.8) | | | | | (2.2) | | | | | |
| 般 | SS | mg/L | 9 | 2 | ~ | 18 | 0 / 12 | 6 | 1 | \sim | 18 | 0 / | 36 |
| 項日 | 7 1330 [237] | FU/100mL | | | | - | | 7 | <1 | ~ | 25 | 0 / | 12 |
| 目 | | mg/L | | | | | 1 | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / | 12 |
| | | mg/L | | | | | | 0.23 | 0.11 | \sim | 0.32* | 2 / | 12 |
| | | mg/L | | | | | - | 0.029 | 0.021 | ~ | 0.044* | 4 / | 12 |
| | | mg/L | | | | | | 0.002 | 0.002 | \sim | 0.002 | 0 / | 1 |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | - | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | < 0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | | | | | | < 0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | | | | | | < 0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / | 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | <0.01 | < 0.01 | \sim | < 0.01 | 0 / | 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / | 2 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | - | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | = | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| L | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | • | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / | 1 |
| 殊 | | mg/L | | | | | 1 | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / | 1 |
| 項目 | | mg/L | | | | | 1 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 |
| Н | | mg/L | 15000 | 1==00 | | 10000 | / | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 |
| | | mg/L | 17800 | 17500 | ~ | 18600 | - / 12 | 17500 | 15500 | \sim | 18600 | - / | 36 |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | + | | | | | | |
| そ | | ng/m3 | | | | | | | | | | | |
| の | | μS/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | • | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | 周/100mL | tte be and to we the | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 7世47 | 田 中 ついねることだっ | तर व | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | 10 10 | - | | | (2024 年度) |
|--------|--|-------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------------|------------|----------|-------|-----------|
| | 系名 | _ | 呉地先 | . 1-2 . 1- | | | | 呉地先 | A 1-> 2- | | | |
| | 定機関 | | 呉市環境試験 | | | | | 呉市環境試験 | | | | |
| | 定地点番号 | | 33000026 (60 | 5-01) | | | | 33000026 (6 | 05-01) | | | |
| _ | 定地点名 | | 呉地先26 | → \ | | | | 呉地先26 | → \ | | | |
| | OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(I | _) | | | | 呉地先海域(| _) | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ B □ | | | | | ₩ B ¤ | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅱ イ | | | | | Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | 77'17 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 (************************************ | 型 | | | <u> </u> | (+=) | | | | D save 1 | . = | |
| 訓 | 査名 | | | | 査 上層 | | | | - | 間調査 中 | | |
| _ | 測定項目単位 | _ | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | 流量 m3, | /S | | | | | | ļ | | | | |
| | pH | | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.1 | 0 / 12 |
| | DO mg, | | 8.2 | 5.8 | \sim | 9.8 | 0 / 12 | 8.2 | 5.7 | \sim | 9.9 | 0 / 12 |
| | BOD mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | (75%値) mg, | | | | | | | | | | | |
| | COD mg, | | 2.2 | 1.6 | \sim | 3.4* | 2 / 12 | 1.9 | 1.3 | \sim | 2.5 | 0 / 12 |
| | (75%値) mg, | _ | (2.6*) | | | | | (2.1) | | | | |
| 般 | SS mg, | | 4 | 1 | ~ | 8 | 0 / 12 | 4 | 2 | ~ | 7 | 0 / 12 |
| 項目 | > C100 EEE 50C | | 10 | <1 | ~ | 52 | 0 / 12 | | 1 | | | |
| П | n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg. | _ | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| 1 | 全窒素 mg, | | 0.18 | 0.10 | ~ | 0.30 | 0 / 12 | | | | | |
| 1 | 全燐 mg, | - | 0.026 | 0.017 | ~ | 0.046* | 3 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 mg, | | | | | | | | 1 | | | |
| | ノニルフェノール mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | LAS mg, | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 mg, | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム mg/ | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg, | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | 六価クロム mg/ | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg, | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | アルキル水銀 mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | PCB mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | ジクロロメタン mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | 四塩化炭素 mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,2-ジクロロエタン mg. | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg, | | | | | | | | | | | |
| parte. | シス-1,2-ジクロロエチレン mg. | | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1 1) / / 0 1118/ | | | | | | | | | _ | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン mg. | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン mg, | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg, | - | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,3-ジクロロプロペン mg. | | | | | | | | | | | |
| 1 | チウラム mg, | | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | ベンゼン mg. | _ | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン mg, | - | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg. | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 mg. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg, | _ | | | | | | | | | | |
| 1 | ふっ素 mg, | | | | | | | | | _ | | |
| | ほう素 mg. | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン mg. | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 mg. | | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 mg | /L | | | | | | | | | | |
| 殊項目 | マンガン_溶解性 mg | /L | | | | | | | | | | |
| 日 | クロム mg, | /L | | | | • | | | | | • | |
| | 塩素イオン mg. | | 17300 | 16100 | ~ | 18500 | - / 12 | 17800 | 16800 | ~ | 18300 | - / 12 |
| 1 | 有機態窒素 mg, | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 mg, | | | | | • | | | | | • | |
| 1 | 燐酸態燐 mg. | /L | | | | | | | | | | |
| 1 | TOC mg. | | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa mg/ | m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 μ S ₁ | /cm | | | | • | | | | | • | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 mg, | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 度 | _ | | | | | | | | | | |
| 1 | トリハロメタン生成能 mg. | _ | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール mg, | /L | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg, | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2, 4-ジクロロフェノール mg. | /L | | | | | | | | | | |
| L | ふん便性大腸菌群数 個/10 | | | | | | | | | | | |
| | 供表、環接甘油粕刑の「※」印は久水はの環接 | | | | | | | | | | | |

| _ | - T. P. | | -D 16-44- | | | | | - T 106-46- | | | | (2024年月 |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------|----------|--------|-------|--------|---------------|------------|--------|------------|---------|
| | :系名 定機関 | | 呉地先 呉市環境試験 | センター | | | | 呉地先 呉市環境試懸 | トンター | | | |
| | 定地点番号 | | 33000026 (60 | | | | | 33000026 (60 | | | | |
| _ | 定地点名 | | 呉地先26 | 5 01 / | | | | 呉地先26 | 00 01 / | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(| | | | | 呉地先海域(| | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ B□ | | | | | Ж В□ | | | | |
| 全 | :窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | П ∕ | | | | | Πイ | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るが | k域名 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| 訓 | <u> </u> 查名 | | | 年間 | 間調査 下 | 層 | | | 年間 | 間直 🕯 | 2層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.2 | 0 / 3 |
| | | mg/L | 7.7 | 6.0 | ~ | 9.1 | 0 / 12 | 8.1 | 5.7 | ~ | 9.9 | 0 / 3 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.0 | | | | 0 / 10 | 1.0 | | | 0.4 | 2 / 2 |
| | | mg/L | 1.6 | 1.0 | \sim | 2.4 | 0 / 12 | 1.9 | 1.0 | \sim | 3.4* | 2 / 3 |
| | | mg/L | (1.7) | 0 | | 0 | 0 / 10 | (2.2*) | 4 | | 0 | 0 / 0 |
| 般項 | | mg/L CFU/100mL | 5 | 3 | ~ | 9 | 0 / 12 | 4 | 1 | ~ | 9 | 0 / 3 |
| 目 |) C1100 ELL 900 | | | | | | | 10 <0.5 | <1 <0.5 | ~ | 52 <0.5 | 0 / 1 |
| | | mg/L | | | | | | 0.18 | 0.10 | ~ | 0.30 | 0 / 1: |
| Ì | | mg/L mg/L | | | | | | 0.18 | 0.10 | ~ | 0.30 | 3 / 1 |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | 0.020 | 0.017 | ~ | v.U40* | o / 1 |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | - |
| Ì | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| H | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| Ì | | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| - | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項目 | 鉄、溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| F | / | mg/L | 17000 | 17100 | | 10400 | _ / 10 | 17600 | 16100 | | 10500 | _ / ^ |
| Ì | | mg/L | 17800 | 17100 | ~ | 18400 | - / 12 | 17600 | 16100 | ~ | 18500 | - / 3 |
| Ì | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | | mg/L mg/m3 | | | | | | | | | | |
| の | 索 左仁道 在 | mg/ms μS/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | 电気伝導及 メチレンブルー活性物質 | μ S/CIII mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | |
| Ħ | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | + | | | - |
| Ì | | 加g/ L 個/100mL | | | | | | | 1 | | | |
| Щ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の野 | | ## | <u> </u> | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| | | | | | - ` | | | | | | | | (2024 年度) |
|----|----------------------------------|--------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----|----------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----------|
| | 系名 岩地田 | | 呉地先 中末環境計画 | las de | | | | | 呉地先 中末環境計画 | - Las , 2- | | | |
| _ | 定機関 | | 呉市環境試験· | | | | | _ | 呉市環境試験 33000028(60 | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 33000028 (606 呉地先28 | 5-06) | | | | | 33000028 (60 呉地先28 | 6-06) | | | |
| _ | ^{圧地点名} DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地元20 | =) | | | | - | 呉地元20 呉地先海域(3 | =1 | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | 共地元(#域(□ ※ A イ | -/ | | | | | | → / | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | _ | 呉地先海域 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 7K 12 1 | | | | | | 7K 1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水均 | 域名 | | | | | | | | | | | |
| 水生 | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | <u> </u> | | | 年間調査 | | | | | | | 問調査 中 | | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | | n3/S | 0.1 | 7.0 | | 0.1 | 0 / | 10 | 0.1 | 0.0 | | 0.1 | 0 / 10 |
| | pH DO n | /I | 8.1 8.2 | 7.9 6.5* | ~ | 9.6 | | 12 12 | 8.1 8.1 | 8.0 6.6* | ~ | 9.7 | 0 / 12 |
| | | ng/L ng/L | 0.2 | 0.0* | | 9.0 | 4 / | 12 | 0.1 | 0.0* | | 9.1 | 3 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.8 | 1.1 | ~ | 2.3* | 2 / | 12 | 1.5 | 0.9 | ~ | 2.0 | 0 / 12 |
| | | ng/L | (2.0*) | | | 2.0 | ~ ′ | | (1.7) | | | 2.0 | . , 12 |
| 般 | | ng/L | 3 | 1 | ~ | 4 | 0 / | 12 | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 |
| 項 | | U/100mL | 3 | <1 | ~ | 25* | | 12 | | | | | |
| 目 | | ng/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / | 12 | | | | | |
| | 全窒素 m | ng/L | 0.14 | 0.07 | ~ | 0.22 | 0 / | 12 | | | | | |
| | | ng/L | 0.022 | 0.016 | ~ | 0.039* | | 12 | | | | | |
| | | ng/L | 0.001 | 0.001 | \sim | 0.001 | 0 / | 1 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | _ | | | | | |
| _ | | ng/L | /0.0000 | /0.0000 | | /0.0000 | 0 / | 0 | | | | | - |
| | | ng/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | | 2 | | | | | 1 |
| | | ng/L | <0.1 <0.005 | <0.1 <0.005 | ~ | <0.1 <0.005 | | 2 | | | | | 1 |
| | | ng/L ng/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | | 2 | | | | | + |
| | | ng/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | | 2 | | | | | |
| | | ng/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | | 2 | | | | | + |
| | | ng/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | | 2 | | | | | |
| | | ng/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / | 2 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | _ 1 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | • | | | - | | | • | |
| 健康 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| Î | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | 1 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | - |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | + |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | 1 |
| | | ng/L | 0.022 | <0.005 | ~ | 0.088 | 0 / | 12 | | | | | |
| | | ng/L | 0.006 | <0.005 | ~ | 0.012 | | 12 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | ı | | | | | |
| | ふっ素 m | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | • | | | - | | | • | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | | ng/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | | 1 | | | | | 1 |
| 殊 | | ng/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | | 1 | | | | | |
| 項目 | | ng/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | | 1 | | | | | |
| - | | ng/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | | 1 | 17700 | 18000 | | 10000 | / |
| | | ng/L | 17500 0.10 | 16700 | ~ | 18100 | | 12 | 17700 | 17300 | ~ | 18200 | - / 12 |
| | | ng/L ng/L | 0.10 | 0.05 <0.01 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.15 | | 12 12 | | | | | + |
| | | ng/L | 0.01 | 0.003 | ~ | 0.02 | | 12 | | | | | |
| | | ng/L | 1.5 | 1.1 | ~ | 1.8 | | 6 | | | | | 1 |
| そ | | g/m3 | 2.9 | 1.0 | ~ | 4.9 | | 12 | | | | | |
| の | | S/cm | 3.0 | 1.0 | | 110 | | | | | | | |
| 他項 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 月日 | | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | _ | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール m | ng/L | | | | | | | | | | | |
| L | ふん便性大腸菌群数 個 | /100mL | | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 会甘州 | 生占でもステレむ. | 군국: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | (202 | 4 年度) |
|----|----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|------|--------|
| | 系名 字機問 | | 呉地先 中主母母科() | ₽ /ħ. | | | | 呉地先 中主理 (全社) | J-> / I7. | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験· 33000028(606 | | | | | 呉市環境試験 33000028(60 | | | | | |
| | 定地点备号 定地点名 | | 33000028 (606 呉地先28 | , 00 / | | | | 33000028 (60 呉地先28 | υ-υυ <i>)</i> | | | | |
| | ^{圧地点名} DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | :) | | | | 呉地先海域(| =`) | | | | |
| _ | DD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | / | | | | ※ A イ | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | • | | | | | • | | | • |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 本々 | 類型 | | 左眼 | 細木コ | · 🖂 | | | 左明 | 細木 / | ∠ 🖂 | | |
| 司间 | <u> 査</u> 名 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | 調査 7 | <u>`</u> 層 最大 | m/n | 平均 | 最小 | 調査 🕹 | E暦 最大 | , | n/n |
| | | 中亚 n3/S | T-80 | 取小 | | 取八 | 111/11 | 7-20 | 取小 | | 取八 | 1 | 11/ 11 |
| | pH | 110, 0 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.1 | 0 | / 36 |
| | | ng/L | 7.8 | 6.3* | ~ | 9.0 | 5 / 12 | 8.1 | 6.3* | ~ | 9.7 | 10 | / 36 |
| | BOD n | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.4 | 1.0 | \sim | 1.9 | 0 / 12 | 1.6 | 0.9 | \sim | 2.3* | 2 | / 36 |
| | | ng/L | (1.5) | | | | 0 / 10 | (1.8*) | | | | | / 00 |
| 般項 | | ng/L U/100mL | 4 | 2 | ~ | 8 | 0 / 12 | 3 | 1 <1 | ~ | 8 25* | 0 | / 36 |
| 月 | 2 1/493 pm 291 | ng/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | $\frac{\sim}{\sim}$ | <0.5 | 0 | / 12 |
| | | ng/L | 0.12 | 0.06 | ~ | 0.16 | 0 / 12 | 0.13 | 0.06 | ~ | 0.22 | 0 | / 24 |
| | | ng/L | 0.024 | 0.016 | ~ | 0.036* | 2 / 12 | 0.023 | 0.016 | ~ | 0.039* | 3 | / 24 |
| | 全亜鉛 n | ng/L | | | | | | 0.001 | 0.001 | ~ | 0.001 | 0 | / 1 |
| | ノニルフェノール n | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | LAS n | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | , |
| | | ng/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 | / 2 |
| | | ng/L | | | | | | <0.1 <0.005 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 2 |
| | | ng/L ng/L | | | | | | <0.005 | <0.005 <0.01 | ~ | <0.005 <0.01 | 0 | / 2 |
| | | ng/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | | ng/L | | | | | | <0.0005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | | ng/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | | ng/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 康 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム n | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 0.019 | /0.005 | | 0.074 | 0 / 10 | 0.000 | /0.005 | | 0.000 | 0 | / 04 |
| | | ng/L ng/L | 0.019 | <0.005 <0.005 | ~ | 0.074 | 0 / 12 | 0.020 0.006 | <0.005 <0.005 | ~ | 0.088 | 0 | / 24 |
| | | ng/L | 3.001 | .0.000 | • | 0.011 | 0 / 12 | 3.000 | \0.000 | - | 0.014 | - | , 44 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 n | ng/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - | / 1 |
| 殊 | | ng/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| 項目 | | ng/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - | / 1 |
| Ë | | ng/L | 17700 | 16000 | ~ | 10400 | - / 12 | <0.1 17700 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| | | ng/L ng/L | 0.08 | 16900 0.04 | ~ | 18400 0.14 | - / 12 - / 12 | 0.09 | 16700 0.04 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 18400 0.15 | - | / 36 |
| | | ng/L | 0.00 | <0.04 | ~ | 0.14 | - / 12 | 0.03 | <0.04 | ~ | 0.13 | _ | / 24 |
| | | ng/L | 0.013 | 0.006 | ~ | 0.021 | - / 12 | 0.012 | 0.003 | ~ | 0.021 | - | / 24 |
| | | ng/L | | | | | | 1.5 | 1.1 | ~ | 1.8 | - | / 6 |
| その | クロロフィルa m. | g/m3 | | | | | | 2.9 | 1.0 | \sim | 4.9 | - | / 12 |
| の他 | | S/cm | | | | | | | | | - | | - |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | - | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | /100mL | | | | | | | | | | | |
| Щ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環: | | 単占でなることか | | | | 1 | l | 1 | | | 1 | |

| | | | | | | | | 10 10 | | | | (2024 年度) |
|----------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|--|----------|--------|-----|-----------|
| _ | 系名 | | 呉地先 | 1 | | | | 呉地先 | A 1 . 1- | | | |
| _ | 定機関 | | 呉市環境試験 22000027 (600 | | | | | 呉市環境試験 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 33000037 (600 | b-61) | | | | 33000037 (60 呉地先37 | 06-61) | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先37 呉地先海域(三 | -) | | | | 呉地先海域(| | | | |
| | OD等に係るのではめが域名 OD等に係る環境基準類型 | | → RTT (二 A イ |) | | | | 共地元海域(Aイ |) | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| _ | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | 八元四次 | | | | | 八元四次 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 11 -1 | | | | | 11 /1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 准插型 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | |
| | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年間調査 | : 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | 層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 |
| | DO | mg/L | 7.9 | 6.3* | \sim | 9.3 | 4 / 12 | 7.9 | 6.4* | \sim | 9.4 | 5 / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.4 | 1.0 | \sim | 1.6 | 0 / 12 | 1.3 | 1.0 | \sim | 1.8 | 0 / 12 |
| <u> </u> | (75%値) | mg/L | (1.6) | | | | | (1.4) | | | | |
| 般 | SS | mg/L | 3 | 1 | \sim | 5 | 0 / 12 | 3 | 1 | \sim | 4 | 0 / 12 |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | 1 | <1 | \sim | 3 | 0 / 12 | | | | | |
| | 11 ペイリン 抽山初貝_加刀寺 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | 1 | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.11 | 0.06 | ~ | 0.15 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.021 | 0.014 | ~ | 0.032* | 2 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.001 | 0.001 | \sim | 0.001 | 0 / 1 | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| - | 底層溶存酸素量 | mg/L | /0.0000 | /A 0000 | | /0.0000 | 0 / 0 | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | | 1 | | | |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 <0.0005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | |
| | 総水銀 アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康 | 1.1.2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項日 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Н | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | <u> </u> | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.020 | <0.005 | \sim | 0.074 | 0 / 12 | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.009 | <0.005 | ~ | 0.023 | 0 / 12 | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / 1 | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| 坦日 | マンガン_溶解性 | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| П | クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / 1 | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | 17700 | 17200 | ~ | 18200 | - / 12 | | 1 | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | 0.07 | 0.04 | \sim | 0.12 | - / 12 | | 1 | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.01 | - / 12 | | | | | |
| | 燐酸態燐 TOC | mg/L | 0.012 | 0.006 | ~ | 0.020 | - / 12 | | | | | |
| 2 | TOC クロロフィルa | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| ての | | mg/m3 | | | | | | | 1 | | | |
| 他 | 電気伝導度 メチレンブルー活性物質 | μ S/cm | | | | | | | - | | | |
| 項 | 選度 選度 | mg/L 度 | | | | | | | - | | | |
| H | 御及 トリハロメタン生成能 | ළ mg/L | | | | | | | - | | | |
| | トリハロスタン生成能 4-t-オクチルフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクテルフェノール アニリン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | Mg/L 個/100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | | 生 占っぺま ファ しょ | ニナ | | | | 1 | | | | |

| | | | E 14. 2 | | | | | Laws | | | | (202 | 4 年度) |
|------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------|------------|-----|--------|-----------------------|---------------|--------|----------------|------|--------|
| | 系名 字機問 | | 呉地先 四末環接對歐 | Jan 7 / 27 | | | | 呉地先 中主理 (全社) | - h | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 33000037 (606 | | | | | 呉市環境試験 33000037(60 | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 呉地先37 | 5-01) | | | | 33000037 (60 呉地先37 | 0-01) | | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先海域(三 | =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | A 1 | | | | | A 1 | * | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II ✓ | | | | | II イ | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| | ヒ生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る か | | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 準類型 | | AT FI | B=m → _ | · 🖂 | | | <i>F</i> 88 | | ^ □ | | |
| | <u>衛名</u> 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | 問調査 下 ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | 調査 🕯 | 最大 | | n/n |
| _ | | #业 m3/S | T*3 | 取小 | | 取八 | 111/11 | 7-20 | 取小 | | 取八 | 1 | 11/ 11 |
| 1 1 | pH | mo, c | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 | / 36 |
| 1 1 | | mg/L | 7.9 | 6.5* | ~ | 9.2 | 5 / 12 | 7.9 | 6.3* | ~ | 9.4 | 14 | / 36 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | ${\rm mg}/L$ | 1.3 | 1.0 | \sim | 1.7 | 0 / 12 | 1.3 | 1.0 | \sim | 1.8 | 0 | / 36 |
| 1 1 | | mg/L | (1.4) | | | | | (1.5) | | | | | |
| /*** | | mg/L | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 | / 36 |
| | 7 (120 EL 59) | CFU/100mL | | | | | | 1 | <1 | ~ | 3 | 0 | / 12 |
| | | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 0.06 | ~ | <0.5 | 0 | / 12 |
| 1 1 | | mg/L mg/L | | | | | | 0.11 0.021 | 0.06 | ~ | 0.15 0.032* | 0 | / 12 |
| 1 1 | | mg/L mg/L | | | | | | 0.021 | 0.014 | \sim | 0.032* | 0 | / 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 0.001 | 0.001 | | 0.001 | 0 | / 1 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| - | | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 | / 2 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 2 |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 2 |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 | / 2 |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 2 |
| | | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | - | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | 0.020 | < 0.005 | ~ | 0.074 | 0 | / 12 |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | 0.009 | <0.005 | ~ | 0.023 | 0 | / 12 |
| 1 1 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| - | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 14 | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - | / 1 |
| 殊 | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| | | mg/L | | | | | | <0.1 17700 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | / 1 |
| l ł | | mg/L mg/L | | | | | | 0.07 | 17200 0.04 | \sim | 18200 0.12 | - | / 12 |
| 1 1 | | mg/L mg/L | | | | | | 0.01 | <0.04 | ~ | 0.12 | _ | / 12 |
| | | mg/L | | | | | | 0.012 | 0.006 | ~ | 0.020 | - | / 12 |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | l | |

| To be | | 10 Uh #- | | | | | ID lab # | | | (2024 年度 |
|--|--|---|-------|--------|--------|--------|----------|---|--------|----------|
| | | | bンター | | | | | ナンター | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 00 / | | | | | ,0 00 / | | |
| | | | :) | | | | | =_) | | |
| 1 1 1 | | | -/ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | · | | | | | | | | |
| | 準類型 | | | | | | | | | |
| 生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | 〈域名 | | | | | | | | | |
| 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 準類型 | | | | | | | | | |
| | | | 年間調 | 査 上層 | (表層) | | | 年間 | 問調査 中層 | |
| | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ 最大 | m/n |
| | m3/S | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 1.2 | \sim | 4.1* | 2 / 12 | | 1.2 | ~ 3.9* | 2 / 12 |
| | | (1.7*) | | | | | (1.9*) | | | |
| SS | | | | | | | | | | |
| 八肠函数 Ci | | | | | | | | | | |
| | | 0.19 | 0.05 | ~ | 0.90 | 0 / 10 | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | 0.023 | 0.014 | ~ | 0.049* | ۷ / 12 | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PCB : | mg/L | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| The state of the s | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 鉄 溶解性 | mg/I | | | | | | | | | |
| マンガン 溶解性 | | | | | | | | | | |
| クロム | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| クロロフィルa n | | | | | | | | | | |
| | μS/cm | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 度 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | |
| 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 |
| ふん便性大腸菌群数 | 圖/100mL | | | | | | | | | |
| | 王生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準を名 調定項目 流量 別定項目 流量 DO BOD (75%値) COD (75%値) SS 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質,油分等 全窒素 全燐 全亜鉛 ノニルフェノール L広層溶存酸素量 カドミウム カンドラム カンドラム カンドウム カルースージクロロエチレン 1,1,2-ドリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエチレン 1,1,2-ドリクロロエチレン 1,1,2-ドリクロロエチレン 1,1,2-ドリクロロエチレン 1,1,2-ドリクロロエチレン 1,1,2-ドリクロロエチレン 1,3-ジクロプロペン ナウラム シマジン ナオベンカルブ ペンゼン セレン 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 ・シっ素 ま、3-カ素 ま、4-ギンオキサン 銅 鉄 溶解性 マンガム 溶解性 フロス イル 有機能変素 アンギン 「発解性 クロス イル 有機能変素 アンボーアン 「発解性 クロス イル 有機能変素 アンボーアが変異 など、一部では変素 体験を性 アンガム 溶解性 アンガム 素に、変素 ない一部では、変素 アンボーアが変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ないて、変異 ない一部では、変素 ない、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ない一部では、変素 ないーでは、変素 ない、変素 ないーでは、変素 ないーでは、変素 ないーでは、変 | 定機関 定地点名 DD等に係る赤ではめ水域名 DD等に係る赤ではめ水域名 DD等に係る赤ではめ水域名 空と、体に係る環境基準類型 空生物の生息、状況の適応性に係る係る環境基準類型 空生物の生息、再生産する場の適応性に係る保力環境を変更を発し、再生産する場の適応性に係る保力環境を変更を名 別定項目 単位 流量 加房/L ののののののののののののののののののののののののののののののののの | 定機関 | | 定胞の語 | | 世報的 | 接信値 使性点番号 受地方に対す 受地方に対す ののがに保みが上が水体名 ののがに保みが大体名 のがに保みが成性に係る機能は神原型 産者・金輪に移る機能は神原型 者者・金輪に移る機能は神原型 者者・金輪に移る機能は神原型 生物の土息を挟めの急性に係る機能を禁題型 生物の土息を持つな場合ではに係る機能を禁題 生物の土息を持つな場合が大体名 生物の土息・日本では一部の変化に係る機能を対象と 生物の土息・日本では一部の変化に係る機能を対象と 生物の土息・日本では一部の変化に係る機能を対象と 生物の土息・日本では一部の変化に係る機能を対象と 生物の土息・日本では一部の変化 の変し のの | 世際語 | 世際語 |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------|------|--------|-------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 系名 | | 呉地先 | | | | | 呉地先 | | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 | | | | | 呉市環境試験 33000050(60 | | | | |
| | | | 33000050 (60 呉地先12-5 | 6-63) | | | | 33000050 (60 呉地先12-5 | 16-63) | | | |
| | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先12-5 呉地先海域(三 | =) | | | | 呉地先海域(| =) | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | → A イ | <i>→/</i> | | | | A イ | / | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II 1 | | | | | II 1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 11 1 | | | | | н , | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 連類型 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間 | 間調査 ↑ | ·層 | | | 年間 | 調査 全 | 注層 | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | | m3/S | | | | | | | | | | |
| | рН | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.6 | 1.2 | \sim | 2.1* | 2 / 12 | 1.8 | 1.2 | \sim | 4.1* | 6 / 36 |
| | | mg/L | (1.6*) | | | | | (1.7*) | | | | |
| 般項 | | mg/L FU/100mL | | | | | | | | | | |
| 月 | | | | | | | | | | | | |
| | nーペキサン抽口物質。油ガ等 全窒素 | mg/L mg/L | | | | | | 0.13 | 0.05 | ~ | 0.28 | 0 / 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 0.13 | 0.05 | ~ | 0.28 | 2 / 12 |
| | - 11 1 | mg/L mg/L | | | | | | 0.020 | 0.014 | | 0.0477 | 4 / 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| D-th- | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 石石 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | | ng/m3 | | | | | | | | | | |
| 他 | | μS/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| l | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 備考:環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 圆/100mL | # h h 1 - 1 | <u> </u> | | | 1 | | | | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------|----------|--------|--------|--------|----------------------|----------|-------|-----|-----------|
| | 系名 空機器 | | 呉地先 中末環境計画 | las de | | | | 呉地先 中土電母計画 | A. La 3- | | | |
| _ | 定機関 | | 呉市環境試験 33000305(606 | | | | | 呉市環境試験 33000305(6 | | | | |
| | 定地点番号 | | | o-64) | | | | , | J6-64) | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 呉地先30-5 呉地先海域(三 | =) | | | | 呉地先30-5 呉地先海域(| =) | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | 共地元(#域 (□ A イ | -/ | | | | 会地元海域(A イ | <u></u> | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 7K 12 1 | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準数 | 類型 | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水均 | 或名 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| 調 | <u> </u> | | | 年間調査 | | | | | | 間調査 中 | | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | | 13/S | | | | | | | | | | |
| | pH DO m | /T | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ig/L ig/L | | | | | | | | | | |
| | 1 1 1 | ıg/L | 1.5 | 1.2 | ~ | 2.3* | 1 / 12 | 1.5 | 1.2 | ~ | 1.9 | 0 / 12 |
| L | | ıg/L ıg/L | (1.5*) | 1.4 | | 2.0 - | , 12 | (1.7) | 1.2 | | 1.0 | , 12 |
| 一般 | | ıg/L | / | | | | | , | | | | |
| 項 | | J/100mL | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 0.12 | 0.05 | \sim | 0.17 | 0 / 12 | | | | | |
| | | ıg/L | 0.021 | 0.015 | ~ | 0.033* | 1 / 12 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ıg/L | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| - | | ng/L | | | | | | - | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | - | | 1 | | | - |
| | | ig/L ig/L | | | | | + | | 1 | | | + |
| | | ig/L ig/L | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | | ıg/L | | | | | | † | | | | |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 m | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| /y:ta- | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項 | | ıg/L | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Ê | | ıg/L | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | + | - | + | | | + |
| | | ig/L ig/L | | | | | + | | 1 | | | + |
| | | ig/L ig/L | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | | ıg/L | 0.017 | <0.005 | ~ | 0.069 | 0 / 12 | | | | | |
| | | ıg/L | 0.006 | <0.005 | ~ | 0.010 | 0 / 12 | | | | | |
| | | ıg/L | | | | - | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | 1 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | | ıg/L | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 特 | | ng/L | | | | | | - | | | | |
| 殊項 | 鉄、溶解性 m | ng/L | | | | | | - | | | | |
| 月 | | ng/L ng/L | | | | | - | | 1 | | | - |
| - | | ig/L ig/L | | | | | + | | + | | | + |
| | | ig/L ig/L | 0.08 | 0.03 | ~ | 0.15 | - / 12 | | 1 | | | 1 |
| | | ıg/L | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.01 | - / 12 | | | | | |
| | 燐酸態燐 m | ıg/L | 0.011 | 0.004 | ~ | 0.020 | - / 12 | | | | | |
| | | ıg/L | 1.2 | 1.0 | ~ | 1.5 | - / 6 | | | | | |
| そ | | g/m3 | 1.9 | <0.5 | ~ | 5.3 | - / 12 | | | | | |
| の他 | | S/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | - | | | | | | |
| f | | 度 | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | 1 |
| | | ıg/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | | /100mL | 44 Laure Laure 1 1 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | 可具 剂 | 出口 いかんことか | सर्वे वि | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 10 10 | | | | (202 | 4 年度) |
|-------|--|------------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|------------------|--------|--------|------|-------|
| | 系名 定機関 | | 呉地先 呉市環境試験· | サンター | | | | 呉地先 呉市環境試験 | キャンター | | | | |
| _ | 足機関 定地点番号 | | 只用環境試験 33000305 (606 | | | | | 只 中 現 児 氏 影 33000305 (60 | | | | | |
| _ | 定地点名 | - 1 | 呉地先30-5 | / | | | | 呉地先30-5 | / | | | | |
| | OD等に係るあてはめ水域名 | 1 | 呉地先海域(三 | () | | | | 呉地先海域(| 三) | | | | |
| _ | DD等に係る環境基準類型 | | Аイ | | | | | Аイ | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 呉地先海域 | | | | | 呉地先海域 | - | | | | |
| - | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | e mini | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | | | |
| _ | ±生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | | | | | | | | | | | | |
| _ | <u> </u> | 4.1 | | 年間 | 調査 | 下層 | | | 年間 | 調査 组 | ·層 | | |
| | | 位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | r | n/n |
| | 流量 m3 | 3/S | | | | | | | | | | | |
| | рН | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | 1.4 | 1.1 | ~ | 2.0 | 0 / 12 | 1.5 | 1.1 | ~ | 2.3* | 1 | / 36 |
| | | g/L g/L | (1.5) | 1.1 | | 2.0 | 0 / 12 | (1.6*) | 1.1 | | 2.3* | 1 | / 30 |
| 一般 | | g/L | ,1.0, | | | | 1 | (1.0.) | | | | 1 | |
| 項 | 大腸菌数 | 100mL | | | | | | | | | | | |
| 目 | | g/L | | | - | | | | | | | | |
| | | g/L | 0.11 | <0.05 | ~ | 0.17 | 0 / 12 | 0.12 | <0.05 | ~ | 0.17 | 0 | / 24 |
| | | g/L | 0.023 | 0.016 | \sim | 0.033* | 1 / 12 | 0.022 | 0.015 | ~ | 0.033* | 2 | / 24 |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | - | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | L | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| | ~ | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| /edu. | | g/L | | | | | | | | | | | |
| 健康 | | g/L | | | | | | | | | | | |
| 項 | | g/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | ~ | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | 0.016 | /0.005 | | 0.000 | 0 / 10 | 0.017 | /0.005 | | 0.000 | _ | / 04 |
| | | g/L g/L | 0.016 0.007 | <0.005 <0.005 | ~ | 0.068 | 0 / 12 | 0.017 0.007 | <0.005 <0.005 | ~ | 0.069 | 0 | / 24 |
| | | g/L g/L | 0.001 | \0.003 | | 0.010 | 0 / 12 | 5.001 | \0.000 | - | 0.010 | 0 | , 44 |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 mg | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | | g/L | | | | | | | | | | 1 | |
| 殊項 | | g/L | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 目 | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| | , | g/L g/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | | g/L | 0.08 | 0.02 | ~ | 0.15 | - / 12 | 0.08 | 0.02 | ~ | 0.15 | - | / 24 |
| | | g/L | 0.01 | <0.01 | \sim | 0.01 | - / 12 | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.01 | - | / 24 |
| | | g/L | 0.012 | 0.005 | \sim | 0.019 | - / 12 | 0.011 | 0.004 | \sim | 0.020 | - | / 24 |
| .,, | TOC mg | | | | | | | 1.2 | 1.0 | \sim | 1.5 | - | / 6 |
| その | | /m3 | | | | | | 1.9 | <0.5 | ~ | 5.3 | - | / 12 |
| 佃 | | 5/cm | | | | | | | | | | - | |
| 項目 | | g/L 隻 | | | | | | | | | | | |
| Ħ | | g/L | | | | | 1 | | | | | - | |
| | | g/L g/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| L | ふん便性大腸菌群数 個/1 | 00mL | | | | | | | | | | | |
| _ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | 主其淮 | 自占である [→] レを | テオー | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度 |
|----|---|--------------|-------------------------|---------------|---|--------|--------|----------------------|------|-------|------|----------|
| | 系名 | | 安芸津•安浦均 | | | | | 安芸津•安浦 | | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境(| | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 34000003 (60 安芸津·安浦均 | | | | | 34000003(6 安芸津·安浦 | | | | |
| _ | 圧地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 安芸津・安浦は | | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| _ | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | 巴儿博物 | | | | | 地儿神桃 | | | |
| | 室素・全燐に係る水域名 | | 安芸津·安浦均 | 也先海域 | | | | 安芸津·安浦 | 地先海域 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II 1 | L) L V V | | | | II 1 | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | ±生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基≥ | 準類型 | | | | | | | | | | |
| 調 | 査名 | | | 年間調 | | | | | 1 | 間調査 中 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 pH | m3/S | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 0.0 | 0 / 12 |
| | | mg/L | 8.2 | 6.6* | ~ | 10 | 3 / 12 | 8.1 | 6.5* | ~ | 8.2 | 4 / 12 |
| | | mg/L | 0.2 | 0.0 | | 10 | 0 / 12 | 0.1 | 0.5* | | 10 | 7 / 12 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.9 | 1.3 | ~ | 2.5* | 3 / 12 | 1.8 | 1.2 | ~ | 2.1* | 2 / 12 |
| _ | | mg/L | (2.0*) | | | | | (2.0*) | | | | |
| 般 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項日 | 7 VIIV par 39 V | CFU/100mL | 100* | <1 | ~ | 500* | 6 / 12 | | | | - | |
| 目 | | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 | | | | | |
| | | mg/L | 0.16 | 0.11 | ~ | 0.24 | 0 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | 0.026 | 0.014 | ~ | 0.039* | 2 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | |
| | | mg/L | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 / 6 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | , , | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| 項目 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| Н | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L mg/L | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.02 | - / 6 | | | | | |
| | | mg/L mg/L | 0.01 | 0.011 | ~ | 0.02 | - / 6 | | | | | |
| | | mg/L | 0.010 | 0.011 | - | 0.031 | / 0 | | | | | |
| そ | | mg/m3 | 1.0 | <0.5 | ~ | 2.6 | - / 12 | | | | | |
| の | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | , 12 | | | | | |
| 他項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | - | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 備考:環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 関/100mL | ### | → . 1- | | | | | | | | |
| | 4m を・ *〒TELL-(中和771//) W FI 1 大久水(市の発 | - Tel El 2 | m m バホムニレむ | THE TA | | | | | | | | |

| _ | | | Laterman and the | | | | | | or d | | | (2024 年度) |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|--------|---|--------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| | 系名 字機則 | | 安芸津·安浦坦 | | | | | 安芸津・安浦: | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 34000003 (60 | | | | | 広島県環境係 34000003(60 | | | | |
| - | 定地点名 | | 安芸津•安浦均 | | | | | 安芸津・安浦: | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 安芸津·安浦均 | | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| _ | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | L) LII 91 | | | | ※ A イ | 2,21,7-5,1 | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 安芸津·安浦均 | 也先海域 | | | | 安芸津·安浦 | 地先海域 | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II イ | | | | | Ⅱ イ | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 *** な | 類型 | | Ar FI | 3=10-1 | - E | | | Æ RF | 1=m + / | \ F | |
| 司府 | 査名 測定項目 〕 | 単位 | 平均 | 最小 | 問査 T | · / / / / / / / / / / / · / / / / · / | m/n | 平均 | 最小 |]調査 á ~ | E.唐 最大 | m/n |
| | | 中亚 n3/S | T-89 | 取小 | | 取八 | 111/11 | 十秒 | 取小 | | 取八 | 111/11 |
| | pH | 110, 0 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 36 |
| | | ng/L | 8.0 | 6.6* | ~ | 9.5 | 4 / 12 | 8.1 | 6.5* | ~ | 10 | 11 / 36 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | (75%值) n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | COD | ng/L | 1.8 | 1.2 | \sim | 2.3* | 3 / 12 | 1.8 | 1.2 | \sim | 2.5* | 8 / 36 |
| - | | ng/L | (1.9*) | | | | | (2.0*) | | | | 1 |
| 般恆 | | ng/L | | | | | | 100 | | | #A - | 0 1 1 |
| 項目 | | U/100mL | | | | | | 100* | <1 | ~ | 500* | 6 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | <0.5 0.16 | <0.5 0.11 | ~ | <0.5 0.24 | 0 / 2 |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | 0.16 | 0.11 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.24 | 2 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | 0.020 | 0.014 | | 0.035** | 2 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 8.0 | 6.6 | ~ | 9.5 | 0 / 12 | 8.0 | 6.6 | ~ | 9.5 | 0 / 12 |
| | カドミウム n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン n | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 自 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 n | ng/L | | | | | | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 / 6 |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | ng/L | | | | | | | | | | - |
| 殊項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 月 | | ng/L ng/L | | | | | | - | | | | + |
| H | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.02 | - / 6 |
| 1 | | ng/L | | | | | | 0.018 | 0.011 | ~ | 0.031 | - / 6 |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| その | | ıg/m3 | | | | | | 1.0 | <0.5 | \sim | 2.6 | - / 12 |
| の他 | | S/cm | | | _ | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | 1 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | + |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | - |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | - | | | | + |
| 1 | | 11g/L /100mL | | | | | | | | | | |
| Щ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | L 毎よっぺもファしか | テナ | | | 1 | ı | 1 | | | 1 |

| | | • | 公共用 | 小吸小 | 、貝 | 例化加 | 中木 心 | 1日 4X | | | | (2024 年度) |
|---------|--|--------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------|--------|-----|-----------|
| _ | 系名 | | 安芸津•安浦均 | | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| - | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 34000004 (60 安芸津·安浦均 | | | | | 34000004 (60 安芸津·安浦: | | | | |
| | ^{圧地思名} DD等に係るあてはめ水域名 | | 安芸津·安浦均 | | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | a) a i i y i | | | | ※ A イ | 2,21,7 -,7 | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る水域名 | | 安芸津·安浦均 | 也先海域 | | | | 安芸津·安浦 | 地先海域 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | alfa vicent arteil | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息状況の適応性に係る係る環境基≦ E生物の生息・再生産する場の適応性に係るス | | | | | | | | | | | |
| _ | 三生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| _ | 查名 | 1 // 12 | | 年間調 | 査 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | '層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | 0.4 | | | | |
| | pH DO | /1 | 8.1 8.2 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 |
| | BOD | mg/L mg/L | 0.2 | 6.4* | ~ | 10 | 3 / 12 | 0.1 | 6.4* | ~ | 9.1 | 2 / 12 |
| | (75%值) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.5 | 1.0 | ~ | 2.1* | 1 / 12 | 1.5 | 1.1 | ~ | 1.8 | 0 / 12 |
| _ | (75%値) | mg/L | (1.7*) | | | | | (1.7) | | | | |
| 般佰 | SS Lug ## | mg/L | 100- | | | 0.40 | 0 / 10 | | | | | |
| 月目 | 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質 油分等 | mg/L | 120* | <1 <0.5 | ~ | 940* | 6 / 12 | | | | | + |
| | ローペイリン抽出物員_曲万寺 全窒素 | mg/L | 0.13 | 0.07 | \sim | 0.20 | 0 / 12 | | | | | + |
| | 全燐 | mg/L | 0.027 | 0.014 | ~ | 0.035* | 3 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | LAS 底层次左範末县 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 カドミウム | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン チオベンカルブ | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | · | | | | | · | |
| | 亜硝酸性窒素 西部粉件空車 1.7 五 1.5 新粉件空車 | mg/L | 0.00 | /0.01 | | 0.00 | 0 / 0 | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 | mg/L | 0.03 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 / 6 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 坦目 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| H | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.03 | - / 6 | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | 0.017 | 0.009 | ~ | 0.030 | - / 6 | | | - | · | |
| z | TOC | mg/L | 1 1 | /0.5 | | 0.0 | / 10 | | | | | |
| その | | mg/m3 μS/cm | 1.1 | <0.5 | ~ | 3.2 | - / 12 | | | | | |
| 他 | 電気伝導及 メチレンブルー活性物質 | μS/cm mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール ふん便性大腸菌群数 | mg/L 個/100mL | | 1 | | | | | | | | + |
| <u></u> | おんで性人勝困群数 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の形 | | L 毎上ポキファ1.ナ | | | | 1 | I | 1 | | | |

| #素名 安容線で講題先 安容線で講題先 安容線で講題先 安容線で講題先 安容線で講題先 1000004 (607-04) 30 | 是層 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 0.038* | m/n 0 / 36 8 / 37 |
|--|--|-------------------|
| 調定性点容子 34000004 (607-04) 34000004 (607-04) 2 回途性点名 安芸峰 安瀬 地名 宋 田 | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| 画文性点名 | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| (CODPに係えるたは必水底名 | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| A | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| 安芸学 安陽史発育版 安芸学 安陽東発育版 安芸学 安陽東発育版 安芸学 安陽東発育版 安芸学 安陽東発育版 安芸学 安陽東発育版 安芸学 安陽東発育版 東生生物の生息状況の適応性に係ら水域名 大生生物の生息・状況の適応性に係ら水域名 大生生物の生息・特と番目を場合の適応性に係ら水域名 大生生物の生息・特と番目を場合の適応性に係ら水域名 東田 | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| ※ 日イ ※ 日イ ※ 日イ ※ 日イ ※ 日イ ※ 日イ ※ 日イ ※ 日本 | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| 株生生物の生息状況の適応性に係る木成名 株生生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株生物の生息・肝生素でも場の適応性に係る大成名 株型 | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| #生き中の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準期間 | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| 要性名 | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| 謝定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 最小 ~ 2 通畫 m3/S | 最大 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| 施盤 | 8.2 10 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 0 / 36 8 / 37 |
| Hi | 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 8 / 37 |
| DO mg/L 8.0 6.5* ~ 9.5 3 / 13 8.1 6.4* ~ 0 BOD mg/L mg/ | 2.1* 940* <1.0* 0.22 | 8 / 37 |
| BOD (75%値) mg/L (1.6 mg/L | 2.1* 940* <1.0* 0.22 | , |
| (75%値) | 940* <1.0* 0.22 | 1 / 36 |
| COD | 940* <1.0* 0.22 | 1 / 36 |
| 株 | <1.0* 0.22 | |
| 大腸菌数 | <1.0* 0.22 | |
| 日 日 一へ平す・抽出物質・油分等 | <1.0* 0.22 | |
| 1 | 0.22 | 6 / 12 |
| 全体 mg/L 0.028 0.011 ~ 0.038* 4 / 12 0.028 0.011 ~ 2 全 整 | | 1 / 2 |
| 全亜鉛 | 0.038* | 0 / 24 |
| J=ルフェノール mg/L m | | 7 / 24 |
| LAS | | |
| 底層溶存酸素量 | | |
| ### 1 | 9.7 | 0 / 12 |
| 全シアン mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | | 0 / 15 |
| 会 一 | | |
| 砒素 mg/L 総木銀 mg/L アルキル水銀 mg/L PCB mg/L ジクロメタン mg/L 四塩化炭素 mg/L 1,2-ジクロロエタン mg/L 1,1-ジクロロエチン mg/L 1,1-ジクロロエチン mg/L 1,1-リクロロエチン mg/L 1,1-リクロロエチン mg/L 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 1,1,2-トリクロロエタン mg/L トリクロロエチレン mg/L ドラクロロエチレン mg/L ス-ジクロロプペン mg/L カマラム mg/L チャラム mg/L チャラム mg/L チャラム mg/L チャラム mg/L チャインカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| 総水銀 mg/L アルキル水銀 mg/L PCB mg/L ジクロロメタン mg/L 四塩化炭素 mg/L 1,2-ジクロロエチン mg/L 1,1-ジクロロエチン mg/L 1,1,1-トリクロロエチン mg/L 1,1,2-トリクロロエチン mg/L 1,1,2-トリクロロエチン mg/L 1,1,2-トリクロロエチン mg/L 1,1,3-ジクロプロエチン mg/L 1,3-ジクロプロペン mg/L 1,3-ジクロプロペン mg/L 2,3-ジクロプロペン mg/L 5-デーラム mg/L 5-デークム mg/L 5-デークス mg/L | | |
| アルキル水銀 mg/L PCB mg/L ジクロスタン mg/L 四塩化炭素 mg/L 1,2-ジクロロエチン mg/L 1,1-ジクロロエチレン mg/L シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 1,1,1-リクロエタン mg/L 1,1,2-リクロロエチレン mg/L ドラクロロエチレン mg/L 1,3-ジクロロプロペン mg/L チャラム mg/L シマジン mg/L チオペンカルプ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| PCB mg/L ジクロロメタン mg/L 四塩化炭素 mg/L 1,2-ジクロロエチン mg/L ンス-1,2-ジクロロエチレン mg/L シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 1,1,1-トリクロロエタン mg/L トリクロロエチレン mg/L トラクロロエチレン mg/L テラクロロエチレン mg/L カーラム mg/L ナマジン mg/L チオペンカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| ジクロロメタン mg/L 1,2-ジクロロエチン mg/L 1,1-ジクロロエチレン mg/L ンス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 1,1,2-トリクロロエタン mg/L トリクロロエチレン mg/L トリクロロエチレン mg/L テラクロロエチレン mg/L オーカム mg/L シマジン mg/L チオベンカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| 四塩化炭素 mg/L 1,2-ジクロロエタン mg/L 1,1-ジクロロエチレン mg/L 1,1-ジクロロエチレン mg/L 1,1-ドリクロロエチレン mg/L 1,1,1-ドリクロロエタン mg/L 1,1,2-ドリクロロエタン mg/L 1,1,2-ドリクロロエタン mg/L 1,3-ドラクロロエチレン mg/L アトラクロロエチレン mg/L 1,3-ジクロロプロペン mg/L 2+ジマジン mg/L 2+ブラム mg/L 2+ブラム mg/L 2+ブウラム mg/L 2+ブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブ | | |
| 1,2-ジクロロエタン mg/L 1,1-ジクロロエチレン mg/L 1,1-リクロロエチレン mg/L 1,1-リクロロエタン mg/L 1,1-リクロロエタン mg/L 1,12-リクロロエタン mg/L 1,12-リクロロエチレン mg/L 1,2-リクロロエチレン mg/L 1,3-ジクロコエチレン mg/L 1,3-ジクロコプロペン mg/L 1,3-ジクロコブロペン mg/L 1,3-ジクロコブロズロブロブロブロブロブロブロブロブロブロブロブロブロブロブロブロブロブロ | | |
| 1,1-ジクロロエチレン mg/L | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 1,1,2-トリクロロエタン mg/L トリクロロエチレン mg/L デトラクロロエチレン mg/L 1,3-ジクロロプロペン mg/L チウラム mg/L シマジン mg/L チオベンカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 1,1,2-トリクロロエタン mg/L 1,1,2-トリクロロエチレン mg/L トリクロロエチレン mg/L トラクロロエチレン mg/L 1,3-ジクロロプロペン mg/L チャウスム mg/L ケウラム mg/L ケマジン mg/L ケマジン mg/L ケマジン mg/L ケマジン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゼン mg/L ケンゲン mg/L | | |
| 原 項 1,1,2-トリクロロエタン mg/L トリクロロエチレン mg/L 下ラクロロエチレン mg/L 1,3-ジクロロプロペン mg/L チウラム mg/L シマジン mg/L ケオペンカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| 日 | | |
| 1,3~ジクロロプロペン mg/L チウラム mg/L シマジン mg/L チオベンカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| チウラム mg/L シマジン mg/L チオベンカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| シマジン mg/L チオベンカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| チオペンカルブ mg/L ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| ベンゼン mg/L セレン mg/L | | |
| セレン mg/L | | - |
| , and the second | | |
| MERMIT 会 女 | | |
| 硝酸性窒素 | | |
| 研酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.03 (0.01 ~ | 0.08 | 0 / 6 |
| ふっ素 mg/L | | |
| lまう素 mg/L | | |
| 1,4-ジオキサン mg/L | | |
| 特 銅 mg/L | - | |
| 殊 <u>鉄 溶解性</u> mg/L mg/L | | |
| 項 マンガン_溶解性 mg/L mg/L mg/L | | |
| yuz mg/L | | |
| 塩素イオン mg/L | | - |
| 有機能窒素 mg/L 0.01 (0.01 ~) | 0.03 | - / 6 |
| プンモニア 態室系 mg/L 0.01 | 0.03 | - / 6 |
| | 0.000 | / 0 |
| そ クロロフィルa mg/m3 1.1 <0.5 ~ | 3.2 | - / 12 |
| 電 気伝導度 μS/cm | | , 15 |
| 他 | | |
| | | |
| トリハロメタン生成能 mg/L | | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L mg/L | | |
| アニリン mg/L | | |
| 2, 4-ジクロロフェノール mg/L mg/L | | |
| ふん便性大腸菌群数 | | |

| | | | | | | | | | | | | | (20 | 24 | 年度) |
|----------|---|--------------|------------------|---------|---------------------|-----------------|-----|----|-------------------------|-------|--------|-------|--------------|-----|-----|
| _ | 《系名 | | 安芸津•安浦均 | | | | | | 安芸津·安浦」 | | | | | | |
| | 定機関 | | 呉市環境試験 | | | | | | 呉市環境試験 | | | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 34000006 (60 | | | | | | 34000006 (60 | | | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 安芸津•安浦均安芸津•安浦均 | | | | | | 安芸津·安浦士安芸津·安浦士 | | | | | | |
| | OD等に係るのではめが吸名 OD等に係る環境基準類型 | | 安云伴・安併り ※ A イ | 巴兀伊坝 | | | | | ★ A イ | 也元件坝 | | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 安芸津・安浦均 | h失海械 | | | | | 安芸津・安浦5 | 业生海域 | | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅱイ | 5月1年49、 | | | | | Ⅱイ | 也几何极 | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | пи | | | | | | H *1 | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 維指型 | | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | 年間調査 | 生 上層 | (表層) | | | | 年間 | 調査中 | 層 | | | |
| Ė | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | Т | m/i | n |
| | | m3/S | | .,,, | | | | | | .,,,, | | | \top | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / | 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 | / | 12 |
| | DO | mg/L | 7.9 | 6.4* | ~ | 9.5 | 5 / | 12 | 7.9 | 6.3* | ~ | 9.3 | 4 | / | 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.4 | 1.0 | \sim | 1.6 | 0 / | 12 | 1.3 | 0.9 | \sim | 1.7 | 0 | / | 12 |
| <u> </u> | | mg/L | (1.5) | | | | | | (1.4) | | | | | | |
| 般 | | mg/L | 2 | <1 | \sim | 5 | | 12 | 2 | 1 | \sim | 4 | 0 | / | 12 |
| 項目 | 7 V/100 EEE 59X | FU/100mL | 1 | <1 | \sim | 3 | | 12 | | | | | ↓ | | |
| П | 11 ペイリン抽山初貝_加力寺 | mg/L | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | | 12 | | | | | ₩ | | |
| 1 | | mg/L | 0.11 | <0.05 | \sim | 0.16 | | 12 | | | | | ₩ | | |
| 1 | | mg/L | 0.020 | 0.013 | ~ | 0.032* | | 12 | | | | | + | | |
| 1 | | mg/L | <0.001 | <0.001 | ~ | <0.001 | 0 / | 1 | | | | | +- | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | + | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | + | | |
| | | mg/L | Z0,0002 | <0.0003 | ~ . | /0.0002 | 0 / | 2 | | | | | + | | |
| | | mg/L mg/L | <0.0003 <0.1 | <0.1 | ~ | <0.0003 <0.1 | 0 / | 2 | | | | | + | | |
| | | _ | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / | 2 | | | | | +- | | |
| | | mg/L mg/L | <0.003 | <0.005 | ~ | <0.003 | 0 / | 2 | | | | | + | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / | 2 | | | | | +- | | |
| | | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.005 | 0 / | 2 | | | | | + | | |
| | | mg/L | (0.0000 | (0.0000 | | (0.0000 | 0 / | | | | | | + | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | +- | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | T | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | T | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 月 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | ₩ | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | ₩ | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | + | | |
| | | mg/L | | | | | - | | | | | | + | | |
| 1 | | mg/L | 0.05 | /0.01 | | 0.00 | 0 / | 0 | | | | | + | | |
| 1 | | mg/L | 0.05 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 / | 2 | | | | | + | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | +- | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | +- | | |
| - | AFI | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - / | 1 | | | | | +- | | |
| 特础 | | mg/L mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | | 1 | | | | | + | | |
| 項 | マンガン 溶解性 | | <0.1 | <0.1 | $\frac{\sim}{\sim}$ | <0.1 | - / | 1 | | | | | +- | | |
| 目 | TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE | mg/L mg/L | <0.1 | <0.1 | $\frac{\sim}{\sim}$ | <0.1 | - / | 1 | | | | | + | | |
| H | | mg/L | 17800 | 17100 | ~ | 18300 | | 12 | 17900 | 17300 | ~ | 18600 | - | / | 12 |
| 1 | | mg/L | 2,000 | 11100 | | 10000 | | | 1.000 | 11000 | | 15000 | + | | 14 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | + | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | クロロフィルa n | ng/m3 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| の | 雪気伝道度 | u S/cm | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 他項 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 日 | | 度 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | · | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | · | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - | | | |
| L | | 周/100mL | | | | | | _ | | | | | ш¯ | | |
| _ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 4 中 1 | 供占づたファルナ | | | | | | - | | | | | _ | _ |

| | | | T | | | | | | | | | (20: | 24 年月 | 变) |
|-----|---|-------------------|---------------|---------|-----------|-------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|------|--------|----|
| _ | 《系名 | | 安芸津•安浦 | | | | | 安芸津・安浦5 | | | | | | |
| _ | 川定機関 | | 呉市環境試験 | | | | | 呉市環境試験 | | | | | | |
| | 川定地点番号 | | 34000006 (60 | | | | | 34000006 (60 | | | | | | |
| _ | 川定地点名 | | 安芸津・安浦 | | | | | 安芸津·安浦 | | | | | | _ |
| | OD等に係るあてはめ水域名 | | 安芸津•安浦: | 地允海ッ | | | | 安芸津•安浦5 | 也允滞攻 | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | 나 사 사 내 | | | | ※ A イ | 1b #- 36: 1ch | | | | | _ |
| | と窒素・全燐に係る水域名 ・空素・ | | 安芸津•安浦 | 地尤一世 | | | | 安芸津·安浦坦 | 也尤涉坝 | | | | | |
| _ | 全窒素・全燐に係る環境基準類型 サルサの作品が3000000000000000000000000000000000000 | | Ⅱ イ | | | | | Ⅱ イ | | | | | | _ |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | ##* W## WEST TRAI | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 骨査名 | 基準類空 | | 年刊 | 問調査 下 | · 🖂 | | | 午 朋 | 調査 🕯 | △ 🖂 | | | _ |
| Д/ц | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | 11mm ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | 艸 且 ∃ | 最大 | | m/n | _ |
| | 流量 | m3/S | 7-49 | 取小 | | 取八 | 111/11 | +≈ | 取小 | | 取八 | | 111/11 | _ |
| | pH | 1110/ 5 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 | / 3 | 36 |
| | DO | mg/L | 7.9 | 6.3* | ~ | 9.4 | 6 / 12 | 7.9 | 6.3* | ~ | 9.5 | 15 | | 36 |
| | BOD | mg/L | | 0,0 | | 011 | 0 / 12 | | 0.0 | | 0.0 | 10 | , , | _ |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.4 | 0.9 | ~ | 1.7 | 0 / 12 | 1.3 | 0.9 | ~ | 1.7 | 0 | / 3 | 36 |
| | (75%値) | mg/L | (1.6) | | | | , | (1.5) | | | | | | |
| 一般 | | mg/L | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 | 2 | <1 | ~ | 5 | 0 | / 3 | 36 |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | 1 | <1 | ~ | 3 | 0 | | 12 |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 | | 12 |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | 0.11 | <0.05 | ~ | 0.16 | 0 | / 1 | 12 |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | 0.020 | 0.013 | \sim | 0.032* | 1 | / 1 | 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | <0.001 | <0.001 | \sim | <0.001 | 0 | / 1 | 1 |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| L | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | | 2 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 | | 2 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | <0.005 | < 0.005 | \sim | <0.005 | 0 | | 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 | | 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | | 2 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 2 | 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | _ |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1 //// 0 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-19900000 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ナワフム シマジン | mg/L | | | | | | | | | | - | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | - | | _ |
| | ベンゼン | mg/L mg/L | | 1 | | | | | | | | 1 | | _ |
| | セレン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | + | | | | | | | | 1 | | _ |
| | 明酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | + | | | | 0.05 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 | / 5 | 2 |
| | かつ素 | mg/L | | + | | | | 0.00 | 10.01 | | 5.00 | 1 | , 4 | - |
| | ほう素 | mg/L | | 1 | | | | | | | | 1 | | _ |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | 1 | | | | | | | | 1 | | _ |
| A:+ | AFF | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - | / 1 | 1 |
| 特殊 | | mg/L | | 1 | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | + | / 1 | _ |
| 殊項 | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | | _ |
| 目 | クロム | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - | | 1 |
| | 塩素イオン | mg/L | 17700 | 17100 | ~ | 18400 | - / 12 | 17800 | 17100 | \sim | 18600 | - | | 36 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| そか | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | | | | | | | |
| の他 | 电双伍得及 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| f | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | 1 | 1 | | | 1 | <u> </u> | 1 | | | 1 | | |

| | T 10 | | Later to the state of | 1. 11. | | | | | Late March | d. th. | | | (2024 年度 |
|----|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------|---------|-----|-------|-----------------------|-----------|-------|-------|------------------|
| | 系名 定機関 | | 安芸津・安浦均 | | | | | | 安芸津•安浦 | | | | |
| _ | た機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 34000010(60 | | | | | | 呉市環境試験 34000010(60 | | | | |
| _ | 定地点名 | | 安芸津・安浦均 | | | | | | 安芸津•安浦 | | | | |
| | OD等に係るあてはめ水域名 | | 安芸津·安浦均 | | | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | 272117 91 | | | | | ※ A ſ | 2,21,4 ,4 | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 安芸津·安浦均 | 也先海域 | | | | | 安芸津·安浦 | 也先海域 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準数 | 頁型 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水場 | 成名 | | | | | | | | | | | |
| _ | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 査名 | | | 年間調査 | | | | | | | 問酒査 中 | | |
| | | 位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | | 3/S | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | 0 / 10 |
| | pH DO m | /¥ | 8.1 7.9 | 8.0 | ~ | 8.1 | | 12 | 8.1 7.8 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 5 / 12 |
| | | g/L | 7.9 | 6.4* | ~ | 9.3 | 5 / | 12 | 1.8 | 6.3* | ~ | 9.2 | 5 / 12 |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | 1.4 | 1.0 | ~ | 1.8 | 0 / | 12 | 1.3 | 0.9 | ~ | 1.8 | 0 / 12 |
| Ì | | g/L g/L | (1.6) | 1.0 | . ~ | 1.0 | 0 / | 14 | (1.5) | 0.9 | . ~ | 1.0 | 0 / 12 |
| 一般 | | g/L g/L | 3 | <1 | ~ | 8 | 0 / | 12 | 3 | 1 | ~ | 7 | 0 / 12 |
| 取項 | | g/L /100ml | 1 | <1 | ~ | 1 | | 12 | | 1 | | | 0 / 12 |
| Î | 7 (100) (11 5) (1 | g/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | | 12 | | | | | |
| Ì | | g/L | 0.11 | <0.05 | ~ | 0.17 | | 12 | | | | | |
| Ì | | g/L | 0.021 | 0.013 | ~ | 0.031* | | 12 | | | | | |
| | | g/L | 0.001 | 0.001 | ~ | 0.001 | 0 / | 1 | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| L | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム m | g/L | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 / | 2 | | | | | |
| | 全シアン m | g/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / | 2 | | | | | |
| | 鉛 m | g/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 2 | | | | | |
| | | g/L | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / | 2 | | | | | |
| | | g/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 2 | | | | | |
| | | g/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / | 2 | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1 1/// 11 | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| H | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | | g/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | セレン m | g/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | | g/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | 0.05 | <0.01 | \sim | 0.08 | 0 / | 2 | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | | g/L | | | | | | | | | | | |
| _ | | g/L | , | | | | | | | | | | |
| 特 | | g/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | - / | 1 | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 m | g/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - / | 1 | | | | | |
| 月目 | 217771 | g/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 | | | | | |
| Ë |) III | g/L | <0.1 17700 | <0.1 | ~ | <0.1 | - / | 1 1 2 | 17000 | 17100 | | 10500 | _ / 10 |
| | | g/L | 11100 | 17100 | ~ | 18600 | - / | 12 | 17900 | 17100 | ~ | 18500 | - / 12 |
| | 有機態窒素 m アンモニア態窒素 m | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | | g/L g/L | | | | | | | | | | | |
| そ | | g/L g/m3 | | | | | | | | | | | |
| の | 零年 仁 道 由 | S/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 m | g/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| l | | g/L | | | | | | | | | | | |
| Ì | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 個/ | 100mL | | | | | | | | | | | 1 |
| _ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | 4. 甘; | 世上ポナファルナ | - + | | | | | | | | | |

| _ | | | Lata mass at a second | | | | | 10 AX | | | | (2024 | 年度) |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------|-------|--------|-----------------------|---------------|--------|----------|-------|------|
| | 系名 字機関 | | 安芸津·安浦地 | | | | | 安芸津・安浦: | | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 呉市環境試験 34000010(60) | | | | | 呉市環境試験 34000010(60 | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 安芸津•安浦地 | | | | | 安芸津・安浦: | | | | | |
| | OD等に係るあてはめ水域名 | | 安芸津·安浦地 | | | | | 安芸津・安浦: | | | | | |
| _ | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | 272117 77 | | | | ※ A イ | 2,21,7 -,1 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 安芸津·安浦地 | 也先海域 | | | | 安芸津·安浦 | 地先海域 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | Ж П イ | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 1.** 2 | 準類型 | | ケ目 | B=m→ ⊤ | | | | <i>F</i> − 88 | -m-+ | A E2 | | |
| 司间 | 查名 | 出仕 | 平均 | | 問調査 下 ∼ | | m /n | 平均 | | 調査 🛭 | | | /n |
| | 測定項目流量 | 単位 m3/S | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | III | /n |
| | pH | 1110/ 5 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 | / 36 |
| | | mg/L | 7.8 | 6.5* | ~ | 9.3 | 6 / 12 | 7.8 | 6.3* | ~ | 9.3 | 16 | / 36 |
| | | mg/L | | | | | - , | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.3 | 0.9 | ~ | 1.7 | 0 / 12 | 1.3 | 0.9 | \sim | 1.8 | 0 , | / 36 |
| <u> </u> | | mg/L | (1.5) | | | | | (1.5) | | | | | |
| 般 | | mg/L | 4 | 1 | ~ | 8 | 0 / 12 | 3 | <1 | ~ | 8 | 0 , | / 36 |
| 項目 | 7 120 11 391 | CFU/100mL | | | | | | 1 | <1 | ~ | 1 | 0 , | / 12 |
| Н | | mg/L | | | | | 1 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 , | / 12 |
| | | mg/L | | | | | | 0.11 | <0.05 | ~ | 0.17 | 0 , | / 12 |
| 1 | | mg/L | | | | | | 0.021 | 0.013 | ~ | 0.031* | 2 , | / 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | - | 0.001 | 0.001 | ~ | 0.001 | 0 , | / 1 |
| | | mg/L | | | | | + | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| F | | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 , | / 2 |
| | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 , | / 2 |
| | | mg/L | | | | | | < 0.005 | < 0.005 | \sim | < 0.005 | 0 , | / 2 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | < 0.01 | < 0.01 | \sim | <0.01 | 0 , | / 2 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 , | / 2 |
| | | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 , | / 2 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | 1 | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| 康 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 2 2 1 1 1 1 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | + | 0.05 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 | / 2 |
| 1 | | mg/L | | | | | 1 | 0.00 | .0.01 | | 5.00 | , | |
| 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | - , | / 1 |
| 殊 | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - , | / 1 |
| 項 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | - , | / 1 |
| 目 | | mg/L | | | | | 1 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | - , | / 1 |
| | | mg/L | 17900 | 17200 | ~ | 18700 | - / 12 | 17800 | 17100 | ~ | 18700 | - , | / 36 |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | 燐酸態燐 TOC | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| そ | | mg/L mg/m3 | | | | | + | | | | | | |
| の | 1 | μS/cm | | | | | + | | | | | | |
| 他语 | | μ S/CIII mg/L | | | | | + | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| L | ふん便性大腸菌群数 | 圆/100mL | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 11 音響 | 生占であることか. | | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | 111 12 | | | | (2024 年度) |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------|---|--------|----------|-----------------------|-------------|--------|-----|-----------|
| | 系名 | | 安芸津•安浦地 | | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境(34000065(6 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 34000065 (607 安芸津·安浦地 | | | | | 34000065 (6 安芸津·安浦 | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 安芸津·安浦地 | | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | 女云伴·女佣儿 A イ | コノレ1呼切 | | | | 女云伴・女佣 A イ | ペロノレ1円代 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 安芸津•安浦地 | 也先海域 | | | | 安芸津·安浦 | 地先海域 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | 27217474 | | | | ※ Ⅱ イ | - 0,017 -,1 | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| 挪 | 査名 | | | 年間調 | | | | | 1 | 調査中 | | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 r pH | n3/S | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.6 | 1.2 | ~ | 2.0 | 0 / 12 | 1.5 | 1.1 | \sim | 1.9 | 0 / 12 |
| _ | | ng/L | (1.7) | | | | <u> </u> | (1.7) | | | | |
| 般 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 |) Child Ed 500 | U/100mL | | | | | | | | | | |
| Ħ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | 0.13 | 0.06 | ~ | 0.18 | 0 / 12 | | | | | |
| | | ng/L | 0.026 | 0.019 | ~ | 0.034* | 3 / 12 | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | + | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 月 | トリクロロエチレン n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | - | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | + | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 n | ng/L | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.07 | 0 / 6 | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | ほう素 n | ng/L | | | | | | | | - | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | ng/L | | | | | 1 | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 n | ng/L | | | | | 1 | | | | | |
| 月日 | 1 71 1 g/g / / 1 E | ng/L | | | | | | | | | | |
| F | | ng/L | | | | | + | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.02 | - / 6 | | | | | |
| | | ng/L | 0.018 | 0.009 | ~ | 0.030 | - / 6 | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| その | | g/m3 | 0.9 | <0.5 | ~ | 1.8 | - / 6 | | | | | |
| の他 | | S/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L /100mL | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | 生上ポナファルナ | <u>-</u> | | | 1 | L | | | | 1 |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----------|---|------------|---------------------|---------------|-------|------|--------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|
| | 系名 | _ | ⋭•安浦地 3.750.0570 | | | | | 安芸津・安浦 | | | | |
| _ | 定機関 | | 具環境保 065 (60) | | | | | 広島県環境係 34000065(60 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 065 (60 建•安浦坦 | | | | | 34000065 (60 安芸津·安浦: | | | | |
| | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | | ピ元0-5 也先海域 | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | イ | 5月1年48 | | | | A イ | 心儿博物 | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | | 也先海域 | | | | 安芸津·安浦 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | ※ Ⅱ | | 5761年494 | | | | ※ II イ | 也力 日 中 水 | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | 78. 11 | | | | | | 78. 12 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | 힌 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | _ | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間 | 問酒査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 🛭 | E層 | |
| | 測定項目 単 | と 平 | 均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | 流量 m3 | S | | | | | | | | | | |
| | рН | | | | | | | | | | | |
| | DO mg. | | | | | | | | | | | |
| | BOD mg. | | | | | | | | | | | |
| | (75%值) mg | | 0 | | | 0.0 | | 1.0 | | | | |
| | COD mg. | | .6 | 1.1 | ~ | 2.2* | 1 / 12 | 1.6 | 1.1 | \sim | 2.2* | 1 / 36 |
| <u> </u> | (75%値) mg. SS mg. | | .7*) | | | | | (1.7*) | | | | |
| 般項 | SS mg. 大腸菌数 CFU/i | | | | | | | | 1 | | | + |
| 目 | nーヘキサン抽出物質_油分等 mg | | | | | | | | | | | 1 |
| | 全窒素 mg | | | | | | | 0.13 | 0.06 | ~ | 0.18 | 0 / 12 |
| | 主皇帝 ing 全燐 mg | | | | | | | 0.026 | 0.00 | ~ | 0.034* | 3 / 12 |
| | 全亜鉛 mg | | | | | | | | | | | - / 12 |
| | ノニルフェノール mg | | | | | | | | | | | |
| | LAS mg. | | | | | | | | | | | |
| L | 底層溶存酸素量 mg | | .0 | 6.8 | ~ | 8.9 | 0 / 6 | 8.0 | 6.8 | ~ | 8.9 | 0 / 6 |
| | カドミウム mg. | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg | L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg | L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 mg | _ | | | | | | | | | | |
| | PCB mg | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg | | | | | | | | | | | 1 |
| | 四塩化炭素 mg | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg. 1,1-ジクロロエチレン mg. | | | | | | | | - | | | - |
| | 1,1-ンクロロエナレン mg. シス-1,2-ジクロロエチレン mg. | | | | | | | | | | | + |
| 健 | シス-1,2-シクロロエテレン mg. 1,1,1-トリクロロエタン mg. | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | 1 |
| 項目 | トリクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg. | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg. | | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg. | | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg. | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ mg. | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン mg. | | | | | | | | | | | |
| | セレン mg | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | 1 |
| | 亜硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg. | | | | | | | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.07 | 0 / 6 |
| | ふo素 mg | | | | | | | | | | | - |
| | ほう素 mg | | | | | | | | | | | |
| - | 1,4-ジオキサン mg | | | | | | | | | | | 1 |
| 特础 | 銅 mg 姓· 浓郁性 | | | | | | | | - | | | - |
| 殊項 | 鉄_溶解性 mg. マンガン_溶解性 mg. | | | | | | | | | | | + |
| 目 | マンガン_裕辨性 mg クロム mg | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン mg | | | | | | | | | | | 1 |
| | 有機態窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 mg | | | | | | | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.02 | - / 6 |
| | 燐酸態燐 mg. | | | | | | | 0.018 | 0.009 | ~ | 0.030 | - / 6 |
| | TOC mg. | L | | | | | | | | | | |
| そ | クロロフィルa mg/ | | | | | | | 0.9 | <0.5 | ~ | 1.8 | - / 6 |
| の他 | 電気伝導度 μ S, | cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 mg | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 度 | | | | | - | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg | | | | | | | | | | - | |
| | 4-t-オクチルフェノール mg | | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg. | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg. | | | | | | | | | | | |
| 1 | ふん便性大腸菌群数 個/10 | mL | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|-------|--|-----------|---|------------|----------|------|--------|---------------|------|--------|-----|-----------|
| | 系名 | | 燧灘北西部 24 元十二 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 | | | | | 燧灘北西部 | , | | | |
| | 定機関 | | 竹原市市民課 | | | | | 竹原市市民調 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 35000002 (61 | | | | | 35000002 (61 | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部2 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部2 | | | | |
| | OD等に係るめてはめ水域名 OD等に係る環境基準類型 | | | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| | OD寺に示る環境基準類空 :窒素・全燐に係る水域名 | | A イ 燧灘北西部 | | | | | A イ 燧灘北西部 | | | | |
| _ | :至系・主)殊に係る環境基準類型 | | | | | | | 1 | | | | |
| _ | ・至系・主解に保る環境基準頻至 生生物の生息状況の適応性に係る水域 | A7 | Ⅱ イ | | | | | Ⅱ イ | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環 生生物の生息・再生産する場の適応性に | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るF | | | | | | | | | | | |
| | 三王初の王志・丹王座する物の画応任に示る。 査名 | 米児巫学規生 | | 在問調 | 査 上層(| (表層) | | 1 | 在問 | 調査 中 | 屋 | |
| ци | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | <u> </u> | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | 1~0 | 月又/1、 | | 収八 | 111/11 | 1~0 | 取/1、 | | 以八 | 111/11 |
| | pH | mo/ b | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/L | | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.8 | 1.3 | ~ | 2.2* | 1 / 6 | 1.6 | 1.3 | ~ | 1.9 | 0 / 6 |
| | (75%值) | mg/L | (1.9*) | 1.0 | | | 1 , 3 | (1.7) | 1.0 | | 1.0 | , , |
| 般 | | mg/L | (==== 7) | | | | | (=/ | | | | |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | 1 | | | | | | | | |
| Ħ | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | 1 | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| : 殊項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 日 | 704 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | 1 | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|-----|---------------------------------------|--------------|---|--------|--------|-----|-------|-----------------|-----|--------|------|-----------|
| 200 | 系名 | | 燧灘北西部 24 元十二 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 | | | | | 燧灘北西部 | , | | | |
| | 定機関 | | 竹原市市民課 | | | | | 竹原市市民課 | | | | |
| | 定地点番号 | | 35000002 (61 | .0-52) | | | | 35000002 (61 | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部2 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部2 総難北亜部 | | | | |
| | DD等に係るのではの水域名 DD等に係る環境基準類型 | | | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| | SD等に床の条児室半規室 窒素・全燐に係る水域名 | | A イ 燧灘北西部 | | | | | A イ 燧灘北西部 | | | | |
| | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | 原至(無41.12月日) | | | | | Ⅱイ | | | | |
| _ | ・ | Z. | 11 /1 | | | | | п 4 | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に促 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年間 | 間調査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 全 | ·層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| l | pH | | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.6 | 1.5 | \sim | 1.7 | 0 / 6 | 1.7 | 1.3 | \sim | 2.2* | 1 / 18 |
| | (75%値) | mg/L | (1.7) | | | | | (1.7*) | | | | |
| 般照 | SS | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 7 Vilia (iii 5)X | CFU/100mL | | | | | | | | | | 1 |
| | 川- ペイリン抽山初貝_佃刀寺 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| l | 全窒素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + |
| l | 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 | | | | | | | | | | | - |
| l | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + |
| l | LAS | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| l | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | + |
| Г | が カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1 /// | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | | | | | | | | |
| l | チウラム | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| l | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| l | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| l | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| H | 7-4 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| l | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | 有機態窒素 アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| l | グーニー / 悲至系 燐酸態燐 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| l | 双件的 ISS XX TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| そ | | mg/m3 | | | | | | | | | | 1 |
| の | 索左仁道座 | μ S/cm | | | | | | | | | | + |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| - | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| l | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| I | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | ı ——— | 1 | | | | 1 - | 1 | | | |

| DO | | | | A 77 /11 / | | | | | | | | | (2024年 | 度) |
|--|-----|----------------|-------------|------------|----------|--------|----------|--------|--------|------------|-------|------|--------|----|
| 野部地域を | | | | | A am | | | | | 7 A 4m | | | | |
| 新史祖氏名 | | | | | | | | | | | | | | |
| GODST: | | | | | 0-01) | | | | | | | | | |
| TODPSY-PARTICIPATED Mark | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| 安徽と中級に対した。本名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 全型から地に係られている。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 株立生物の年度に対っると呼ばられる体質 を生物の年度に対っていまった。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 依生物の上色が改ら過ぎたらの色の間を活動性 第 4 物別人 を生物の上の音が生きが見がらいまたの間を含めて | | | | | () | | | | | <i>1</i>) | | | | |
| 依土生物の上の中国でもののでは、中国では、日本のでは、日 | | | 淮粨刑 | | | | | | 1 | | | | | |
| ### ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PR | | | | X 主初村A | <u></u> | | | | X 主初村A | .* | | | | |
| 新文名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊送電子 現在 平均 廃止 平均 廃止 平均 廃止 平均 廃止 平均 廃止 平均 廃止 平均 廃止 平均 廃止 平均 廃止 平均 下山 平均 下山 平均 下山 平均 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下 | | | 2-1-794-112 | | 年間調本 | - 上層 | (表層) | | | 年間 | 引調杏 中 | 1層 | | |
| 画像 | | | 単位 | 平均 | | | | m/n | 平均 | | | | m/n | |
| 1 | _ | | | , , | -12.4 | | -127 | | | 1,0,0 | | 1,00 | | |
| DOO Rg/L | H | | | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / | 12 |
| BOD | - 1 | | mg/L | 8.2 | 6.3* | \sim | | | 8.1 | 6.4* | ~ | | | 12 |
| COD | | BOD | | | | | | | | | | | | |
| COO | | (75%値) | | | | | | | | | | | | |
| 程 SS | | COD | | 1.6 | 1.1 | \sim | 2.3* | 2 / 12 | 1.5 | 0.9 | ~ | 1.9 | 0 / | 12 |
| 程 SS | | | | | | | | | (1.7) | | | | | |
| A 人類を使 | H | | | | | | | | | | | | | |
| Im-ペヤン曲出物質 治分等 | 項 | 大腸菌数 | _ | 96* | <1 | ~ | 440* | 7 / 12 | | | | | | |
| 空橋 mg/L 0.001 0.001 0.002 0.74 全要節 mg/L 0.0001 0.0001 0.0002 0.74 // CADYE/PAP mg/L 0.00006 <td>目</td> <td>n-ヘキサン抽出物質_油分等</td> <td>mg/L</td> <td><0.5</td> <td><0.5</td> <td>~</td> <td><0.5</td> <td>0 / 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 | | | | | | |
| 全事的 | j | 全窒素 | mg/L | 0.13 | 0.07 | ~ | 0.18 | 0 / 12 | | | | | | |
| A | Ī | 全燐 | mg/L | 0.028 | 0.018 | \sim | 0.044* | 3 / 12 | | | | | | |
| LAS | Ī | 全亜鉛 | mg/L | 0.001 | 0.001 | ~ | 0.002 | 0 / 4 | | | | | | |
| 政長の存储業量 | Ī | ノニルフェノール | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ~ | <0.00006 | 0 / 4 | | | | | | _ |
| ### 15-25 mg/L 0.0003 0.0003 0 / 1 からなアン | Ī | LAS | mg/L | <0.0006 | < 0.0006 | \sim | <0.0006 | 0 / 4 | | | | | | |
| 空シアン | [| 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 新 | - 1 | | mg/L | | < 0.0003 | ~ | < 0.0003 | 0 / 1 | | | | | | |
| 大徳 10 | | 全シアン | mg/L | <0.1 | < 0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 1 | | | | | | |
| 財産 | | 鉛 | mg/L | < 0.005 | <0.005 | \sim | < 0.005 | 0 / 1 | | | | | | |
| 歴史機 | | 六価クロム | mg/L | < 0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 1 | | | | | | |
| Pro | | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 1 | | | | | | |
| PCB | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | < 0.0005 | 0 / 1 | | | | | | |
| プクロスタン mg/L mg | | アルキル水銀 | | | | | | | | | | | | |
| 四域化炭素 | | PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 1 | | | | | | |
| 1.2=ジクロロエチレン mg/L | | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1.1-2クロロエチレン mg/L | | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| ### 1.1.1-ドリクロロエタン mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | | 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| ## 1.1.1~19/9ロコエタン | | 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2~リクロロエタシ mg/L | | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 11.2ペアリンロ・エラン 11.2ペアリンロ・エラン 11.2ペアリンロ・エラン 11.2ペアリンロ・アロン 11.3ペアリンロ・アロンロ・アロンロ・アロンロ・アロンロ・アロンロ・アロンロ・アロンロ・ | | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 日 | 項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロブロベン mg/L | 目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| チウラム mg/L シマジン mg/L チオペンカルブ mg/L ベンゼン mg/L 車解性窒素 mg/L 郵解性窒素 mg/L 網酸性窒素 mg/L 調酸性窒素 mg/L 1,4-ジオキサン mg/L 場解 mg/L オンガン溶解性 mg/L カロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機態窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L TOC mg/L TOC mg/L TOC mg/L プロコイルa mg/n3 1.3 <0.5 | - 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| シマジン mg/L デオペンカルブ mg/L ペンゼン mg/L セレン mg/L 前酸性窒素 mg/L 直硝酸性窒素 mg/L おっ素 mg/L ほう素 mg/L 1,4-ジオキサン mg/L 特解 mg/L クスガン溶解性 mg/L クロス mg/L 塩素イオン mg/L 有機態窒素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L が変素 mg/L アンモニア態窒素 mg/L が成性 mg/L フロフィルa mg/L の他 mg/L メチレンブルー活性物質 mg/L 同度 mg/L 別のロスルタン生成能 mg/L フロフィルa mg/L フロフィルa mg/L フロフィルa mg/L フロフィルa mg/L フロフィルa mg/L フレーオテナノフェノール mg/L フロスのよりと生成能 mg/L フロスのよりとよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ | - 1 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| デオペンカルブ mg/L ペンゼン mg/L せレン mg/L 前酸性窒素 mg/L 可酸性窒素 mg/L 前酸性窒素 mg/L 高砂性窒素 mg/L 15う素 mg/L 1,4-ジオキサン mg/L mg/L mg/L オージカン溶解性 mg/L プロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機態窒素 mg/L アンモニア施窒素 mg/L 内での mg/L プロフィルα mg/L 運気低海度 μ S/Cm メチレンブルー活性物質 mg/L 両皮 mg/L リハロメタン生成能 mg/L オーナオテルフェノール mg/L アンリン mg/L | | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| ペンゼン mg/L | ļ | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | Ĺ | | | | | | | | | | | | | |
| 前酸性窒素 | Ĺ | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 mg/L | Į. | | | | | | | | | | | | | |
| 研酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.03 <0.01 ~ 0.08 0 / 6 | - H | | | | | | | | | | | | | |
| ふつ素 | - 1 | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | _ L | | | 0.03 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 / 6 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン mg/L | - 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 特 mg/L 鉄、溶解性 mg/L マンガン_溶解性 mg/L クロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 体験能媒 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 電気伝導度 μ S/cm メテレンブルー活性物質 mg/L 週度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L アニリン mg/L | - 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 禁奏 | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 マンガン_溶解性 mg/L クロム mg/L 塩素イオン mg/L 有機能窒素 mg/L アンモニア能窒素 mg/L 構酸能媒 mg/L TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 1.3 <0.5 ~ 3.8 ~ / 12 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 日 クロム mg/L | - | | | | | | | | | | | | | |
| 塩素イオン mg/L | - | | | | | | | | | | | | | |
| 有機能窒素 | | , | | | | | | | 1 | | | | | |
| アンモニア態窒素 mg/L 0.02 <0.01 ~ 0.03 - / 6 燐酸態燐 mg/L 0.017 0.009 ~ 0.033 - / 6 TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 1.3 <0.5 ~ 3.8 - / 12 電気伝導度 μS/cm 横 メチレンブルー活性物質 mg/L 別のロフィルを mg/L オーレーアルー mg/L リソハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L アニリン mg/L | H | | | | | | | | | | | | | |
| 燐酸態燐 mg/L 0.017 0.009 ~ 0.033 - / 6 TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 1.3 <0.5 ~ 3.8 - / 12 電気伝導度 μS/cm | - 1 | | | 0.00 | /0.01 | | 0.00 | / 0 | | | | | | |
| TOC mg/L クロフフルル mg/L のロフスルル mg/m3 1.3 〈0.5 ~ 3.8 - / 12 電気伝導度 μ S/cm 第次レンブルー活性物質 mg/L がチレンブルー活性物質 原 度 ドリハロメタン生成能 mg/L 4ーtーオクチルフェノール mg/L アニリン mg/L | | | | | | | | | | | | | | |
| そのののののではできます。 クロロフィルα | - 1 | | | 0.017 | 0.009 | ~ | 0.033 | - / 6 | | | | | | |
| 電気伝導度 μ S/cm メチレンブルー活性物質 mg/L 調度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L アニリン mg/L | H | | | 1.0 | /0 F | | 2.0 | _ / 10 | | | | | | |
| 他 世歌伝等度 | m | | _ | 1.3 | <0.5 | ~ | 3.8 | - / 12 | | | | | | |
| 一個度 度 トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L アニリン mg/L | 他. | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 mg/L 4-t-オクチルフェノール mg/L アニリン mg/L | 74 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L アニリン mg/L | | | | | | | | | | | | | | |
| アニリン mg/L | - 1 | | _ | | | | | | | | | | | |
| | - 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 14. 4=27 PP 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | _ L | | _ | | | | | | | | | | | |
| | - 1 | | | | | | | | | | | | | |
| ふん便性大腸菌群数 個/100mL | | | | 毎上云よっこ・ | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |

| -1 | 《系名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | (202 | 24 年 | 度) |
|-----|---|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|-------------------------|---------|------|------|-----|
| | ・ボカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 広島県環境保 広島県環境保 | - 仝쾓 | | | | 広島県環境保 | 全 韗 | | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 35000008 (61 | | | | | 35000008 (61 | | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 燧灘北西部8 | 0 01 / | | | | 燧灘北西部8 | 0 01 / | | | | | _ |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | | | _ |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A ✓ | | | | | ※ A ✓ | | | | | | |
| _ | ・ | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | | | |
| _ | ・ | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域 | 名 | 燧灘北西部(~ | 1) | | | | 燧灘北西部(~ | () | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環 | | ※ 生物特A | | | | | ※ 生物特A | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に | 係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環 | 環境基準類型 | | | | | | | | | | | | |
| 部 | 查名 | | | 年間 | 調査ヿ | 下層 | | | 年間 | 調査 🛭 | 全層 | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | | m/n | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.2 | 0 | | 36 |
| | DO | mg/L | 8.0 | 6.4* | ~ | 9.6 | 3 / 12 | 8.1 | 6.3* | ~ | 10 | 9 | / | 36 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | 1.6 | 0.0 | ~ | 0.14 | 1 / 10 | 1.6 | 0.0 | ~ | 0.04 | 0 | / | 0.0 |
| | COD | mg/L | 1.6 | 0.8 | ~ | 2.1* | 1 / 12 | 1.6 | 0.8 | \sim | 2.3* | 3 | / | 36 |
| ήn | (75%値) SS | mg/L mg/L | (1.8*) | | | | | (1.8*) | | | | | | |
| 般項 | | mg/L CFU/100mL | | | | | 1 | 96* | <1 | ~ | 440* | 7 | / | 12 |
| 月 | | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | $\stackrel{\sim}{\sim}$ | <0.5 | 0 | / | 2 |
| | 全窒素 | mg/L | 0.14 | 0.06 | ~ | 0.21 | 0 / 12 | 0.14 | 0.06 | ~ | 0.21 | 0 | / | 24 |
| | 全燐 | mg/L | 0.14 | 0.00 | ~ | 0.036* | 5 / 12 | 0.14 | 0.00 | ~ | 0.21 | 8 | | 24 |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.021 | 0.011 | | 0.000- | 0 / 12 | 0.020 | 0.001 | ~ | 0.002 | 0 | / | 4 |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | ~ | <0.0006 | 0 | -/- | 4 |
| | LAS | mg/L | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | ~ | <0.0006 | 0 | / | 4 |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 8.0 | 6.4 | ~ | 10 | 0 / 12 | 8.0 | 6.4 | ~ | 10 | 0 | / | 12 |
| | カドミウム | mg/L | | | | - | , | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / | 1 |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / | 1 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | < 0.005 | < 0.005 | ~ | < 0.005 | 0 | / | 1 |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | < 0.01 | < 0.01 | ~ | < 0.01 | 0 | / | 1 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | < 0.005 | 0 | / | 1 |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / | 1 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / | 1 |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| D:B | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1 /// | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン チオベンカルブ | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| | セレン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | + | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | 1 | 0.03 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 | / | 6 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | Ť | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特 | AFI . | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 付殊 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 殊項! | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.03 | - | / | 6 |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | 1 | 0.017 | 0.009 | \sim | 0.033 | - | / | 6 |
| 478 | TOC | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その | | mg/m3 | | | | | | 1.3 | <0.5 | ~ | 3.8 | - | / | 12 |
| | | μ S/cm | | | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| 目 | | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | l | 1 | | | | | | | | 1 | | |

| _ | | | I no siles it and to | | | | | | I be site it and to | | | | (2024 年度) |
|----------|--|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------|-----|---|---|-----|-------|-------|-----------|
| | 系名 | | 燧灘北西部 床息県電路(F) | 1 / 499 | | | | | | 人曲 | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 35000011(61 | | | | | | 広島県環境保 35000011(61 | | | | |
| _ | 定地点名 | | | | | | | | 燧灘北西部1 | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | 1 | | | | | 燧灘北西部 | L | | | |
| | OD等に係るめてはめ木城名 OD等に係る環境基準類型 | | Aイ | | | | | | A イ | | | | |
| _ | :窒素·全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | | | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | 原至供此11.四日 | | | | | | Ⅲ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域 | Ż. | H *1 | | | | | | 11 *1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環 | | | | | | | | | | | | |
| | i查名 | 7001 / 79011 | | 年間調査 | 生 上層 | (表層) | | | | 年間 | 間調査 中 | 7層 | |
| Ë | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/ | 1 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | .,,,, | | | | | | .,,,, | |
| | pН | | | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.5 | 1.1 | ~ | 1.7 | 0 / | 4 | 1.3 | 1.0 | ~ | 1.5 | 0 / 4 |
| <u> </u> | (75%値) | mg/L | (1.6) | | | | | | (1.4) | | | | |
| 般 | SS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | | | | | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | | | | · | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 / | 1 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | < 0.1 | \sim | <0.1 | 0 / | 1 | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | < 0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 1 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | < 0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / | 1 | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | < 0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 1 | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / | 1 | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / | 1 | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| /esta. | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1 1 /// 0 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 源 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| É | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | - | | - | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 2015年2015年2015年2015年2015年2015年2015年2015年 | mg/L | 0.0= | /0.01 | | 0.00 | ^ ' | - | - | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.05 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 / | 2 | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | - | | - | | | | |
| 1 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | - | | - | | | | |
| 特 | 銅 (4.)なななない。 | mg/L | | | | | - | | - | | | | |
| 殊項目 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | - | | - | | | | |
| 目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | - | | | |
| Ë | 7 | mg/L | | | | | 1 | | 1 | - | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | 1 | | | | | | |
| | 有機能窒素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 燐酸態燐 | | | | | | | | | - | | | |
| | 解酸態解 TOC | mg/L mg/L | | | | | | | | - | | | |
| そ | | | | | | | | | | - | | | |
| 0 | 電 左上道 在 | mg/m3 | | | | | | | | 1 | | | |
| 他項 | 電気伝導度 メチレンブルー活性物質 | μ S/cm | | | | | 1 | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | - | | | |
| 日 | トリハロメタン生成能 | 度 mg/L | | | | | | | | - | | | |
| | トリハロメタン生成能 4-t-オクチルフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| Ī | アニリン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 間g/L 個/100mL | | | | | | | 1 | | | | |
| _ | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水均 | | <u> </u> | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 |

| _ | | | | | | | | | | | | | (202 | 4 年度) |
|----|--|--------------|---|------|-----|--------|-----|-------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------|-------|
| _ | 系名 | | <u> </u> | A am | | | | | <u>燧灘北西部</u> | A am | | | | |
| - | 定機関 | | 広島県環境保 35000011(61 | | | | | | 広島県環境保 | | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | | | | | | | 35000011(61 燧灘北西部11 | | | | | |
| _ | た地点石 OD等に係るあてはめ水域名 | | | | | | | | 燧難北西部 | | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | A 1 | | | | | | A 1 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | | 燧灘北西部 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | П / | | | | | | Πイ | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | 型 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | 型 | | | | | | | | | orana I . | | | |
| 部 | 查名 | 位 | 平均 | | | 調査下 | 最大 | / | 平均 | | 調査 🛭 | | | - / |
| _ | | 114. B/S | 十均 | 玮 | | ~ | 取八 | m/n | 十均 | 最小 | ~ | 最大 | 1 | n/n |
| | pH | ,, 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | (75%值) mg | | | | | | | | | | | | | |
| | | s/L | 1.5 | 1 | 1.1 | \sim | 1.7 | 0 / 4 | 1.4 | 1.0 | \sim | 1.7 | 0 | / 12 |
| - | | g/L | (1.6) | | | | | 1 | (1.5) | | | | | |
| 般項 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 月目 | 大腸菌数 CFU/ n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg | 100mL g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | 5/L 5/L | | | | | | | | | | | | |
| | | 5/L 5/L | | | | | | | | | | | | |
| | | s/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ;/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS mg | | | | | - | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 mg | | | | | | | | | | | | | |
| | | z/L | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 1 |
| | | g/L | | | | | | | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 | / 1 |
| | | g/L g/L | | | | | | | <0.005 <0.01 | <0.005 <0.01 | ~ | <0.005 <0.01 | 0 | / 1 |
| | | s/L s/L | | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 |
| | | 5/L 5/L | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 |
| | | ;/L | | | | | | | | (010000 | | (010000 | Ť | , . |
| | | g/L | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 1 |
| | ジクロロメタン mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ş/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 健 | | s/L s/L | | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1 1 / / / / 0 | ;/L ;/L | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | ;/L | | | | | | | | | | | | |
| н | | ;/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | セレン mg 硝酸性窒素 mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | 更明酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | | | |
| | 強制を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | , L (/L | | | | | | | 0.05 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 | / 2 |
| | | ;/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | - | | | | | | | | | - |
| 特 | | J/L | | | | | | | | | | | | |
| 殊項 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 月目 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| H | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | s/L s/L | | | | | | | | | | | | |
| | | s/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ;/L | | | | | | | | | | | | |
| | TOC mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| その | | /m3 | | | | - | | | | | | | | |
| の他 | | /cm | | | | | | | | | | | | |
| 項 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | £ ./r | | | | | | | | | | | | |
| | | ;/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| | ~ | s/L s/L | | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 個/1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | 世上 ポキファしゃ | - 1- | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | - T. D. | | 12/2 ### J1 - TT + PT | | | | | DA ## 11. == 4n | | | | (2024年 | 度) |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------|--------|--------|-------------------------|------|--------|------|--------|----|
| | :系名 定機関 | | 燧灘北西部 広島県環境保 | 企 細 | | | | 燧灘北西部 広島県環境係 | 2.企細 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 公局乐泉現休 35000018 (61 | | | | | 公局乐環境(A) 35000018(6) | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 燧灘北西部18 | | | | | 燧灘北西部1 | | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | , | | | | 燧灘北西部 | 0 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | ※ A イ | | | | | |
| | 金素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ II イ | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | - A I I | | | | | AK 11 | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | | | | | | | | | | | | |
| 訓 | 查名 | | | 年間調 | 査 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | 層 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | pН | | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.1 | 0 / | 12 |
| | DO | mg/L | 8.0 | 6.0* | ~ | 9.8 | 5 / 12 | 7.9 | 6.2* | \sim | 9.6 | 6 / | 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.5 | 1.2 | \sim | 2.2* | 1 / 12 | 1.5 | 1.1 | \sim | 2.2* | 1 / | 12 |
| <u> </u> - | (75%値) | mg/L | (1.6*) | | | | | (1.5*) | 1 | | | 1 | |
| 般 | SS | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| 項目 | 7 CHW EED 30C | CFU/100mL | 1 | <1 | ~ | 3 | 0 / 12 | | 1 | | | 1 | |
| | 11-・ペイリン 抽山初貝_加刀寺 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 | | | | | 1 | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.12 | <0.05 | ~ | 0.21 | 0 / 12 | | | | | 1 | |
| | 全燐 | mg/L | 0.022 | 0.015 | \sim | 0.035* | 2 / 12 | | | | | 1 | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| | LAS 克尼茨士勒主見 | mg/L | | | | | | | 1 | | | + | |
| - | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | - | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.03 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 / 6 | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| П | 714 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | / | , - | | | | | 1 | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 | | 1 | | | | |
| | 燐酸態燐 TOC | mg/L | 0.014 | 0.009 | ~ | 0.025 | - / 6 | | 1 | | | + | |
| そ | TOC | mg/L | 1 7 | /0 F | | 6.0 | _ / 10 | | 1 | | | + | |
| の | 季 怎么道度 | mg/m3 | 1.7 | <0.5 | ~ | 6.0 | - / 12 | | 1 | | | + | |
| 他項 | | μ S/cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | 選度 温度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | + | |
| 目 | トリハロメタン生成能 | 度 mg/L | | | | | | | | | | + | |
| | トリハロメタン生成能 4-t-オクチルフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | 1 | | | + | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | + | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | + | |
| <u> </u> | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域 | | ## he we he we 1 .h. | <u> </u> | | | | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|-----|--|-----------|------------------|------|--------------|------|--------|-------------------------|-------|--------|---------------|-----------|
| | 系名 | | 燧灘北西部 | A →m | | | | 燧灘北西部 中島 県 770 (京/1) | A ≃m | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 35000018 (610 | | | | | 35000018 (61 | | | | |
| | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部18 総灘北亜部 | • | | | | 燧灘北西部18 | 5 | | | |
| | DD等に係るめてはの水域名 DD等に係る環境基準類型 | | | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| _ | SD专に体の環境差距類空 窒素・全燐に係る水域名 | | ※ A イ 燧灘北西部 | | | | | ※ A イ 燧灘北西部 | | | | |
| | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | | | | | | | | | | |
| _ | | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 淮稻刑 | | | | | | | | | | |
| _ | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る。 | | | | | | | | | | | |
| | ± 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| | E 土物の土心・廿土座りる物の適心はに赤る朱児室 査名 | 中規王 | | 在10 | 問査 下 | 一 | | | 午 問 | 調査 슄 | > 屋 | |
| Д/П | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 |)响 <u></u> 1 | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | → ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | 1~0 | 取力、 | | 以八 | 111/11 | 1~0 | 对(7) | | 収八 | 111/11 |
| | pH | mo, o | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.1 | 0 / 36 |
| | DO | mg/L | 7.8 | 6.3* | ~ | 9.7 | 6 / 12 | 7.9 | 6.0* | ~ | 9.8 | 17 / 36 |
| | BOD | mg/L | 1.0 | 0.0 | | 5.1 | 0 / 12 | 110 | 0.0 | | 3.0 | 11 / 00 |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.5 | 1.0 | ~ | 2.2* | 1 / 12 | 1.5 | 1.0 | ~ | 2.2* | 3 / 36 |
| | (75%値) | mg/L | (1.5*) | 1.0 | | J.U. | - / 12 | (1.6*) | 1.0 | | 2.2" | 5 , 50 |
| 一般 | SS | mg/L | (2.5.) | | | | | (0.) | | | | |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | 1 | <1 | ~ | 3 | 0 / 12 |
| É | n-ヘキサン抽出物質」油分等 | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | 0.12 | <0.05 | ~ | 0.21 | 0 / 12 |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | 0.022 | 0.015 | ~ | 0.035* | 2 / 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | 3.310 | | | _ , 12 |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 7.8 | 6.3 | ~ | 9.8 | 0 / 12 | 7.8 | 6.3 | ~ | 9.8 | 0 / 12 |
| | カドミウム | mg/L | | | | | , | | | | | , |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.03 | <0.01 | \sim | 0.08 | 0 / 6 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | 0.014 | 0.009 | ~ | 0.025 | - / 6 |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | | 1.7 | <0.5 | \sim | 6.0 | - / 12 |
| 他 | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | 1 | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |

| | | - | to site it and to | | | | | I be after it and the | | | | (2024 年度) |
|-----|--|----------------|------------------------|--------|-------|------|--------|-----------------------|--------|-------|-----|-----------|
| | :系名 空機 | | 燧灘北西部 広島 思想 第79 | 人细 | | | | 燧灘北西部 | 1 A #H | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 35000021(61 | | | | | 広島県環境係 35000021(6: | | | | |
| | 定地点金亏 定地点名 | | 35000021 (61 燧灘北西部2 | | | | | 35000021(6. 燧灘北西部2 | | | | |
| _ | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| | OD等に係るあてはめ水域名 OD等に係る環境基準類型 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧 <u>攤</u> 北西部 | | | | |
| | OD寺に赤の泉児左埠須空 :窒素・全燐に係る水域名 | | A イ 燧灘北西部 | | | | | A イ 燧灘北西部 | | | | |
| | .至系・主殊に伝る小坂名 :窒素・全燐に係る環境基準類型 | | | | | | | | | | | |
| _ | | A7 | II イ | | | | | II イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環 生生物の生息・再生産する場の適応性に | | | | | | | | | | | |
| | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環 | | | | | | | | | | | |
| | 三生物の主心・丹王座する物の画心性に床る9 | 《兒巫 平规王 | | 在問調 | 査 上層(| (孝屋) | | | 在即 | 間調査 中 | 層 | |
| ци | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | 1-0 | JX/1、 | | 収八 | 111/11 | 120 | 叔/丁 | | 収八 | 111/11 |
| | pH | mo, o | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/L | | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.5 | 1.4 | ~ | 1.7 | 0 / 4 | 1.6 | 1.4 | ~ | 1.7 | 0 / 4 |
| | (75%値) | mg/L | (1.5) | 1.1 | | 1 | 0 / 1 | (1.6) | 1.1 | | 1 | 0 , 1 |
| 一般 | | mg/L | \/ | | | | | (2.2) | | | | |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.05 | < 0.01 | ~ | 0.09 | 0 / 2 | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ħ | クロム | mg/L | | | | | | | | | - | |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | |
| その | | mg/m3 | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| ì | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |

| | | | | | - 1 | | | | | | | (2024 年度) |
|--------|--------------------------|----------------|---|------|--------|-----|-------|-----------------------|-------|--------|--|-----------|
| | 系名 | | <u> </u> | A am | | | | 燧灘北西部 | A Am | | | |
| - | 定機関 | | 広島県環境保 35000021(610 | | | | | 広島県環境保 35000021(61 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | | | | | | | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部21 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部2 燧灘北西部 | 1 | | | |
| | DD等に保る環境基準類型 | | 経無礼四司 A イ | | | | | 経無礼四司 A イ | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 後 | | | | |
| _ | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅲ イ | | | | | 歴 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 11 -1 | | | | | H *1 | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | 查名 | ,, | | 年間 | 間調査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 全 | ······································ | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 r | n3/S | | | | | | | | | | |
| | рН | | | | | | | | | | | |
| | DO r | ng/L | | | | | | | | | | |
| | BOD | ng/L | | | | | | | | | | |
| | (75%值) r | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.6 | 1.4 | \sim | 1.6 | 0 / 4 | 1.6 | 1.4 | \sim | 1.7 | 0 / 12 |
| - | | ng/L | (1.6) | | | | | (1.6) | | | | |
| 般 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 7 1/100 pm /91 | U/100mL | | | | | | | | | | |
| | - | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | - | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | - | ng/L | | | | | | | | | | |
| | - | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | PCB r | ng/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン r | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| /estu- | シス-1,2-ジクロロエチレン r | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| É | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| ĺ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| ĺ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | 0.05 | <0.01 | ~ | 0.09 | 0 / 2 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| ĺ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン r | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 r | ng/L | | | | | | | | | - | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 r | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ħ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| そ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| の | | ıg/m3 ≀S/cm | | | | | | | | | | |
| 他 | | ng/L | | | | | | - | | | | |
| 項目 | 濁度 『 | ng/L 度 | | | | | | | | | | |
| Ħ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| ĺ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | /100mL | | | | | | | | | | |
| ш | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | 出去でもステした。 | テナ | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| | | A 77 /1 | 1 水 및 7 | N A | 181 / | | 111 20 | | | | (2024 年度) |
|---------------|---|---|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|----------|-------|------|-----------|
| | 系名 | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| _ | 定機関 | 広島県環境 35000025 | | | | | 広島県環境(6 35000025(6 | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | 多数 。 多数 多 多 多 多 多 多 多 多 | | | | | 35000025 (6 燧灘北西部2 | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | 燧灘北西部 | | | | | 熔攤北西部 | .0 | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | ※ A ✓ | -14 | | | | ※ A イ | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | 燧灘北西部 | 部 | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| 全 | ・窒素・全燐に係る環境基準類型 | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 査名 | 믿 | 年間 調 | 直 上層 | (表層) | | | 年間 | 引調査 中 | 1届 | |
| Д/н | 測定項目 単 | 7. 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 m3, | | - 12.4 | | -127 | | | 1,2,7 | | 7,00 | |
| | рН | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 |
| | DO mg. | | 6.4* | \sim | 10 | 6 / 12 | 7.7 | 6.1* | ~ | 9.7 | 6 / 12 |
| | BOD mg, | | | | | | | | | | |
| | (75%值) mg, | _ | 1.0 | | 0.14 | 1 / 10 | 1.6 | 1.0 | | 0.64 | 1 / 10 |
| 1 | COD mg, (75%值) mg, | | 1.3 | ~ | 2.1* | 1 / 12 | 1.6 (1.6*) | 1.2 | ~ | 2.6* | 1 / 12 |
| 般 | , ,,,, | | | | | | (1.04) | | | | |
| 項 | | | <1 | ~ | 2 | 0 / 12 | | | | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg | L <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 | | <u> </u> | | | |
| 1 | 全窒素 mg. | | <0.05 | ~ | 0.19 | 0 / 12 | | | | | |
| 1 | 全燐 mg, | | 0.015 | ~ | 0.037* | 2 / 12 | | | | | 1 |
| 1 | 全亜鉛 mg | | | | | | | | | | |
| 1 | /=ルフェ/ール mg. LAS mg. | | | | | 1 | | | | | + |
| 1 | LAS mg. 底層溶存酸素量 mg. | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | カドミウム mg, | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg, | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg, | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg. | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg, | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 mg, PCB mg, | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg. | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg, | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg, | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg, | L | | | | | | | | | |
| <i>t</i> :==- | シス-1,2-ジクロロエチレン mg, | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1-トリクロロエタン mg. 1,1,2-トリクロロエタン mg. | | | | | | | | | | |
| 項 | | | | | | | | | | | |
| 目 | テトラクロロエチレン mg. | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg/ | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg, | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg, | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ mg, | | | | | | | | | | |
| 1 | ベンゼン mg | | | | | 1 | | | | | + |
| 1 | セレン mg. 硝酸性窒素 mg. | | | | | | | | | | |
| 1 | 更硝酸性窒素 mg. | | | | | 1 | | | | | + |
| 1 | 研験性窒素及び亜硝酸性窒素 mg. | | <0.01 | ~ | 0.09 | 0 / 6 | | | | | |
| 1 | ふっ素 mg, | L | | | | | | | | | |
| 1 | ほう素 mg. | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン mg, | L | | | | 1 | | | | | 1 |
| 特 | 銅 mg. | | | | | | | | | | - |
| 殊項 | 鉄_溶解性 mg, マンガン_溶解性 mg, | | | | | | | 1 | | | |
| 目 | クロム mg. | | | | | | | 1 | | | |
| | 塩素イオン mg, | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 mg | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 mg, | | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 | | | | | |
| | 燐酸態燐 mg. | _ | 0.006 | ~ | 0.026 | - / 6 | | | | | |
| そ | TOC mg. | | /0 F | | 4.0 | - / 12 | | | | | |
| の | | | <0.5 | ~ | 4.0 | - / 12 | | | | | + |
| 他項 | 电 X は 等 及メチレンブルー活性物質mg, | | | | | | | 1 | | | |
| 月日 | 濁度 | | | | | | | | | | |
| [| トリハロメタン生成能 mg. | | | | | | | | | | |
| 1 | 4-t-オクチルフェノール mg, | L | | | - | | | | | - | |
| 1 | アニリン mg, | | | | | | | | | | 1 |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg/ | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | ふん便性大腸菌群数 個/10 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | | | | | L | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----|--|-----------------|------------------------|-------------|-------|------|------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------|
| | 系名 字機 問 | | 燧灘北西部 亡息 周 四 倍 / 2 | △ ## | | | | 燧灘北西部 広島県標6/8 | △ ## | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 35000025(610 | | | | | 広島県環境保 35000025(61 | | | | |
| _ | _{足地点备亏} 定地点名 | | 35000025(61) 燧灘北西部25 | | | | | 35000025 (61 燧灘北西部25 | | | | |
| | た地点句 OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | ' | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | ※ A ✓ | | | | | ※ A ✓ | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | | 問酒査 下 | | | | | 調査 组 | | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 r pH | n3/S | 8.1 | 8.0 | ~ | 0.0 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 0.0 | 0 / 36 |
| | | ng/L | 7.8 | 6.2* | ~ | 8.2 | 0 / 12 6 / 12 | 7.8 | 6.1* | ~ | 8.2 | 18 / 36 |
| | | ng/L | 1.0 | 0.2" | | 10 | 0 / 12 | 1.0 | 0.1** | | 10 | 10 / 30 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.5 | 1.2 | ~ | 2.3* | 1 / 12 | 1.5 | 1.2 | ~ | 2.6* | 3 / 36 |
| _ | | ng/L | (1.7*) | | | | | (1.6*) | | | | |
| 般 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項日 | 7 1/30 El 291 | U/100mL | | | | | | 1 | <1 | ~ | 2 | 0 / 12 |
| 目 | | ng/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 |
| | | ng/L | | | | | | 0.11 | <0.05 | \sim | 0.19 | 0 / 12 |
| 1 | | ng/L | | | | | | 0.023 | 0.015 | ~ | 0.037* | 2 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | 7.8 | 6.1 | ~ | 9.9 | 0 / 12 | 7.8 | 6.1 | ~ | 9.9 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | 0.1 | | 0.0 | 0 / 12 | | 0.1 | | 0.0 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン r | ng/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | 0.03 | <0.01 | ~ | 0.09 | 0 / 6 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | ほう素 n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン n | ng/L | | | - | | | | | | - | |
| 特 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ë | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 |
| | | ng/L | | | | | | 0.013 | 0.006 | ~ | 0.026 | - / 6 |
| 1 | TOC | ng/L | | | | | | | | | | |
| その | | ıg/m3 | | | | | | 1.4 | <0.5 | ~ | 4.0 | - / 12 |
| の他 | | ı S/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L /100mL | | | | | | | | | | |
| Щ | あん関性人勝風群級 | | <u> </u> | _ , | | | 1 | I | 1 | | | 1 |

| _ | | | I be sile it and to | | | | | I be siles it and to | | | | (2024 年度) |
|----------|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------|-------|-------|--|--------|--------|--------|-----------|
| | :系名 | | | 人細 | | | | 炫難北西部 広島県環境(5) | 1 / 48 | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 35000037(6) | | | | | 広島県環境係 35000037(6) | | | | |
| _ | 定地点名 | | | | | | | | | | | |
| _ | DE型ぶ石 OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | 1 | | | | 燧灘北西部 | 1 | | | |
| | OD等に係るめてはめ小城石 OD等に係る環境基準類型 | | Aイ | | | | | A イ | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 後 | | | | | 修 上 本 本 本 本 一 に 、 に に に に に に に に に に に に に | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | 歴 | | | | | Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 11 -1 | | | | | 11 1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に保 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年間調 | 査 上層 | (表層) | | | 年間 | 調査 中 | '層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | .,,,, | | | | | .,,,,, | |
| | pН | | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/L | | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.7 | 1.6 | ~ | 2.1* | 1 / 4 | 1.7 | 1.6 | \sim | 1.8 | 0 / 4 |
| _ | (75%値) | mg/L | (1.6*) | | | | | (1.8) | | | | |
| 般 | SS | mg/L | | | | - | | | | | - | |
| 項目 | 大腸菌数 | CFU/100mL | | | | | | | | | | |
| Ħ | 11-・ペイリン抽山初貝_佃刀寺 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 全燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| - | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | + |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Н | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ì | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.03 | <0.01 | \sim | 0.08 | 0 / 6 | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| <u> </u> | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項目 | 鉄_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月日 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ľ | / 12 | mg/L | - | | | | | | | | | 1 |
| | 塩素イオン | mg/L | - | | | | | - | | | | 1 |
| | 有機能窒素 | mg/L | 0.01 | /0.01 | | 0.03 | - / 6 | | | | | |
| | アンモニア態窒素 燐酸態燐 | mg/L | 0.01 0.017 | <0.01 0.004 | ~ | | - / 6 | | | | | |
| | ME NEW TOC | mg/L mg/L | 0.017 | 0.004 | -~ | 0.026 | - / 0 | | | | | |
| そ | | mg/L mg/m3 | 1.8 | 0.9 | ~ | 3.3 | - / 6 | | | | | |
| 0 | 電 尼/- 道 在 | μ S/cm | | 0.9 | | ٥.٥ | / 0 | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | μ S/CIII mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | |
| H | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | + |
| Ì | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| Ì | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域 | | # F | <u> </u> | | | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | DV VHW II | | | | | DV MW II. metalan | | | | (202 | 4 年度 |
|----------|----------------------|--------------|------------------------|-------------|--------|-----|-------|-------------------------|--------|--------|-------|------|------|
| | 《系名 引定機関 | | 燧灘北西部 広島県環境保 | △ #⊞ | | | | 燧灘北西部 広島県環境保 | 1 A #H | | | | |
| | 定機 定地点番号 | | 公局乐泉現休 35000037 (61 | | | | | 公局乐環境(A 35000037 (6) | | | | | |
| _ | 定地点名 | | | | | | | 燧灘北西部3 | | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | <u> </u> | | | | 燧灘北西部 | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A 1 | | | | | A 1 | | | | | |
| | 金素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | II 1 | | | | | II 1 | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域 | 名 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | | |
| 挪 | 直 名 | | | 年間 | 問酒査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 全 | :層 | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | n | n/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/L | 9.4 | 9.4 | ~ | 9.4 | 0 / 1 | 9.4 | 9.4 | \sim | 9.4 | 0 | / 1 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.7 | 1.5 | \sim | 2.0 | 0 / 4 | 1.7 | 1.5 | \sim | 2.1* | 1 | / 12 |
| <u> </u> | (75%値) | mg/L | (1.7) | | | | | (1.8*) | | | | 1 | |
| 般 | SS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 7 V/100 pm 300 | CFU/100mL | | | | | | | | | | | |
| П | 11~~イリン抽山物員_佃刀寺 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | 0 / - | | | | | _ | / - |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 7.7 | 6.0 | ~ | 9.4 | 0 / 6 | 7.7 | 6.0 | ~ | 9.4 | 0 | / 6 |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | - | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | - | | | | | | |
| | PCB ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康 | 110 11/4 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | 0.03 | <0.01 | ~ | 0.08 | 0 | / 6 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | AFF | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 殊 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| : 殊項目 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | 0.01 | <0.01 | \sim | 0.03 | - | / 6 |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | 0.017 | 0.004 | ~ | 0.026 | - | / 6 |
| | TOC | mg/L | | | | | | | | | | | |
| その | | mg/m3 | | | | | | 1.8 | 0.9 | ~ | 3.3 | - | / 6 |
| の他 | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | | |

| | | | A 77 /11 / | | | <i>04 /</i> 2 1 | - /1 | - 1.0 | | | | | (2024 年度) |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------|---------|--------|-----------------|------|-------|-----------------|--------|--------|------|-----------|
| _ | 系名 | | 燧灘北西部 | A am | | | | | 燧灘北西部 | 1 A 4m | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | | 広島県環境保 | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 35000040 (610 | | | | | | 35000040 (6: | | | | |
| | 圧地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部40 燧灘北西部 |) | | | | | 燧灘北西部4 燧灘北西部 | U | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A 1 | | | | | | A 1 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II 1 | | | | | | II 1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 11 1 | | | | | | 1 1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 連類型 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るか | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間調査 | 上層 | (表層) | | | | 年間 | 間調査 中 | 層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | r | n/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.0 | 1.0 | | 0.14 | | / 4 | 1.0 | 1.7 | | 0.04 | 1 / 4 |
| | | mg/L | 1.8 (1.8*) | 1.6 | \sim | 2.1* | 1 | / 4 | 1.9 | 1.7 | ~ | 2.2* | 1 / 4 |
| — jint | | mg/L mg/L | (1.0*) | | | | | | (1.9*) | | | | - |
| 般項 | | IIIg/L CFU/100mL | | | | | | | + | | | | + |
| 目 | | mg/L | | | | | | | + | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | + | | | | 1 |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| | 1111 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 | / 1 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 | / 1 | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 1 | | | | | |
| | | mg/L | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 | / 1 | | | | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 1 | | | | | |
| | | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | + | 1 | | | + |
| 健 | | mg/L mg/L | | | | | | | + | 1 | | | 1 |
| 康 | | mg/L | | | | | | | + | | | | |
| 項日 | 2 2 1 1 1 1 | mg/L | | | | | | | + | | | | 1 |
| Ħ | | mg/L | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | 1 |
| | | mg/L | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.07 | 0 | / 6 | 1 | | | | 1 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | - | | | | 1 |
| \vdash | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 特 | | mg/L | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 殊項 | | mg/L mg/L | | | | | | | + | | | | - |
| 目 | | mg/L mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| H | | mg/L | | | | | | | + | | | | + |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| | | mg/L | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.02 | - | / 6 | | | | | |
| | | mg/L | 0.016 | 0.005 | ~ | 0.023 | - | / 6 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| そ | クロロフィルa I | ng/m3 | 2.3 | 1.0 | ~ | 3.6 | - | / 6 | 1 | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | 1 |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| | | 圆/100mL | m to a second | _ , | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | (其智) | 世 占 であストレか | 示す | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | (20 | 24 年 | . 度) |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------|--------|-----|-------|-------------------------|---------|--------|---------|-----|------|------|
| | 系名 | | <u>燧灘北西部</u> | A am | | | | 燧灘北西部 | A am | | | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 35000040(610 | | | | | 広島県環境保 35000040(61 | | | | | | |
| _ | 定地点备号 定地点名 | | 35000040 (610 燧灘北西部40 | | | | | 35000040 (61 燧灘北西部40 | | | | | | |
| | ^{圧地点名} OD等に係るあてはめ水域名 | | 逐無北西部40 燧灘北西部 | , | | | | 燧灘北西部 |) | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | Aイ | | | | | A 1 | | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II 1 | | | | | II 1 | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | н , | | | | | | | | | | | _ |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 連類型 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るか | | | | | | | | | | | | | |
| 水 生 | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 準類型 | | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間 | 問酒査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 🛭 | 2層 | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | | m/n | |
| | | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | рН | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.0 | | | | | 1.0 | | | | | , | |
| | | mg/L | 1.8 | 1.7 | \sim | 1.8 | 0 / 4 | 1.8 | 1.6 | \sim | 2.2* | 2 | / | 12 |
| | | mg/L | (1.8) | | | | | (1.8*) | | | | - | | |
| 般項 | | mg/L CFU/100mL | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | mg/L | 7.7 | 5.8 | ~ | 9.9 | 0 / 6 | 7.7 | 5.8 | ~ | 9.9 | 0 | / | 6 |
| | | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / | 1 |
| | | mg/L | | | | | | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / | 1 |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / | 1 |
| | | mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | \sim | < 0.01 | 0 | / | 1 |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / | 1 |
| | | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / | 1 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 1 | | | | | | |
| 健 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 康 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 項日 | 7 7 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| Ħ | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 1 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | |
| | | mg/L | | _ | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 0.02 | <0.01 | \sim | 0.07 | 0 | / | 6 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| - | | mg/L | | | | | | 1 | | | | - | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | - | | |
| 殊項 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | |
| H | | mg/L | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 0.01 | <0.01 | ~ | 0.02 | - | / | 6 |
| | | mg/L | | | | | | 0.016 | 0.005 | ~ | 0.023 | - | / | 6 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| そ | | ng/m3 | | | | | | 2.3 | 1.0 | ~ | 3.6 | - | / | 6 |
| の他 | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | _ |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | | _ | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | - | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| l | | mg/L | | | | | | | | | | _ | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 圆/100mL | | | | | | ĺ | | | | 1 | | |

| | | | A A /// | | | | | | | | | (2024 年度) |
|---------|---------------------------------|-------------------|---|-----------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|--------|------|-----------|
| | 系名 | | <u> </u> | A am | | | | 燧灘北西部 | 3 A 4m | | | |
| - | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県環境係 35000058(6) | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 35000058 (61 | | | | | , | | | | |
| _ | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部58 燧灘北西部 |) | | | | 燧灘北西部5 燧灘北西部 | 0 | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | ※ A イ | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | | | | | | 燧 攤北西部 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 燧灘北西部(~ | <u>()</u> | | | | 燧灘北西部(| イ) | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 準類型 | ※ 生物特A | | | | | ※ 生物特A | | | | |
| - | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るな | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間調査 | 坒 上層 | (表層) | | | 年間 | 間調査 中 | □層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 |
| | DO | mg/L | 7.8 | 6.2* | ~ | 9.7 | 6 / 12 | 7.8 | 6.2* | ~ | 9.5 | 5 / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | 1.0 | 1.0 | | 0.0. | 1 / 10 | 1.0 | 1.0 | | 0.0. | 1 / 10 |
| | (75% (#) | mg/L | 1.6 | 1.3 | \sim | 2.3* | 1 / 12 | 1.6 | 1.3 | \sim | 2.6* | 1 / 12 |
| — án | (75%値) SS | mg/L | (1.7*) | | | | | (1.7*) | - | | | |
| 般項 | 大腸菌数 | mg/L CFU/100mL | 1 | <1 | ~ | 2 | 0 / 12 | - | | | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質。油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | 1 | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.11 | <0.05 | ~ | 0.19 | 0 / 2 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.023 | 0.016 | ~ | 0.033* | 2 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.001 | <0.001 | ~ | 0.001 | 0 / 4 | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | <0.00006 | <0.0006 | ~ | <0.0006 | 0 / 4 | | 1 | | | |
| | LAS | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | ~ | <0.0006 | 0 / 4 | | 1 | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| Ħ | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| ĺ | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.04 | <0.01 | ~ | 0.10 | 0 / 7 | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 Pote Art III | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄、溶解性 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| 月日 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | | | | | | - | 1 | | | |
| Ë | 塩素イオン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン 有機態窒素 | mg/L mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 有機態至素 アンモニア態窒素 | mg/L mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 | | 1 | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | 0.014 | 0.006 | ~ | 0.025 | - / 6 | | + | | | |
| | が中日な 形示 が中 TOC | mg/L | 3.017 | 0.000 | - | 0.020 | , 0 | | 1 | | | |
| そ | クロロフィルa | mg/m3 | 1.5 | <0.5 | ~ | 5.6 | - / 12 | | | | | |
| の | 電気伝導度 | μ S/cm | 210 | | | | , | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月日 | 濁度 | 度 | | | | | | | 1 | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | 1 | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | 1 | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | 告倍其治 | 隹占でなるこした | | | | | | | | | |

| | | | L | | | | | 10 40 | | | | (2024年 | 度) |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----|------|--------|------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|----|
| | 系名 岩地田 | | 燧灘北西部 広島県 環境(2) | ∧ ±m | | | | 燧灘北西部 床自児母培(2) | A = m | | | | |
| - | 定機関 | | 広島県環境保 35000058 (610 | | | | | 広島県環境保 35000058(61 | | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 35000058 (610 燧灘北西部58 | | | | | 35000058(61 燧灘北西部58 | | | | | |
| | ^{圧地点名} DD等に係るあてはめ水域名 | | 逐無北四部3c 燧灘北西部 |) | | | | 燧灘北西部 | 5 | | | | |
| _ | DD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 燧灘北西部(イ | ') | | | | 燧灘北西部(- | 1) | | | | |
| 水生 | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | ※ 生物特A | | | | | ※ 生物特A | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るか | | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 準類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | V/ // | 77.16 | | 調査下 | | , | | 1 | 調査 🛭 | | , | |
| <u> </u> | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | |
| | 流量 pH | m3/S | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / : | 36 |
| | | mg/L | 7.8 | 6.2* | ~ | 9.9 | 5 / 12 | 7.8 | 6.2* | ~ | 9.9 | | 36 |
| | | mg/L | 1.0 | 0.21 | | 5.5 | 0 / 12 | 1.0 | 0.24 | | 5.5 | 10 / . | 00 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 1.6 | 1.3 | ~ | 2.7* | 1 / 12 | 1.6 | 1.3 | \sim | 2.7* | 3 / 3 | 36 |
| _ | (75%値) | mg/L | (1.6*) | | | | | (1.7*) | | | | | |
| 般 | | mg/L | | | | - | | | | | - | | |
| 項目 | 2 4.200 pm 294 | CFU/100mL | | | | | | 1 | <1 | \sim | 2 | | 12 |
| П | | mg/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | , | 2 |
| | | mg/L | | | | | | 0.11 | <0.05 | \sim | 0.19 | | 12 |
| | | mg/L | | | | | | 0.023 | 0.016 | ~ | 0.033* | | 12 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 0.001 <0.00006 | <0.001 <0.00006 | ~ | 0.001 <0.00006 | | 4 |
| | <u> </u> | mg/L | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | \sim | <0.0006 | | 4 |
| | <u> </u> | mg/L | 7.8 | 6.2 | ~ | 9.9 | 0 / 12 | 7.8 | 6.2 | ~ | 9.9 | | 12 |
| | | mg/L | 1.0 | 0.2 | | 5.5 | 0 / 12 | 1.0 | 0.2 | | 5.5 | 0 / . | 14 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 月目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | 1 | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 0.04 | <0.01 | ~ | 0.10 | 0 / | 7 |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 殊 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Н | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | - | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | _ / | 6 |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 0.014 | 0.006 | \sim | 0.025 | | 6 |
| | | mg/L | | | | | | 0.011 | 0.000 | - | 0.020 | | J |
| そ | | mg/m3 | | | | | | 1.5 | <0.5 | ~ | 5.6 | - / | 12 |
| の | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | , . | |
| 他項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | 圆/100mL | # L - 1 : | → 1. | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 11年11年1 | 年上 ポセファした | = | | _ | _ | _ | | | - | _ | _ |

| | | A A 1 | 水吸力 | N A | 1X1 AL / | | 111 20 | | | | (2024 年度) |
|---------------|---|-------------------|-------------|------|----------|--------|-----------------------|----------|--------|------|-----------|
| | 系名 | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| _ | 定機関 | 広島県環境 35000059 | | | | | 広島県環境(6 35000059(6 | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | 多 | , | | | | 35000059(6 燧灘北西部5 | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | 燧灘北西 部 | | | | | 燧灘北西部 | 3 | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | ※ A ✓ | Ila | | | | ※ A イ | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | 燧灘北西部 | FIS . | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| 全 | ・窒素・全燐に係る環境基準類型 | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 査名 | 믿 | 左 間調 | 査 上層 | (表層) | | | 年間 | 引調査 中 | 1届 | |
| ц/н | 測定項目 単 | 7. 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 m3, | | | | 7,07 | , | | 1,2,7 | | 7,00 | |
| | рН | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 |
| | DO mg. | | 6.3* | ~ | 9.9 | 3 / 12 | 8.0 | 6.3* | ~ | 10 | 3 / 12 |
| | BOD mg, | | | | | | | | | | |
| | (75%值) mg, | _ | 1.0 | | 0.14 | 1 / 10 | 1.7 | 1.0 | | 0.74 | 1 / 10 |
| | COD mg, (75%值) mg, | | 1.3 | ~ | 2.1* | 1 / 12 | 1.7 (1.9*) | 1.3 | ~ | 2.7* | 1 / 12 |
| 般 | , ,,,, | | | | | | (1.3♠) | | | | |
| 項 | | | <1 | ~ | 2 | 0 / 12 | | | | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg | L <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 2 | | <u> </u> | | | |
| 1 | 全窒素 mg. | | <0.05 | ~ | 0.20 | 0 / 12 | | | | | |
| 1 | 全燐 mg. | | 0.016 | ~ | 0.038* | 2 / 12 | | | | | |
| 1 | 全亜鉛 mg. ノニルフェノール mg. | | | | | | | | | | |
| 1 | ノニルフェノール mg. LAS mg. | | | | | | | | | | |
| 1 | 底層溶存酸素量 mg. | | | | | | | 1 | | | |
| | カドミウム mg, | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg, | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg, | L | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg. | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg, | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg, アルキル水銀 mg, | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 mg, PCB mg, | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg. | 1 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg, | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg, | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg, | L | | | | | | | | | |
| <i>t</i> :==- | シス-1,2-ジクロロエチレン mg, | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,1-トリクロロエタン mg. 1,1,2-トリクロロエタン mg. | | | | | | | | | | |
| 項 | | | | | | | | | | | |
| 目 | テトラクロロエチレン mg. | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg/ | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg, | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg, | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ mg, | | | | | | | | | | |
| 1 | ベンゼン mg, セレン mg, | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン mg, 硝酸性窒素 mg, | | | | | | | | | | - |
| 1 | 亜硝酸性窒素 mg, | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg, | | <0.01 | ~ | 0.09 | 0 / 6 | | | | | |
| 1 | ふっ素 mg, | L | | | | | | | | | |
| 1 | ほう素 mg. | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン mg, | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 mg, | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 mg, マンガン_溶解性 mg, | | | | | | | 1 | | | |
| 目 | クロム mg. | | | | | | | 1 | | | |
| | 塩素イオン mg, | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 mg, | L | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 mg, | | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 | | | - | | |
| | 燐酸態燐 mg, | _ | 0.006 | ~ | 0.026 | - / 6 | | | | | 1 |
| そ | TOC mg. | | 0.7 | | A 1 | - / 12 | | | | | |
| の | | | 0.7 | ~ | 4.1 | - / 12 | | | | | |
| 他項 | 电 X は 等 及メチレンブルー活性物質mg, | | | | | | | 1 | | | |
| 月日 | 濁度 | | | | | | | | | | |
| [| トリハロメタン生成能 mg. | | | | | | | | | | |
| 1 | 4-t-オクチルフェノール mg, | L | | | - | | | | | - | |
| 1 | アニリン mg, | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg/ | | | | | | | | | | 1 |
| | ふん便性大腸菌群数 個/10 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | | | | 1 | L | | | | |

| | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|--------|---|--------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| | 系名 字機問 | | 燧灘北西部 亡息 周 四 倍 / 2 | △ #⊞ | | | | 燧灘北西部 広島県標6/8 | △ ## | | | |
| - | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 35000059(610 | | | | | 広島県環境保 35000059(61 | | | | |
| _ | 定地点名 | | | | | | | 燧灘北西部59 | | | | |
| | DD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | , | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A イ | | | | | ※ A ✓ | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水地 | | | | | | | | | | | |
| | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 本・名 | 類型 | | FB | 1部十二 | * E7 | | | 左眼 | 明士 / | \ ₩ | |
| 司间 | <u> </u> | 単位 | 平均 | 最小 | 問査 T | · / / / / / / / / / / / · / / / · / | m/n | 平均 | 最小 |]調査 á ~ | E.唐 最大 | m/n |
| | | 中心 n3/S | 干粉 | 取小 | | 取八 | 111/11 | +≈ | 取小 | | 取八 | 111/11 |
| | pH | 10, 0 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 36 |
| | | ng/L | 7.8 | 6.2* | ~ | 10 | 4 / 12 | 7.9 | 6.2* | ~ | 10 | 10 / 36 |
| | BOD n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.7 | 1.2 | \sim | 2.6* | 1 / 12 | 1.7 | 1.2 | \sim | 2.7* | 3 / 36 |
| - | | ng/L | (1.8*) | | | | | (1.8*) | | | | |
| 般項 | | ng/L U/100mL | | | | | | 1 | /1 | | 0 | 0 / 10 |
| 日 | - 1.20 EL 391 | ng/L | | | | | | 1 <0.5 | <1 <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | 0.12 | <0.05 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.20 | 0 / 2 |
| | | ng/L | | | | | | 0.12 | 0.016 | ~ | 0.038* | 2 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | 0.010 | | 000. | _ , 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | ng/L | | | | | | | | | | |
| L | 底層溶存酸素量 m | ng/L | 7.8 | 6.2 | \sim | 9.9 | 0 / 12 | 7.8 | 6.2 | \sim | 9.9 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | ng/L | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| l | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 健康 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 項 | <u> </u> | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | 0.02 | <0.01 | ~ | 0.09 | 0 / 6 |
| | | ng/L | | | _ | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特础 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | <u> </u> | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 m | ng/L | | | | | | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | - / 6 |
| | 燐酸態燐 m | ng/L | | | | | | 0.013 | 0.006 | \sim | 0.026 | - / 6 |
| , | TOC m | ng/L | | | | | | | | | | |
| その | | g/m3 | | | | | | 1.5 | 0.7 | ~ | 4.1 | - / 12 |
| 佃 | | S/cm | | | | | | | | | | |
| 項 | | ng/L ⊯ | | | | | | | | | | |
| 目 | | 度 ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | /100mL | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環場 | | L 隹占でなることか | テナ | | | 1 | <u> </u> | I. | | | 1 |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度 |
|-----|--|-----|------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|-------|------|----------|
| _ | 系名 | | <u>燧灘北西部</u> | A am | | | | 燧灘北西部 | 1 A Am | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 福山市環境保 35000060(610 | | | | | 福山市環境保 | | | | |
| _ | 定地点名 定地点名 | | | | | | | 35000060(6) 燧灘北西部6 | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | , | | | | 燧灘北西部 | U | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ A ✓ | | | | | ※ A イ | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ж П イ | | | | | ※ Ⅱ イ | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | 型 | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | 名 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | i型 | | | | | | | | | | |
| 誹 | <u>海</u> | /-1 | 777 M-1 | 年間調 | | | , | 77 k/2 | | 間調査 中 | | , |
| | 測定項目 単 流量 m3 | | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | pH III3 | / 3 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.3 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.3 | 0 / 12 |
| | DO mg | /I | 8.4 | 6.3* | ~ | 10 | 2 / 12 | 8.5 | 6.5* | ~ | 11 | 2 / 12 |
| | BOD mg | | | 0.0 | | 10 | 5 / 15 | | 010 | | | 5 , 15 |
| | (75%値) mg | | | | | | | | | | | |
| | COD mg | | 2.0 | 1.6 | \sim | 3.1* | 4 / 12 | 2.0 | 1.5 | ~ | 3.0* | 5 / 12 |
| _ | (75%值) mg | /L | (2.1*) | | | | | (2.1*) | | | | |
| 般 | | | 2 | <1 | ~ | 4 | 0 / 12 | 2 | 1 | ~ | 3 | 0 / 12 |
| 項目 | 5 4740 pm 594 | _ | 1 | <1 | \sim | 1 | 0 / 12 | | | | | |
| H | II-・ペイリン抽山物貝_佃刀寺 IIIg | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全窒素 mg | | 0.13 | 0.08 | ~ | 0.27 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全燐 mg | | 0.022 | 0.013 | ~ | 0.044* | 2 / 12 | | | | | + |
| 1 | 全亜鉛 mg ノニルフェノール mg | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | LAS mg | | | | | | | | | | | + |
| | 底層溶存酸素量 mg | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム mg | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg | /L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg | /L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 mg | | | | | | | | | | | |
| | PCB mg | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg 四塩化炭素 mg | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg 1,2-ジクロロエタン mg | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg | /L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg | | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg | /L | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ mg | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | ベンゼン mg セレン mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | ゼレン mg 硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | + |
| 1 | 更硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | + |
| | 確的 耐酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| Ì | ふっ素 mg | | | | | | | | | | | 1 |
| | ほう素 mg | | | | | | | | | | | |
| Ĺ | 1,4-ジオキサン mg | /L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 mg | | | | | - | | | | • | | |
| ?殊項 | 鉄_溶解性 mg | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | |
| |) IIIg | | 15000 | | | 1000 | , | | | | | 1 |
| Ì | 塩素イオン mg | | 17300 | 16400 | ~ | 18000 | - / 12 | | | | | 1 |
| | 有機態窒素 mg アンモニア態窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| | グーン・ドラス mg 燐酸態燐 mg | | | | | | | | | | | 1 |
| | が中日な形式が TOC mg | | 1.7 | 1.4 | ~ | 2.0 | - / 4 | | | | | |
| そ | クロロフィルa mg/ | | 2.3 | 0.7 | ~ | 3.5 | - / 6 | | | | | 1 |
| の | 電気伝導度 μS. | | | | | | , , | | | | | |
| 他項 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 目 | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg | | | | | | | | | | | |
| Ì | 4-t-オクチルフェノール mg | | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 個/10 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | | | | | 1 | | | | | |

| 水系名 操進北西部 操進北西部 操進北西部 操進北西部 操進北西部 福山市環境保全課 福山市環境保全課 福山市環境保全課 福山市環境保全課 35000060(610-06) 35000060(610-06) 35000060(610-06) 独産北西部60 操離北西部60 操離北西部60 操離北西部60 操離北西部60 操離北西部60 | -06) | 調査 全層 | m/n 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 2 / 12 |
|--|--|---|--|
| 測定地点番号 35000060(610-06) 35000060(610-06) 測定地点名 経離北西部60 経離北西部60 経離北西部60 経離北西部60 接離北西部60 接述由60 接 | 年間 最小 7.9 6.3* 1.5 〈1 〈1 〈0.5 0.08 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 測定地点名 | 年間 最小 7.9 6.3* 1.5 〈1 〈1 〈0.5 0.08 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| COD等に係る歌は基準類型 | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| COD等に係る環境基準類型 | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 全窒素・全燐に係る木域名 廃離北西部 廃離北西部 全窒素・全燐に係る環境基準類型 ※ II イ 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・現年産する場の適応性に係る環境基準類型 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 年間調査下層 調定項目 単位 平均 最小 最大 m/n 平均 流量 m3/S 8.1 7.9 ~ 8.1 0 / 12 8.1 DO mg/L 2.0 1.5 ~ 3.0* 3 / 12 2.0 BOD mg/L 2.0 1.5 ~ 3.0* 3 / 12 2.0 (75%値) mg/L 2.0 1.5 ~ 3.0* 3 / 12 2.0 (75%値) mg/L 3 1 ~ 4 0 / 12 2 項子、大腸菌数 CFU/100ml 1 1 4 0 / 12 2 全選素 mg/L 2 0.13 2 2 2 全選素 mg/L 2 2 2 2 2 上外フェノール mg/L 2 2 2 2 3 4.2 9.9 0 / 12 7.3 3 3 1 <td>最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013</td> <td> 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* </td> <td>0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12</td> | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 全室素・全燐に係る環境基準類型 | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 期定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S pH | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 m3/S pH | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 調査名 | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 調査名 | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S pH mg/L m8/L | 最小 7.9 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | 最大 8.3 11 3.1* 4 1 (0.5 0.27 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 流量 | 7.9 6.3* 1.5 41 41 40.5 0.08 0.013 | ~ 8.3 ~ 11 ~ 3.1* ~ 4 ~ 1 ~ <0.5 ~ 0.27 ~ 0.044* | 0 / 36 4 / 24 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| pH mg/L 7.9 ~ 8.1 0 / 12 8.1 DO mg/L 8.5 BOD mg/L 8.5 (75%値) mg/L 2.0 1.5 ~ 3.0* 3 / 12 2.0 (75%値) mg/L (2.0*) 破 mg/L 3 1 ~ 4 0 / 12 2 大腸菌数 CFU/100mL 1 n-ヘキサン抽出物質 油分等 mg/L 0.13 全 mg/L 0.022 全 mg/L 0.022 /=ルフェノール mg/L 0.022 LAS mg/L 0.022 産 mg/L 0.022 企 mg/L 0.022 企 mg/L 0.022 企 mg/L 0.022 金 mg/L 0.022 金 mg/L 0.022 金 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.022 0.022 0.024 0.022 0.022 0.025 0.022 0.022 0.026 0.022 0.022 0.027 0.022 0.022 0.028 0.022 0.022 0.029 0.022 0.022 0.020 0.022 0.022 0.022 0.02 | 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | \sim 11 \sim 3.1* \sim 4 \sim 1 \sim (0.5) \sim 0.27 \sim 0.044* | 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| DO mg/L BOD mg/L (75%値) mg/L COD mg/L (75%値) mg/L (2.0*) mg/L (2.0*) (2.0*) 般 SS mg/L 項 大腸菌数 CFU/100%L n~~キサン抽出物質 油分等 mg/L 全窒素 mg/L 全媒 mg/L /ニルフェノール mg/L LAS mg/L 庭屬溶存酸素量 mg/L カドミウム mg/L 全シアン mg/L 会シアン mg/L 会シアン mg/L かまらみ mg/L かまらみ mg/L 会シアン mg/L かまらみ mg/L かまらみ mg/L かまらみ mg/L かまらみ mg/L 会シアン mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L のまる mg/L </td <td>6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013</td> <td>\sim 11 \sim 3.1* \sim 4 \sim 1 \sim (0.5) \sim 0.27 \sim 0.044*</td> <td>12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12</td> | 6.3* 1.5 <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | \sim 11 \sim 3.1* \sim 4 \sim 1 \sim (0.5) \sim 0.27 \sim 0.044* | 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| BOD mg/L mg/L | 1.5 <1 <1.5 <0.5 0.08 0.013 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 12 / 36 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| (75%値) mg/L 2.0 1.5 ~ 3.0* 3 / 12 2.0 (2.0*) 数SS mg/L 3 1 ~ 4 0 / 12 2 項 大腸菌数 1 ~ 4 0 / 12 2 至 変素 mg/L | <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | $ \begin{array}{cccc} $ | 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| COD (75%値) mg/L (2.0*) 1.5 ~ 3.0* 3 / 12 2.0 (2.0*) 般 SS mg/L 3 1 ~ 4 0 / 12 2 其大腸菌数 1 ~ 4 0 / 12 2 n~~キサン抽出物質_油分等 mg/L 全窒素 mg/L 全産素 mg/L / ニルフェノール mg/L LAS mg/L LAS mg/L 上AS mg/L かだら力 mg/L 上AS mg/L クニルフェノール mg/L 上AS mg/L クニルフェノール mg/L 上AS mg/L クニルフェノール mg/L からう mg/L からう mg/L からう mg/L からう mg/L mg/L からう mg/L mg/L からう mg/L mg/L mg/L からう mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | <1 <1 <0.5 0.08 0.013 | $ \begin{array}{cccc} $ | 0 / 36 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| (75%値) mg/L (2.0*) 般 SS mg/L 3 1 ~ 4 0 / 12 2 項 大腸菌数 CFU/100mL 1 1 n~~キサン抽出物質_油分等 mg/L <0.5 | <1 <0.5 0.08 0.013 | ~ 1 ~ <0.5 ~ 0.27 ~ 0.044* | 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 項 大腸菌数 GFU/100mL 1 n-ヘキサン抽出物質 油分等 mg/L <0.5 | <1 <0.5 0.08 0.013 | ~ 1 ~ <0.5 ~ 0.27 ~ 0.044* | 0 / 12 0 / 12 0 / 12 |
| 日 nーペキサン抽出物質 油分等 mg/L く0.5 全塞素 mg/L 0.13 全燐 mg/L 0.022 全亜鉛 mg/L 0.022 ノニルフェノール mg/L 0.022 LAS mg/L 0.022 産層溶存酸素量 mg/L 0.022 カドミウム mg/L 0.022 金シアン mg/L 0.022 鉛 mg/L 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 0.022 0.022 かいまり、 <td><0.5 0.08 0.013</td> <td>~ <0.5 ~ 0.27 ~ 0.044*</td> <td>0 / 12 0 / 12</td> | <0.5 0.08 0.013 | ~ <0.5 ~ 0.27 ~ 0.044* | 0 / 12 0 / 12 |
| 1 | 0.08 0.013 | ~ 0.27 ~ 0.044* | 0 / 12 |
| 全構 mg/L 0.022 全亜鉛 mg/L 0.022 ノニルフェノール mg/L 0.022 LAS mg/L 0.022 庭層溶存酸素量 mg/L 0.022 カドミウム mg/L 0.022 カドミウム mg/L 0.022 金シアン mg/L 0.022 鉛 mg/L 0.022 鉛 mg/L 0.022 銀 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 公 mg/L 0.022 < | 0.013 | ~ 0.044* | |
| 全亜鉛 mg/L ノニルフェノール mg/L LAS mg/L 底層溶存酸素量 mg/L カドミウム mg/L 全シアン mg/L 鉛 mg/L | | | 2 / 12 |
| ノニルフェノール mg/L LAS mg/L 底層溶存酸素量 mg/L カドミウム mg/L 全シアン mg/L 鉛 mg/L | 4.2 | | |
| LAS mg/L 底層溶存酸素量 mg/L 7.3 4.2 ~ 9.9 0 / 12 7.3 カドミウム mg/L 全シアン mg/L 鉛 mg/L | 4.2 | | 1 |
| 底層溶存酸素量 mg/L 7.3 4.2 ~ 9.9 0 / 12 7.3 カドミウム mg/L 全シアン mg/L 鉛 mg/L | 4.2 | | |
| カドミウム mg/L 全シアン mg/L 鉛 mg/L | 1.2 | \sim 9.9 | 0 / 12 |
| 全シアン mg/L 鉛 mg/L | | 5.5 | 0 / 12 |
| 蚧 mg/L | | | |
| | | | |
| 六価クロム mg/L | | | |
| 砒素 mg/L | | | |
| 総水銀 mg/L | | | |
| アルキル水銀 mg/L | | | |
| PCB mg/L | | | |
| ジクロロメタン mg/L | | | |
| 四塩化炭素 mg/L 1,2-ジクロロエタン mg/L | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | | |
| シスー1,2-ジクロロエチレン mg/L | | | |
| (世) 1,1,1-トリクロロエタン mg/L | | | |
| 康 1,1,2-トリクロロエタン mg/L | | | |
| 現 トリクロロエチレン mg/L | | | |
| テトラクロロエチレン mg/L | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン mg/L | | | |
| チウラム mg/L | | | |
| シマジン mg/L | | | |
| チオベンカルブ mg/L | | | |
| ベンゼン mg/L | | | |
| セレン mg/L 硝酸性窒素 mg/L | | | |
| 明酸性室系 mg/L mg/L | | | |
| 理明政任室系 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L | | | |
| ふつ素 mg/L | | | |
| ほう素 mg/L | | | |
| 1,4-ジオキサン mg/L | | | |
| 特 銅 mg/L | | | |
| 殊 鉄 溶解性 mg/L | - | | |
| 項 マンガン。溶解性 mg/L | | | |
| 目 | | | |
| <u>塩素イオン</u> mg/L 17300 | 16400 | ~ 18000 | - / 12 |
| 有機能窒素 mg/L | | | |
| アンモニア態窒素 mg/L 燐酸態燐 mg/L | | | |
| 79年B安性539年 mg/L 1.7 | 1.4 | ~ 2.0 | - / 4 |
| TOC | 0.7 | ~ 2.0 ~ 3.5 | - / 4 |
| の 電気伝道度 リタノの リカス リカス リカス リカス リカス リカス カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ | 0.1 | 0.0 | , 0 |
| 他 メチレンブルー活性物質 mg/L | | | |
| 目 濁度 度 | | | |
| トリハロメタン生成能 mg/L | | | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L | | | |
| アニリン mg/L | | | |
| 2, 4-ジクロロフェノール mg/L | | | |
| ふん便性大腸菌群数 | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 | 年度 |
|--------|----------------------------------|------|---|--------------|---|--------------|--------|----------------------|--------|--------|-----|-------|------|
| | 系名 | | <u> </u> | A ≃m | | | | 燧灘北西部 | 7 A AM | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 35000061(610 | | | | | 広島県環境例 35000061(6 | | | | | |
| _ | _{足地点备亏} 定地点名 | | | | | | | 多数000001(6 | | | | | |
| _ | た地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | 1 | | | | |
| _ | DD等に係る環境基準類型 | | A 1 | | | | | A 1 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | П / | | | | | П / | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | 型 | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | _ | | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | I型 | | | | (1.0) | | | | | | | |
| 調 | 查名 | /-l- | 平均 | 年間調 | | | / | 平均 | _ | 間調査 中 | | 1 | / |
| | 測定項目 単 流量 m3 | | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m | /n |
| | pH | 7.0 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / | / 12 |
| | DO mg | /L | 8.1 | 6.4* | ~ | 10 | 3 / 12 | 8.1 | 6.5* | ~ | 10 | 3 / | / 12 |
| | BOD mg | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) mg | /L | | | | | | | | | | | |
| | COD mg | /L | 1.8 | 1.4 | ~ | 2.6* | 1 / 12 | 1.7 | 1.3 | \sim | 1.9 | 0 , | / 12 |
| - | (75%値) mg | | (1.9*) | | | | | (1.8) | | | | | |
| 般 | SS mg | _ | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 大腸菌数 CFU/5 | _ | 92 | <1 | ~ | 520 | 0 / 12 | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg 全窒素 mg | _ | <0.5 0.13 | <0.5 0.05 | ~ | <0.5 0.21 | 0 / 2 | | | | | | |
| | 主 全 然 IIIg 全 媒 mg | | 0.13 | 0.03 | ~ | 0.036* | 4 / 12 | | | | | | |
| | 全亜鉛 mg | | V.V41 | 0.010 | | v.VJU* | 7 / 12 | | | | | | |
| | ノニルフェノール mg | | | | | | | | | | | | |
| | LAS mg | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 mg | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム mg | /L | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン mg | _ | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg アルキル水銀 mg | | | | | | | | | | | | |
| | PCB mg | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン mg | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg | _ | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg | /L | | | | | | | | | | | |
| /esta. | シス-1,2-ジクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン mg テトラクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg 1,3-ジクロロプロペン mg | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg | /L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ mg | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン mg | | | | | | | | 1_ | | | | |
| | セレン mg | /L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg | _ | | | | | | | 1 | | | | |
| | ふっ素 mg ほう素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | it 2)系 | | | | | | | | | | | | |
| A+- | fi,4=フタイリン ing 銅 mg | | | | | | + | | | | | | |
| 特殊 | 鉄_溶解性 mg | | | | | | | | | | | | |
| 殊項! | マンガン_溶解性 mg | _ | | | | | | | | | | | |
| 目 | クロム mg | /L | | | | | | | | • | | | • |
| Ì | 塩素イオン mg | | | | | | | | | | | | |
| | 有機能窒素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア能窒素 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 mg TOC mg | | | | | | | | 1 | | | | |
| そ | TOC mg クロロフィルa mg/ | | 0.9 | 0.7 | ~ | 1.4 | - / 6 | | | | | | |
| の | 電気伝導度 μS | _ | 0.0 | 0.1 | | 1.7 | , 0 | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 mg | | | | | | | | | | | | |
| 月日 | 濁度 周 | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール mg | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg | | | _ | | - | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg | | | | | | 1 | | | | | | |
| ı | ふん便性大腸菌群数 個/10 | | 負であることを | | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------|--------|-----|--------|-----------------------|-------|--------|--------|-----------|
| | 系名 | | <u> </u> | A am | | | | 燧灘北西部 | A Am | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 35000061 (610 | | | | | 広島県環境係 35000061(6) | | | | |
| | 定地点番号 | | | | | | | 35000061(6) 燧灘北西部6 | | | | |
| _ | _{圧地思名} DD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部61 燧灘北西部 | | | | | 逐無北西部 | 1 | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | A T | | | | | Aイ | | | | |
| | 窒素・全燐に係る水域名 | | 燧灘北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II 1 | | | | | II 1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 11 1 | | | | | 11 | | | | |
| _ | と生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | |
| _ | E生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | |
| | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間 | 調査 下 | 層 | | | 年間 | 調査 🛭 | 2層 | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | | n3/S | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 36 |
| | | ng/L | 8.1 | 6.4* | ~ | 10 | 3 / 12 | 8.1 | 6.4* | ~ | 10 | 9 / 36 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.0 | | | | | | | | | |
| | | ng/L | 1.6 | 1.2 | \sim | 2.0 | 0 / 12 | 1.7 | 1.2 | ~ | 2.6* | 1 / 36 |
| <u>μ</u> n. | | ng/L | (1.7) | | | | | (1.8*) | | | | |
| 般項 | | ng/L U/100mL | | | | | | 92 | <1 | ~ | 520 | 0 / 12 |
| 目 | 7 4/100 Juli 2014 | ng/L | | | | | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | 0.13 | 0.05 | ~ | 0.21 | 0 / 2 |
| | | ng/L | | | | | | 0.027 | 0.016 | ~ | 0.036* | 4 / 12 |
| | | ng/L | | | | | | | 5.510 | | 000. | - , 12 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| Ĺ | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 全シアン n | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | 1 |
| 健 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | 1 |
| 康 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| 項目 | 7 7 | ng/L | | | | | | | | | | |
| П | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | 1 |
| | 1 | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| - | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | ng/L | | | | | | | | | | 1 |
| 殊項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 月 | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| - | | ng/L ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | 1 |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| そ | | ıg/m3 | | | | | | 0.9 | 0.7 | ~ | 1.4 | - / 6 |
| (J) | | S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | | ng/L | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | - | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | ng/L | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール m | ng/L | | | | | | | | | | |
| | | /100mL | | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------------|--------|--------|----|-----------|
| _ | 系名 | | 燧灘北西部 短山土環境(2) | △ ±m | | | | 燧灘北西部 | 1 A #P | | | |
| | 定機関 | | 福山市環境保 35000065(61 | | | | | 福山市環境係 35000065(6: | | | | |
| _ | 定地点番号 | | | | | | | | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部65 燧灘北西部 | J | | | | 燧灘北西部6 燧灘北西部 | υ | | | |
| | OD等に係るのではの水吸名 OD等に係る環境基準類型 | | 修興北四部 A イ | | | | | 逐難北四部 A イ | | | | |
| | OD等に係る現現基準頻至 :窒素・全燐に係る水域名 | | A イ 燧灘北西部 | | | | | A イ 燧灘北西部 | | | | |
| _ | ・ 全条・主解に係る小域名 : | | 逐無礼四部 II イ | | | | | 逐無礼四部 Ⅱ イ | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | п.1 | | | | | п /1 | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 進類型 | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | | | | | | | | | | |
| _ | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | |
| _ | l査名 | | | 年間調査 | 虹 上層 | (表層) | | | 年間 | 引調査 下層 | 音 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | .,,,, | | | | | | |
| | рН | | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | | | | | |
| | DO | mg/L | 8.3 | 6.6* | \sim | 10 | 4 / 12 | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.5* | 1.9 | \sim | 3.0* | 10 / 12 | | | | | |
| - | (75%値) | mg/L | (2.7*) | | | | | | | | | |
| 般 | | mg/L | 5 | 3 | ~ | 8 | 0 / 12 | | | | | |
| 項目 | 7 (10) pi 3/4 | CFU/100mL | 2 | <1 | \sim | 10 | 0 / 12 | | | | | 1 |
| H | 川-ペイリン抽山物貝_佃刀寺 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.16 | 0.11 | ~ | 0.28 | 0 / 12 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.031* | 0.017 | ~ | 0.053* | 4 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| | LAS | mg/L | | | | | | 0.5 | | | | 0 / |
| - | 底層溶存酸素量 | mg/L | /0.0000 | /0.0000 | _ | /0.0000 | 0 / : | 8.5 | 6.1 | ~ | 11 | 0 / 12 |
| | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 1 | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 1 | | | | | |
| | 会 一 | mg/L | <0.005 | <0.005 <0.01 | ~ | <0.005 | 0 / 1 | | | | | |
| | 六価クロム 砒素 | mg/L | <0.01 <0.005 | <0.01 | ~ | <0.01 <0.005 | 0 / 1 | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 1 | | 1 | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | \0.0000 | 0.000 | | \0.0000 | 0 / 1 | | | | | |
| | PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 1 | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | .3,000 | .0.000 | | | , 1 | + | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | + | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 月日 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | 10.0 | | | /* *: | 0 / | | | | | 1 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 1 | | | | | 1 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | - | | | | |
| | はう素 | mg/L | | | | | | 1 | | | | |
| - | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | 1 | | | | |
| 特 | 銅 針: ※ ※ 400 MH | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄、溶解性 マンボン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L | | | | | | | | | | |
| - | 塩素イオン | mg/L | 17000 | 15400 | ~ | 18000 | - / 12 | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/L | 21000 | 10400 | - | 10000 | / 12 | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | + | 1 | | | 1 |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | 1.8 | 1.5 | ~ | 2.1 | - / 4 | | | | | |
| | クロロフィルa | mg/m3 | | | | | 1 | | | | | |
| の | | μ S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | 14 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | · | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | |
| L | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | 四倍 其》 | 供上づた ファした | = + | | | | | | | | |

| 名 機関 地点番号 地点名 等に係るあてはめ水域名 等に係る環境基準類型 素・全燐に係る環境基準類型 生物の生息状況の適応性に係る水域名 主物の生息状況の適応性に係る係る環境 主物の生息・再生産する場の適応性に係る の の の の の の の の の の の の の の の の の の の | 基準類型 る水域名 | 接離北西部 塩山市環境保 35000065 (61) 接離北西部65 接離北西部7 水イ 経難北西部 Ⅱイ 平均 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 0-80) | 調査 4 ~ ~ ~ ~ | 全層 最大 8.2 10 | 0 | m/n | 凝離北西部広島県環境保3500612 (61)経離北西部6経離北西部Aイ平均 | 0-81) | 至上層(表層) ~ 最大 | m/n |
|--|--|---|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|---------|--|----------------|-----------------|---------|
| 地点番号 地点名 「等に係るあてはめ水域名 等に係る環境基準類型 素・全燐に係る水域名 素・全燐に係る環境基準類型 生物の生息状況の適応性に係る水域名 主物の生息状況の適応性に係る係る環境 主物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 名 「定項目 (重 日 O O D 5%値 O D 5%値 O D 5%値 O C E M B M B M C C C C C C C C C C C C C C C | 基準類型 本 | 35000065 (61) | 年間 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 35000612 (61 産業北西部6 産業北西部 A イ | 0-81) 1-2 年間調3 | | m/n |
| 地点名 等に係るあてはめ水域名 等に係る既境基準類型 素・全燐に係る水域名 素・全燐に係る水域名 素・全燐に係る環境基準類型 生物の生息状況の適応性に係る係る環境 生物の生息状況の適応性に係る係る環境 生物の生息・再生産する場の適応性に係る際り 名 同定項目 量 | 基準類型 本 | 接離北西部6 接離北西部 A イ | 年間 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 旅灘北西部6 旅灘北西部 Aイ | 1-2 | | m/n |
| 等に係るあてはめ水域名 等に係る環境基準類型 素・全燐に係る環境基準類型 整・金燐に係る環境基準類型 生物の生息状況の適応性に係る水域名 主物の生息、研生原子の場の適応性に係る係る環境 主物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 主物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 を | 基準類型 本 | | 年間 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 燈灘北西部 Aイ | 年間調査 | | m/n |
| 等に係る環境基準類型 素・全燐に係る水域名 素・全燐に係る水域名 素・全燐に係る環境基準類型 生物の生息状況の適応性に係る水域名 主物の生息状況の適応性に係る係る環境 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 名 切定項目 6量 イ の OD 5%値) OD 5%値) S 腸菌数 ーペキサン抽出物質、油分等 室素 透燐 = 亜鉛 ニルフェノール | 基準類型 本 | A イ 機業北西部 II イ 平均 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | Aイ | | | m/n |
| 素・全燐に係る水域名 素・全燐に係る環境基準類型 生物の生息状況の適応性に係る水域名 生物の生息状況の適応性に係る係る環境 生物の生息・再生産する場の適応性に係る 物の生息・再生産する場の適応性に係る 気 名 定項目 低量 H O OD 5%値) OD 5%値) S | 基準類型 本 | 産業北西部 II イ 平均 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | | | | m/n |
| 素・全燐に係る環境基準類型 生物の生息状況の適応性に係る水域名 生物の生息・再生産する場の適応性に係る係る環境 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 名 間定項目 5量 引 O OD 5%値) OD 5%値) OD 5%値) S : 腸菌数 - ヘキサン抽出物質」油分等 金素 上 上 上 に に に に に に に に に に に に に | 基準類型 本 | 平均 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 平均 | | | m/n |
| 生物の生息状況の適応性に係る水域名 主物の生息状況の適応性に係る係る環境 主物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 名 別定項目 活量 日 O OD 5%値) OD 5%値) S : 腸菌数 - ヘキサン抽出物質」油分等 金素 と嫌 に解する と変素 と確 に解する に解す に解する | 基準類型 本 | 平均 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 平均 | | | m/n |
| 主物の生息状況の適応性に係る係る環境 主物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 名 定項目 活量 日 O OD 5%値) OD 5%値) OD 5%値) OD 5%値) A に勝菌数 一ヘキサン抽出物質」油分等 窓素 と嫌 に解する に解 | 基準類型 本 | 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 平均 | | | m/n |
| 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境名 名 定項目 (量 H O OD 5%値) OD 5%値) S :腸菌数 - ヘキサン抽出物質_油分等 室素 と機 に乗 に乗 に乗 に乗 に乗 に乗 に に の の の の の の の の の の の の の | る水域名 | 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 平均 | | | m/n |
| 物の生息・再生産する場の適応性に係る環境名 相定項目 量 H O OD 5%値) OD 5%値) OD 5%値) A - ルーキサン・抽出物質、油分等 ・ 室素 - 焼 - ボーナン・ルール | 単位 m3/S mg/L | 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 平均 | | | m/n |
| 名 定項目 量 -1 O OD 5%値) OD 5%値) S | 単位 m3/S mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 平均 | | | m/n |
| 定項目 括量 | m3/S mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L cFU/100mL mg/L | 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 最小 8.0 6.6* | ~ | 最大 | | m/n | 平均 | | | m/n |
| 5量 - HOOOD ODO 5%値) ODO 5%値) S6 S6 S8 B腸菌数 - ヘキサン抽出物質_油分等 - 窒素 - 燐 - 連鉛 ニルフェノール | m3/S mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L cFU/100mL mg/L | 8.1 8.3 2.5* (2.7*) 5 | 8.0 6.6* | ~ | 8.2 | | 111/ 11 | | 4文/1 | 双八 | 111/ 11 |
| H O O O D 5%値) O D 5%値) O D 5%値) S : | mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L | 2.5* (2.7*) 5 | 6.6* | | | 0 | | | | | |
| O OD 5%値) OD 5%値) 5 : 腸菌数 - ヘキサン抽出物質_油分等 ・ 窒素 ・ 健構 ・ 車 亜 鉛 | mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L cFU/100mL mg/L | 2.5* (2.7*) 5 | 6.6* | | | | / 12 | | | | |
| OD 5%値) OD 5%値) 5%値) 6 3 3 3 3 3 3 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L cFU/100mL mg/L | 2.5* (2.7*) 5 | | | | 4 | / 12 | | | | + |
| 5%値) OD 5%値) 5%値) | mg/L mg/L mg/L mg/L CFU/100mL mg/L | (2.7*) | 1.9 | | 10 | 1 | , 12 | | | | _ |
| OD 5%値) 5 8 B | mg/L mg/L mg/L CFU/100mL mg/L | (2.7*) | 1.9 | | | | | | | | |
| 5%値) 3 :腸菌数 -ヘキサン抽出物質 油分等 窒素 燐 :亜鉛 ニルフェノール | mg/L mg/L CFU/100mL mg/L | (2.7*) | 110 | ~ | 3.0* | 10 | / 12 | | | | + |
| に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | mg/L CFU/100mL mg/L | 5 | 1 | | 3.07 | 10 | , 12 | | | | |
| :腸菌数 -ヘキサン抽出物質_油分等 窒素 燐 :亜鉛 ニルフェノール | CFU/100mL mg/L | | 3 | ~ | 8 | 0 | / 12 | | | | |
| - ヘキサン抽出物質 _、 油分等 窒素 燐 : 亜鉛 ニルフェノール | mg/L | 2 | <1 | ~ | 10 | 0 | / 12 | | | | 1 |
| · 窒素 ・ 亜鉛 ニルフェノール | | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 | / 12 | | | | 1 |
| 正 | | 0.16 | 0.11 | ~ | 0.28 | 0 | / 12 | | | | 1 |
| :亜鉛 ニルフェノール | mg/L | 0.031* | 0.017 | ~ | 0.053* | 4 | / 12 | | | | 1 |
| ニルフェノール | mg/L | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | mg/L | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | mg/L | | | | | | | | | | 1 |
| 層溶存酸素量 | mg/L | 8.5 | 6.1 | ~ | 11 | 0 | / 12 | | | | 1 |
| ドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 1 | | | | 1 |
| シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 1 | | | | |
| ì | mg/L | < 0.005 | < 0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 | < 0.005 | < 0.005 | ~ <0.005 | 0 / 1 |
| 価クロム | mg/L | < 0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 | / 1 | | | | |
| 太素 | mg/L | < 0.005 | < 0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 1 | < 0.005 | < 0.005 | ~ <0.005 | 0 / 1 |
| 冰銀 | mg/L | < 0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 1 | | | | |
| ルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | |
| CB | mg/L | < 0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 1 | | | | |
| ウロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | |
| 2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| ス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| リクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| トラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 | / 1 | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | |
| | mg/L | | | | | | | | | | |
| 泛溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | |
| ンガン_溶解性 | | | | | | | | | | | |
| | | 4=00- | | | | | , | | | | |
| | | 17000 | 15400 | ~ | 18000 | - | / 12 | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 1 | | - | | | |
| | | 1.0 | , - | | 0.1 | 1 | / 4 | - | | | |
| | | 1.8 | 1.5 | ~ | 2.1 | - | / 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | + |
| | | | | | | 1 | | | | | |
| | _ | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | + |
| | | | | | | - | | | | | + |
| | | | | | | - | | | | | |
| | (価クロム) 表 | 大学 mg/L | 大学 1 | 大学 | 大水銀 | 大水銀 | 大水銀 | 大水銀 | 大乗 | | 接触 |

| | | | | | | | | 10 10 | | | | | (2024 | 年度) |
|-------|-------------------------------|--------------|---|----------------|------|---------|-------|--------------|-----|---------|--------|---------|-------|-----|
| | 系名 | | <u> </u> | A am | | | | 燧灘北 | | A am | | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | 広島県 | | | | | | |
| | 定地点番号 | | 35000612 (61 | | | | | 350006 | | | | | | |
| _ | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部61 | Z | | | | 燧灘北 燧灘北 | | 3 | | | | |
| | DD等に係るめてはめ水吸名 DD等に係る環境基準類型 | | 燧灘北西部 A イ | | | | | が変弾性イム A・ | | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | A4 | | | | | A | 1 | | | | | |
| | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | + | | | | | | |
| _ | 上生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準業 | 質型 | | | | | | | | | | | | |
| - | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る水均 | | | | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 年間 | 調査 全 | ·層 | | | | 年間調査 | : 上層 | (表層) | | |
| | 測定項目 単 | 单位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平 | 均 | 最小 | \sim | 最大 | m | /n |
| | 流量 m | 3/S | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | | | | | | | | | | | | |
| | DO m | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | BOD m | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | (75%值) m | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 般恆 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | /100mL | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| H | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | <0.005 | < 0.005 | ~ | < 0.005 | 0 / 1 | 1 <0.0 | 005 | < 0.005 | ~ | < 0.005 | 0 | / 1 |
| | | g/L | | 101000 | | (01000 | 0 , . | | | 101000 | | 101000 | , | - |
| | | g/L | < 0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 1 | 1 <0.0 | 005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB m | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| /edu. | シス-1,2-ジクロロエチレン m | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 項 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| Î | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| L | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 m; | g/L | | | | | | | | | | - | | |
| 殊項 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| Н | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 m | g/L | | | | | | | | | | | | |
| そ | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| の | | g/m3 S/cm | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | s/cm g/L | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | g/L 度 | | | | | | | | | | | | |
| Ħ | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| l | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | 100mL | | | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | 上 毎よっぺもファした | <u>ー</u> ニナ | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |

| _ | | | | | | | | • | | | | | (2024 | 年度) |
|----------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|----------|---|------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|
| | 系名 | | 燧灘北西部 | 人細 | | | | | 燧灘北西部 床自児母培促 | | | | | |
| _ | 定機関 | | 広島県環境保 | | | | | | 広島県環境保 | | | | | |
| | 定地点番号 定地点名 | | 35000613 (61) | | | | | | 35000614(61 燧灘北西部61 | | | | | |
| _ | ^{圧地点名} OD等に係るあてはめ水域名 | | 燧灘北西部61 燧灘北西部 | 1-9 | | | | | 逐無北西部 燧灘北西部 | -4 | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | | 経無礼四部 A イ | | | | | | 逐無七四司 A イ | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 21.1 | | | | | | 74.1 | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | | | | | | | | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | 頁型 | | | | | | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | | | | | | | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準数 | 類型 | | | | | | | | | | | | |
| 誹 | 查名 | | | | 調査 全 | | | | | 年間調査 | | | | |
| | | 位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m, | /n |
| | 流量 m: pH | 3/S | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | | g/L | | | | | <u> </u> | | | | | | | |
| 般 | SS m ₁ | g/L | | | | - | | | | | - | | | |
| 項目 | | /100mL | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | l | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | g/L g/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1 | | g/L g/L | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| 1 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / | 1 | < 0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | / 1 |
| | 六価クロム mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | l | g/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 1 | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | / 1 |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 健 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 康項 | l | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 月 | トリクロロエチレン m _i | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | - | |
| 1 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | g/L g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | 1 | | | | | | - | |
| 1 | l | g/L g/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1 | I | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | lぼう素 mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン mg | g/L | | | | - | | | | | | | | |
| 特 | l | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 殊項 | l | g/L | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 項目 | | g/L | | | | | 1 | | | | | | | |
| E | i | g/L | | | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | 1 | | | | | | - | |
| 1 | | g/L g/L | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TOC mg | g/L | | | | | | | | | | | | |
| そ | l | /m3 | | | | | | | | | | | | |
| の他 | | S/cm | | | | | | | | | | | | |
| 旭項 | | g/L | | | | | | | | | | | | |
| Î | | 度 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | g/L | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | | - | |
| 1 | | g/L | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 1 | | g/L 100mL | | | | | 1 | | | | | | | |
| ш | ふん使性不勝困群数 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | 44 Ha 1 - 2 | -). | | | 1 | | I | l . | | | 1 | |

| _ | Th. | ь | N MW II | | | | | DV MW II | | | | (202 | 24 年 | :度) |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------|------------|--------|-----------------------|---------|-------|---------|----------|--------|-----|
| _ | 《系名 | _ | 遂難北西部 ま自見電時(2 | ∧ ±m | | | | 燧灘北西部 広島県電路(5 | 1 / 499 | | | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 太島県環境保 35000614 (610 | | | | | 広島県環境係 35000615(6) | | | | | | |
| _ | | _ | | | | | | | | | | | | |
| _ | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | _ | 遂灘北西部61 ※灘北西郊 | -4 | | | | 燧灘北西部6 | 1-9 | | | | | |
| | OD等に係るめてはめ水吸名 OD等に係る環境基準類型 | 7și | 遂難北西部 | | | | | 燧灘北西部 | | | | | | |
| _ | OD等に保る東現本中類至 全窒素・全燐に係る水域名 | | Aイ | | | | | A イ | | | | | | |
| _ | E室素・全燐に係る水吸名 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | - | | | | | | | | | | | | |
| _ | | _ | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | ÷Π | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | _ | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | _ | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類! 引査名 | 至 | | 午 問 | 調査 组 | ∠ ⊠ | | | 年間調査 | < L 🖂 | (主屋) | | | |
| Д/ц | 測定項目 単化 | 4 | 平均 | 最小 |)则且 <u>-</u> | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | | m/n | _ |
| | 流量 m3/ | _ | T-49 | 取小 | | 取八 | 111/11 | 干約 | 取小 | | 取八 | <u> </u> | 111/11 | |
| | pH mo/ | 5 | | | | | | | | | | | | _ |
| | DO mg/ | T | | | | | | | | | | | | _ |
| | BOD mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | COD mg/ | | | | | | | | | | | | | _ |
| | (75%值) mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| 一般 | | | | | | | + | | | | | 1 | | _ |
| 項 | 大眼苗粉 CEU/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 自 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg/ | _ | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 mg/ | _ | | | | | | | | | | | | _ |
| | 全燐 mg/ | | | | | | | | | | | | | _ |
| | 全亜鉛 mg/ | | | | | | | | | | | | | _ |
| | ノニルフェノール mg/ | | | | | | | | | | | | | _ |
| | LAS mg/ | | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| | 底層溶存酸素量 mg/ | | | | | | | | | | | 1 | | _ |
| | カドミウム mg/ | | | | | | | | | | | | | _ |
| | 全シアン mg/ | _ | | | | | | | | | | | | _ |
| | 鉛 mg/ | | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | < 0.005 | ~ | <0.005 | 0 | 7 | 1 |
| | 六価クロム mg/ | | | | | | , | | | | | | | _ |
| | 砒素 mg/ | _ | < 0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 1 | < 0.005 | <0.005 | ~ | < 0.005 | 0 | 7 | 1 |
| | 総水銀 mg/ | _ | | | | | , | | | | | | | _ |
| | アルキル水銀 mg/ | _ | | | | | | | | | | | | _ |
| | PCB mg/ | _ | | | | | | | | | | | | _ |
| | ジクロロメタン mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン mg/ | L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg/ | L | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ | _ | | | | | | | | | | | | |
| 健 | 1.1.1-トリクロロエタン mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| 康項 | | L | | | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン mg/ | L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg/ | L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg/ | L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン mg/ | L | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン mg/ | L | | | | | | | | | · | | | |
| | セレン mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ | _ | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 mg/ | _ | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 1,4-ジオキサン mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 mg/ | _ | | | | | | | | | | 1 | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 mg/ | _ | | | | | | | | | | 1 | | |
| 項目 | | _ | | | | | | | | | | | | |
| П |) LA IIIg/ | _ | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン mg/ | _ | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 mg/ | _ | | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 mg/ | _ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TOC mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| その | クロロフィルa mg/i | _ | | | | | | | | | | | | |
| 他 | 電気伝導度 μ S/ | | | | | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 mg/ | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 4-t-オクチルフェノール mg/ | _ | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg/ | | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール mg/ | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | ふん便性大腸菌群数 個/10 |)mL | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | |

| 旅業北西部 | 10-85) | |
|--|-----------------|-------|
| 測定地点番号 35000615 (610-84) 35000616 (6 測定地点名 | 10-85) | |
| 測定地点名 燈灘北西部61-5 燈灘北西部6 COD等に係るあてはめ水域名 燈灘北西部 燈攤北西部 COD等に係る環境基準類型 A イ A イ 全窒素・全燐に係る水域名 全窒素・全燐に係る環境基準類型 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | |
| COD等に係るあてはめ水域名 熔灘北西部 熔灘北西部 COD等に係る環境基準類型 A イ A イ 全窒素・全燐に係る水域名 全窒素・全燐に係る環境基準類型 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 ** | | |
| COD等に係る環境基準類型 A イ 全窒素・全燐に係る水域名 全窒素・全燐に係る環境基準類型 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 A イ | | |
| 全窒素・全燐に係る水域名 全窒素・全燐に係る環境基準類型 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | |
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 水生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | |
| | | |
| 水牛牛物の牛自牛油の海内体に接て接て標度甘油転削 | | |
| 水生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類型 | | |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域名 | | |
| 水生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類型 | | |
| 調査名 年間調査全層 | 年間調査 上層(表層) | |
| 測定項目 単位 平均 最小 ~ 最大 m/n 平均 流量 m3/S | 最小 ~ 最大 | m/n |
| pH | | |
| DO mg/L | | |
| BOD mg/L | | |
| (75%值) mg/L | | |
| COD mg/L | | |
| (75%値) mg/L | | |
| 般 SS mg/L | | |
| 項 大腸菌数 CFU/100aL | | |
| H n-ヘキサン抽出物質_油分等 mg/L 全窒素 mg/L | | |
| <u> </u> | | |
| <u>全郊</u> | + | |
| 主張明 | + | |
| LAS mg/L | | |
| 底層溶存酸素量 mg/L | | |
| カドミウム mg/L | | |
| 全シアン mg/L | | |
| 鉛 mg/L <0.005 <0.005 ~ <0.005 0 / 1 <0.005 | <0.005 ∼ <0.005 | 0 / 1 |
| 六価クロム mg/L mg/L mg/L | | |
| 砒素 mg/L <0.005 <0.005 ~ <0.005 0 / 1 <0.005 | <0.005 ∼ <0.005 | 0 / 1 |
| 総水銀 mg/L | | |
| アレーアルが大戦 mg/L PCB mg/L | | |
| ジクロロメタン mg/L | | |
| 四塩化炭素 mg/L | | |
| 1,2-ジクロロエタン mg/L | | |
| 1,1-ジクロロエチレン mg/L mg/L | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L | | |
| te | | |
| 項 1,1,2-ry/2 mg/L | | |
| 目 トリクロロエチレン mg/L テトラクロロエチレン mg/L | | |
| テトラクロロエチレン mg/L 1,3-ジクロロプロペン mg/L | | |
| チウラム mg/L | | |
| シマジン mg/L | | |
| チオベンカルブ mg/L | | |
| ベンゼン mg/L | | |
| セレン mg/L | | |
| 硝酸性窒素 mg/L | | |
| 亜硝酸性窒素 mg/L | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L | | |
| <u>ふっ素</u> mg/L mg/L mg/L | | |
| ほう素 | + | |
| AF3 | | |
| 特 | + | |
| 項 マンガン 次解性 カスト | | |
| 日 クルム mg/L mg/L | | |
| 塩素イオン mg/L | | |
| 有機態窒素 mg/L | | |
| アンモニア態窒素 mg/L | | |
| 燐酸態燐 mg/L | | |
| TOC mg/L クロロフィルa mg/m3 | | |
| の 素気に道度 uS/cm | + | 1 |
| | | |
| 項 メチレンブルー活性物質 mg/L 目 濁度 度 | + | |
| トリハロメタン生成能 mg/L | | |
| 4-t-オクチルフェノール mg/L | | |
| アニリン mg/L | | |
| 2, 4-ジクロロフェノール mg/L mg/L | | |
| ふん便性大腸菌群数 個/10mL 個/10mL 個/10mL 個/10mL 個/10mL 個 表・環境基準類型の「※ 1印は各水域の環境基準点であることを示す。 | | |

| _ | | | | | | | | | | | | | (2024 年度) |
|----|------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------|---------|-----------|----------|-----------|----------|---|----|-----------|
| | 系名 | | 燧灘北西部 広島県電路(P | ∧ ±m | | | | _ | | | | | |
| | 定機関 定地点番号 | | 広島県環境保 35000616(610 | | | | | | | | | | |
| _ | 定地点备号 定地点名 | | 35000616 (610 燧灘北西部61 | | | | | | | | | | |
| _ | ^{圧地点名} DD等に係るあてはめ水域名 | | 逐無北四部01 燧灘北西部 | 0 | | | | | | | | | |
| | DD等に係るのではめが、域名 DD等に係る環境基準類型 | | A イ | | | | | \dashv | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 71.1 | | | | | _ | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | | | | | | | | | | | |
| 水生 | E生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | | |
| _ | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | | | | | | | | | | | |
| | 生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 類型 | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | | 調査 全 | | | | ment of a | | | | |
| | | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | _ | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | 流量 r pH | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| _ | | mg/L | | | | | <u>L_</u> | _ | | <u>L</u> | | | |
| 般 | SS n | mg/L | | | | | | | | | • | | |
| 項目 | 7 4130 jaar 291 | FU/100mL | | | | | | | | | | | |
| П | | mg/L | | | | | 1 | _ | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | _ | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | < 0.005 | 0 / | 1 | | | | | |
| | 六価クロム n | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健 | * | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン r | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | _ | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | - | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | \dashv | | | | | |
| | | ng/L ng/L | | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン n | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | [| | | | | |
| 殊項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| - | | mg/L | | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | \dashv | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | _ | | | | | |
| そ | | ng/m3 | | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 μ | ι S/cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| Î | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | _ | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | _ | | | | | |
| | | mg/L 100mL | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | | | | | | | | | | | |

| | | • | 公共用 | 小戏小 | 貝 | 19.1 / / | | 10 10 | | | (2024 年度) |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|-----------|---------------|------------------|--|-------|---------------|
| 水 | 系名 | | 備讃瀬戸 | | | | | 備讃瀬戸 | | | (2121 1,50) |
| _ | 定機関 | | 福山市環境保 | | | | | 福山市環境係 | | | |
| _ | 定地点番号 | | 36000001 (60 | 8-01) | | | | 36000001 (60 | 08-01) | | |
| _ | 定地点名 | | 備讃瀬戸1 | 1-15 | | | | 備讃瀬戸1 | - 1_b | | |
| | OD等に係るあてはめ水域名 OD等に係る環境基準類型 | | 箕島町地先海 | | | | | 箕島町地先海 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | | |
| _ | | | ※ Bイ 空自町地生活 | 4dt | | | | ※ Bイ 空自町地生活 | ; (d) | | |
| | :窒素・全燐に係る水域名 :窒素・全燐に係る環境基準類型 | | 箕島町地先海 W W d | | | | | 箕島町地先海 ※ IV イ | ‡-與 | | |
| _ | ・ | | ※ IV イ 備讃瀬戸(全場 | <i>t</i> :) | | | | | kd:) | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 准紹刊 | 加護機戸(主導 生物A イ | X) | | | | 畑韻㈱戸(主 生物A イ | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る? | | 生物A1 | | | | | 生物A1 | | | |
| _ | 土土物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | |
| _ | <u></u> | | | 年間調査 | 上層 | (表層) | | | 年間 | 調査 下層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ 最大 | m/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.2 | 7.9 | \sim | 8.5* | 3 / 12 | | | | |
| | DO | mg/L | 9.3 | 4.1* | \sim | 15 | 1 / 12 | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 4.3* | 2.0 | \sim | 8.3* | 6 / 12 | | | | |
| 411 | (75%値) | mg/L | (6.9*) | 1 | | 10 | 0 / 10 | | | | |
| 般項 | | mg/L CFU/100mL | 5 42 | 1 1 | ~ | 12 380 | 0 / 12 0 / 12 | | | | |
| 目 | 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | - | | | + |
| 1 | 全窒素 | mg/L | 2.1* | 1.0 | \sim | 4.2* | 11 / 12 | | | | + |
| | 全燐 | mg/L | 0.058 | 0.028 | ~ | 0.086 | 0 / 12 | | | | + |
| | 全亜鉛 | mg/L | 2,000 | 0.020 | | 5.000 | , 12 | | | | _ |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | _ |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | + |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | | | | | | 5.7 | 1.1 | ~ 9.6 | 0 / 12 |
| | カドミウム | mg/L | < 0.0003 | <0.0003 | \sim | < 0.0003 | 0 / 2 | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 2 | | | | |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | < 0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 2 | | | | |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 1 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | _ |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | _ |
| 健 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L mg/L | | | | | | | | | _ |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | |
| 項目 | | mg/L | | | | | | | | | _ |
| П | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | + |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.12 | 0.12 | ~ | 0.12 | 0 / 1 | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | $\overline{}$ |
| | はう素 | mg/L | | | | | | | | | |
| H | 1,4-ジオキサン 銅 | mg/L | | | | | | | | | |
| 特殊 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | + |
| 殊項 | 女 | mg/L | | | | | | | | | _ |
| 目 | クロム | mg/L | | | | | | | | | + |
| | 塩素イオン | mg/L | 15700 | 12000 | ~ | 17200 | - / 12 | | | | _ |
| 1 | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | İ | | | |
| 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | 2.5 | 1.7 | \sim | 4.2 | - / 4 | | | | |
| その | | mg/m3 | 23 | 2.0 | ~ | 60 | - / 7 | | | | |
| の他 | 电双位导及 | μ S/cm | | | | | | | | | |
| 他項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | |
| 1 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | + |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 備者・環境基準類型の「※」印は各水域のF | 個/100mL | <u> </u> | <u> </u> | | | <u> </u> | 1 | | | |

| | | | the att vir | | | | | Assessed No. | | | | (202 | 4 年度 |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------|---------|-------------------|---------|---------------------|-----------|------|------|
| | (系名 | | 備讃瀬戸 | △ #⊞ | | | | 備讃瀬戸 | 1 △=== | | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 福山市環境保 36000001(60 | | | | | 福山市環境保 3600002(60 | | | | | |
| _ | 定地点番ヶ <u> </u> 定地点名 | | 備讃瀬戸1 | 0-01) | | | | 備讃瀬戸2 | J6-U2) | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 箕島町地先海 | : 世 | | | | 箕島町地先海 | 市は | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | ※ B イ | | | | | ※ Bイ | F*-9A | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る水域名 | | 箕島町地先海 | 域 | | | | 箕島町地先海 | E城 | | | | |
| _ | 金素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ IV ✓ | | | | | ※ IV ✓ | rx | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域 | <u></u> | 備讃瀬戸(全地 | 或) | | | | 備讃瀬戸(全地 | 域) | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | 生物Aイ | ,,,, | | | | 生物Aイ | 747 | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に | | | | | | | | | | | | |
| 水 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環 | 境基準類型 | | | | | | | | | | | |
| 訓 | 香 名 | | | 年間 | 調査 🛭 | 全層 | | | 年間調査 | 坒 上層 | (表層) | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | I | n/n |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.2 | 7.9 | \sim | 8.5* | 3 / 12 | 8.1 | 7.8 | \sim | 8.6* | 2 | / 12 |
| | DO | mg/L | 9.3 | 4.1* | \sim | 15 | 1 / 12 | 9.3 | 5.0 | \sim | 14 | 0 | / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | 4.0. | | | | 2 / 12 | 4.0. | | | | | |
| | COD (75% left) | mg/L | 4.3* | 2.0 | \sim | 8.3* | 6 / 12 | 4.0* | 1.7 | \sim | 8.0* | 6 | / 12 |
| | (75%値) | mg/L | (6.9*) | 1 | ~ | 10 | 0 / 10 | (5.9*) | 1 | ~ | 10 | 0 | / 10 |
| 般項 | | mg/L CFU/100mL | 42 | 1 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 12 380 | 0 / 12 | 36 | 1 <1 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 10 380 | 0 | / 12 |
| 月 | | mg/L | 42 <0.5 | (0.5 | $\frac{\sim}{\sim}$ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | $\frac{\sim}{\sim}$ | <0.5 | 0 | / 12 |
| | n-ペキザン抽口物質_曲分等 全窒素 | mg/L mg/L | 2.1* | 1.0 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 4.2* | 11 / 12 | 1.4* | 0.37 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 2.8* | 9 | / 12 |
| | 全燐 | mg/L | 0.058 | 0.028 | ~ | 0.086 | 0 / 12 | 0.074 | 0.020 | ~ | 0.15* | 3 | / 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L | 0.000 | 0.040 | | 0.000 | 0 / 12 | 0.014 | 0.020 | | 0.10↑ | J | / 12 |
| | 主 型 対 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 5.7 | 1.1 | ~ | 9.6 | 0 / 12 | | | | | | |
| H | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 12 | < 0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 2 |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 2 |
| | 鉛 | mg/L | < 0.005 | < 0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | < 0.005 | < 0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 2 |
| | 六価クロム | mg/L | < 0.01 | < 0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | < 0.01 | < 0.01 | ~ | <0.01 | 0 | / 2 |
| | 砒素 | mg/L | < 0.005 | < 0.005 | ~ | < 0.005 | 0 / 2 | < 0.005 | < 0.005 | \sim | < 0.005 | 0 | / 2 |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | < 0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 2 | < 0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 2 |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 1 | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 1 |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| /esta | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1 1 //// 0 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シマジン チオベンカルブ | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.12 | 0.12 | ~ | 0.12 | 0 / 1 | 0.13 | 0.13 | ~ | 0.13 | 0 | / 1 |
| | ふっ素 | mg/L | | 1 | | | , - | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | AFI | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 一殊 | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 殊項1 | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 704 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | 15700 | 12000 | \sim | 17200 | - / 12 | 15900 | 14800 | \sim | 17900 | - | / 12 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 1 | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 7 | TOC | mg/L | 2.5 | 1.7 | ~ | 4.2 | - / 4 | 2.5 | 1.4 | ~ | 4.1 | - | / 4 |
| その | | mg/m3 | 23 | 2.0 | \sim | 60 | - / 7 | 20 | 1.4 | ~ | 66 | - | / 7 |
| 佃 | 电风体得及 | μ S/cm | | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンフルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | - | |
| 目 | | 度 | | | | | | | | | | | |
| ı | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| l | 4-t-オクチルフェノール アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | 1 | | | | | | | | | |
| ı | 2,4-シクロロフェノール ふん便性大腸菌群数 | mg/L 個/100mL | | | | | | | | | | | |
| | ペッル 医主八勝国研数 | 100mL | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | |

| _ | | | tur side vice | | | | | L the other loss | | | | (2024 年度) |
|----|---|-----|-----------------------|-------|-----|-------|--------|------------------------|---------|-----|-------|-----------|
| _ | :系名 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (*********************************** | | 備讃瀬戸 | A =m | | | | 備讃瀬戸 | 1 ^ 400 | | | |
| _ | 定機関 定地点番号 | | 福山市環境保 36000002(60 | | | | | 福山市環境係 3600002(60 | | | | |
| _ | 定地点名 | | 36000002 (60 備讃瀬戸2 | 8-02) | | | | 36000002 (60 備讃瀬戸2 | 08-02) | | | |
| - | DD等に係るあてはめ水域名 | | 第島町地先海 | ホホ | | | | 第島町地先海 | 市は | | | |
| _ | OD等に係る環境基準類型 | | ※ Bイ | **** | | | | ※ Bイ | F**50 | | | |
| | 金素・全燐に係る水域名 | | 箕島町地先海 | 域 | | | | 箕島町地先海 | i城 | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ N イ | | | | | ※ N イ | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 備讃瀬戸(全地 | 或) | | | | 備讃瀬戸(全 | 域) | | | |
| 水: | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | 型 | 生物Aイ | | | | | 生物Aイ | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | _ | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | [型 | | | | | | | | | | |
| 誹 |]査名 | | W.M. | | 間調査 | | / | 77 k/2 | | 調査ヿ | | , |
| | 測定項目 単流量 m3 | 位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | pH | 1/3 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.5* | 1 / 12 | 8.0 | 7.9 | ~ | 8.1 | 0 / 12 |
| | DO mg | ·/I | 8.8 | 4.8* | | 12 | 1 / 12 | 0.0 | 1.5 | | 0.1 | 0 / 12 |
| | BOD mg | | | 1.0 | | 10 | 1 / 15 | | | | | |
| | (75%値) mg | | | | | | | | | | | |
| | COD mg | | 3.3* | 1.7 | ~ | 6.6* | 5 / 12 | 2.0 | 1.6 | ~ | 3.1* | 1 / 12 |
| _ | (75%値) mg | | (4.8*) | | | | | (2.1*) | | | | |
| 般 | | | 4 | 1 | ~ | 8 | 0 / 12 | 2 | 1 | ~ | 4 | 0 / 12 |
| 項目 | 5 4440 ELL 394 | | | | | | | | | | | |
| П | II-ペイリン抽山物貝_佃刀寺 IIIg | | 0.50 | | | 4.4. | 1 / ** | 0.00 | 0.10 | | 0.05 | 0 / 10 |
| 1 | 全窒素 mg | | 0.70 0.044 | 0.39 | | 1.1* | 1 / 12 | 0.20 | 0.12 | ~ | 0.35 | 0 / 12 |
| | 全 体 中 の の の の の の の の の の の の の の の の の の | | 0.044 | 0.021 | . ~ | 0.089 | 0 / 12 | 0.032 | 0.021 | ~ | 0.051 | 0 / 12 |
| 1 | 全亜鉛 mg ノニルフェノール mg | | | | | | | | | | | |
| | LAS mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | 底層溶存酸素量 mg | | | | | | | 6.3 | 1.9 | ~ | 9.7 | 0 / 12 |
| | カドミウム mg | | | | | | | | | | | , 12 |
| 1 | 全シアン mg | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 mg | :/L | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム mg | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 mg | /L | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 mg | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 mg | | | | | | | | | | | |
| | PCB mg | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタンmg四塩化炭素mg | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 mg 1,2-ジクロロエタン mg | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| 健 | | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン mg | | | | | | | | | | | |
| 月 | トリクロロエチレン mg | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg | :/L | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン mg | | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg | /L | | | | | | | | | | |
| | | :/L | | | | | 1 | | | | | |
| 1 | チオベンカルブ mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | ベンゼン mg セレン mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | ゼレン mg 硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中版性至系 mg | / L | | | | | | | | | | |
| 1 | 哨酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | ふっ素 mg | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 mg | /L | | | | | | | | | | |
| L | 1,4-ジオキサン mg | /L | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 mg | /L | | | | | | | | - | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 mg | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | |
| П |) LA | | | | | | | | | | | |
| 1 | 塩素イオン mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | 有機態窒素 mg アンモニア態窒素 mg | | | | | | | | | | | |
| Ì | 燐酸態燐 mg | | | | | | | | | | | |
| | TOC mg | | | | | | | | | | | |
| そ | クロロフィルa mg/ | | | | | | | | | | | |
| の | | /cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | | | | | | | | | | | | |
| 目 | 濁度 月 | 美 | | | | | | | | | | |
| 1 | トリハロメタン生成能 mg | | | | - | - | | | | | | |
| 1 | 4-t-オクチルフェノール mg | | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2, 4-ジクロロフェノール mg | | | | | | | | | | | |
| Ц_ | ふん便性大腸菌群数 個/I 備者・環境基準類型の「※」印は各水域の環境 | | <u>L </u> | | | | | | | | | |

| | | | L the state of the | | | | | I month started | | | | (202 | 4 年度 |
|-----------------|--|--------------|--|-----------------|--------|---------|---------|------------------------------|---------|-------|----------|----------|------|
| 水系名 測定機 | 月 月 | | 備讃瀬戸 福山市環境保 | △ #⊞ | | | | 備讃瀬戸 福山市環境保 | . △=m | | | | |
| 測定地 | | | 36000002(60 | | | | | 16000003 (60 36000003 (60 | | | | | |
| 測定地 | | | 備讃瀬戸2 | 0 02) | | | | 備讃瀬戸3 | J 51 / | | | | |
| | に係るあてはめ水域名 | | 箕島町地先海 | 域 | | | | 備讃瀬戸 | | | | | |
| COD等 | に係る環境基準類型 | | ※ Bイ | | | | | A イ | | | | | |
| 全窒素 | ・全燐に係る水域名 | | 箕島町地先海 | 域 | | | | 備讃瀬戸(ロ) | | | | | |
| | ・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅳ イ | | | | | Ⅱ イ | | | | | |
| | 勿の生息状況の適応性に係る水域名 | | 備讃瀬戸(全地 | 或) | | | | 備讃瀬戸(全地 | | | | | |
| | めの生息状況の適応性に係る係る環境 | | 生物Aイ | | | | | 生物A イ | | | | | |
| | めの生息・再生産する場の適応性に係る環の生息・再生産する場の適応性に係る環 | | | | | | | | | | | | |
| 調査名 | の主心・行主座する物の適応性に床る条 | 祝巫毕炽王 | | 年間 | 調査 🕯 | 全層 | | | 年間調査 | 杏 卜層(| (表層) | | |
| | 項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | I | n/n |
| 流量 | | m3/S | | .,,, | | .,,,, | | | | | | | |
| рН | | | 8.1 | 7.8 | \sim | 8.6* | 3 / 36 | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.5* | 2 | / 12 |
| DO | | mg/L | 9.1 | 4.8* | \sim | 14 | 1 / 24 | 9.2 | 5.7* | ~ | 12 | 2 | / 12 |
| BOD | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| (75% COD | | mg/L | 3.1* | 1.6 | | 0.04 | 12 / 36 | 2.9* | 1.6 | | 4.7* | 7 | / 12 |
| (75% | | mg/L mg/L | (4.5*) | 1.6 | ~ | 8.0* | 12 / 36 | (4.1*) | 1.6 | ~ | 4.7* | 1 | / 12 |
| - (15%) 般 SS | <u> </u> | mg/L | 3 | 1 | ~ | 10 | 0 / 36 | 3 | 2 | ~ | 6 | 0 | / 12 |
| 項大腸 | 菌数 | CFU/100mL | 36 | <1 | ~ | 380 | 0 / 12 | 3 | <1 | ~ | 15 | 0 | / 12 |
| | キサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 | / 12 |
| 全窒 | | mg/L | 0.78 | 0.12 | \sim | 2.8* | 10 / 36 | 0.37* | 0.15 | ~ | 0.69* | 8 | / 12 |
| 全燐 | | mg/L | 0.050 | 0.020 | \sim | 0.15* | 3 / 36 | 0.036* | 0.021 | ~ | 0.060* | 7 | / 12 |
| 全亜 | | mg/L | | | | | | | | | | ₩ | |
| | ルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | ₩ | |
| LAS 底層 | 溶存酸素量 | mg/L mg/L | 6.3 | 1.9 | ~ | 9.7 | 0 / 12 | | | | | +- | |
| | で ウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 12 | <0.0003 | <0.0003 | ~ | < 0.0003 | 0 | / 1 |
| | アン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 1 |
| 鉛 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 |
| | iクロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 | / 1 |
| 砒素 | | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 | / 1 |
| 総水 | | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 | / 1 |
| | キル水銀 | mg/L | /0.0005 | /0.000 = | | | | | | | | <u> </u> | |
| PCB | ロロメタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 1 | | | | | ₩ | |
| | ロロスタン [化炭素 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + | |
| | ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | + | |
| | ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| シス・ | -1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目トリク | ロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ラクロロエチレン ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | ₩ | |
| 1,3- チウ | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + | |
| | ジン | mg/L | | | | | | | | | | + | |
| | ベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | † | |
| | ゼン | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| セレ | ン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 酸性窒素 | mg/L | | | | | 0 / | (0.0) | | | (0.0: | 1 | |
| | 性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.13 | 0.13 | \sim | 0.13 | 0 / 1 | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 | / 1 |
| ふっほう | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + | |
| | 系 ジオキサン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + | |
| ÆFI | * ·* 1 / * | mg/L | | | | | | | | | | 1 | |
| 10 | 李解性 | mg/L | | | | | | | | | | † | |
| 項マン | ガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目クロノ | | mg/L | | | | | | | | | | | |
| _ | イオン | mg/L | 15900 | 14800 | ~ | 17900 | - / 12 | 16700 | 14200 | ~ | 18300 | | / 12 |
| | 態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | + | |
| _ | モニア態窒素 態燐 | mg/L mg/L | | | | | | | | | | + | |
| TOC | | mg/L | 2.5 | 1.4 | ~ | 4.1 | - / 4 | 2.0 | 1.4 | ~ | 2.8 | - | / 4 |
| そクロロ | コフィルa | mg/m3 | 20 | 1.4 | ~ | 66 | - / 7 | | 1.1 | | 2.0 | † | , 1 |
| の 重気 | 伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | 1 | |
| | レンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 濁度 | | 度 | | | | | | | | | | | |
| _ | ハロメタン生成能 | mg/L | | 1 | | | | | | | | ₩ | |
| 4-t- アニ | -オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | ₩ | |
| | リン ジクロロフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | | | | +- | |
| | 便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | + | |
| | でほべ物圏中数・環境基準類型の「※」印は各水量 | | ## In | <u> </u> | | | 1 | 1 | 1 | | | | |

| _ | | | | | | | | 1 | | | | (2024 年度) |
|----------|--|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|------|-----------|
| _ | 系名 | | 備讃瀬戸 | A =m | | | | 備讃瀬戸 | A =m | | | |
| _ | 定機関 | | 福山市環境保 36000003 (609 | | | | | 福山市環境保 36000003(60 | | | | |
| _ | 定地点番号 定地点名 | | 36000003 (60) 備讃瀬戸3 | 9-51) | | | | () () () () () () () () () () | 9-51) | | | |
| _ | た地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 加賀枫戸3 備讃瀬戸 | | | | | 備讃瀬戸 | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | - 1 | 加護機戸 A イ | | | | | 湘韻㈱戸 A イ | | | | |
| _ | 空素・全燐に係る水域名 | - | (ロ) (ロ) (ロ) | | | | | A 1 備讃瀬戸(ロ) | | | | |
| | 室素・全燐に係る環境基準類型 | -+ | Ⅲ頃級 (口) | | | | | Ⅲ貞俶)(□) | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | - | 備讃瀬戸(全域 | (1 | | | | 備讃瀬戸(全地 | 献) | | | |
| _ | 主生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準類 | | 生物Aイ | 4) | | | | 生物Aイ | 5A.) | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水域 | _ | 王10/八十 | | | | | 王柳八年 | | | | |
| _ | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準類 | _ | | | | | | | | | | |
| _ | 查名 | - | | 年間 | 調査中 | 中層 | | | 年間 | 間調査 下 | 層 | |
| | | 位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n |
| | | 3/S | | | | | | | | | | |
| | рН | | 8.2 | 7.9 | \sim | 8.4* | 1 / 12 | 8.1 | 7.9 | \sim | 8.2 | 0 / 12 |
| | DO mg | g/L | 8.9 | 5.7* | \sim | 10 | 2 / 12 | | | | | |
| | BOD mg | g/L | | | | | | | | | | |
| | (75%値) mg | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | 2.8* | 1.7 | \sim | 4.4* | 7 / 12 | 2.0 | 1.5 | \sim | 3.3* | 3 / 12 |
| <u> </u> | | g/L | (3.7*) | | | | | (2.0*) | | | | |
| 般 | SS mg | g/L | 3 | <1 | ~ | 8 | 0 / 12 | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 |
| 項目 | 2 1/499 juil 291 | 100mL | | | | | | | | | | |
| П | | g/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | g/L | 0.30 | 0.15 | ~ | 0.48* | 5 / 12 | | | | | |
| | | g/L | 0.034* | 0.022 | ~ | 0.057* | 5 / 12 | | | | | |
| | | g/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | g/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | g/L | | | | | | 6.6 | 0.4 | | 0.0 | 0 / 10 |
| | 底層溶存酸素量 mg | | | | | | | 6.6 | 2.4 | ~ | 9.9 | 0 / 12 |
| | | g/L g/L | | | | | + | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | + | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | g/L | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン mg | g/L | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン mg | g/L | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン mg | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | チウラム mg | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | 1 | | | | | |
| | 硝酸性窒素 mg | g/L | | | | | 1 | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 mg | | | | | | 1 | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | - | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | 11,4-シオキザン mg 銅 mg | g/L g/L | | | | | 1 | | | | | |
| 特 | | g/L g/L | | | | | | | | | | |
| 殊項 | | g/L g/L | | | | | | | | | | |
| f | | g/L g/L | | | | | + | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | TOC mg | g/L | | | | | | | | | | |
| そ | ~ | /m3 | | | | | | | | | | |
| の | | S/cm | | | | | | | | | | |
| 他項 | | g/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | 度 | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | | g/L | | | | | | | | | | |
| | アニリン mg | g/L | | | | | | | | | | |
| 1 | 2, 4-ジクロロフェノール mg | g/L | | | | | | | | | | |
| | | 00mL | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |

| | 7.6 | | Me att \Ur- | | | | | Assessed No. | | | | (202 | 4 年度 |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|------------|---------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|----------|--------|
| | :系名 定機関 | | 備讃瀬戸 | △ #⊞ | | | | 備讃瀬戸 | . △=m | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 福山市環境保 36000003(60 | | | | | 福山市環境保 3600004(60 | | | | | |
| _ | 定地点名 | | 備讃瀬戸3 | 9-31) | | | | 備讃瀬戸4 | 19-52) | | | | |
| _ | OD等に係るあてはめ水域名 | | 備讃瀬戸 | | | | | 備讃瀬戸 | | | | | |
| | OD等に係る環境基準類型 | | A 1 | | | | | A 1 | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 備讃瀬戸(ロ) | | | | | 備讃瀬戸(口) | | | | | |
| 全 | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | II イ | | | | | II イ | | | | | |
| 水 | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | ı | 備讃瀬戸(全地 | 或) | | | | 備讃瀬戸(イ) | | | | | |
| | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境 | | 生物A イ | | | | | 生物特A | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係 | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境 | 竞基準類型 | | 左目 | 細木 / | ∠ 🖂 | | | 左 門 部 7 | セ L 団 | (丰屋) | | |
| <u>ii/ii</u> | <u> </u> 査名 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | 調査 🛭 | 最大 | m/n | 平均 | 年間調3 | 至 上層 | 最大 | , | n/n |
| | 流量 | m3/S | T-80 | 取小 | | 取八 | 111/11 | T*0 | 取小 | | 取八 | <u> </u> | 11/ 11 |
| | pH | mo, b | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.5* | 3 / 36 | 8.2 | 7.9 | ~ | 8.5* | 1 | / 12 |
| | DO | mg/L | 9.1 | 5.7* | ~ | 12 | 4 / 24 | 8.7 | 5.9* | ~ | 10 | 2 | / 12 |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.6* | 1.5 | \sim | 4.7* | 17 / 36 | 3.0* | 1.9 | \sim | 6.1* | 9 | / 12 |
| 1- | (75%値) | mg/L | (3.3*) | | | | | (3.2*) | | | | | |
| 般西 | SS | mg/L | 3 | <1 | \sim | 8 | 0 / 36 | 4 | 2 | \sim | 8 | 0 | / 12 |
| 項目 |) C100 ELL 9/C | CFU/100mL | 3 | <1 | ~ | 15 | 0 / 12 | 4 | <1 | ~ | 18 | 0 | / 12 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 | / 12 |
| | 全 全 体 | mg/L mg/L | 0.34* 0.035* | 0.15 0.021 | ~ | 0.69* | 13 / 24 | 0.36* 0.046* | 0.18 0.022 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 0.75* 0.15* | 5 6 | / 12 |
| | 全亜鉛 | mg/L mg/L | ₩.₩.₩ | 0.021 | . ~ | 0.000≉ | 14 / 44 | U.U±U® | 0.022 | . ~ | ∪.1∂* | U | / 12 |
| | 上 里 町 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 6.6 | 2.4 | ~ | 9.9 | 0 / 12 | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 / 1 | < 0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | 0 | / 1 |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | \sim | <0.1 | 0 / 1 | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 | / 1 |
| | 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 1 | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 1 |
| | 六価クロム | mg/L | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 1 | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 | / 1 |
| | 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 / 1 | <0.005 | <0.005 | \sim | <0.005 | 0 | / 1 |
| | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 / 1 | <0.0005 | <0.0005 | \sim | <0.0005 | 0 | / 1 |
| | アルキル水銀 PCB | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 健康 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| É | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チウラム シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 1 | 0.02 | 0.02 | \sim | 0.02 | 0 | / 1 |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | - | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| _ | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 特 | 銅 24. 25.67.14. | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄_溶解性 マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | - | |
| 月 | マンガン」俗解性 クロム | mg/L mg/L | - | | | | | | | | | | |
| H | 塩素イオン | mg/L | 16700 | 14200 | ~ | 18300 | - / 12 | 15300 | 7470 | ~ | 17800 | - | / 12 |
| | 有機態窒素 | mg/L | | | | | , 12 | 1- | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | 2.0 | 1.4 | \sim | 2.8 | - / 4 | 1.8 | 1.4 | \sim | 2.6 | - | / 4 |
| その | , | mg/m3 | | | | | | | | | | | |
| の他 | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | | |
| 他項1 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | |
| 目 | 温度 しいロスケックト 中半 | 度 | | | | | | | | | | | |
| l | トリハロメタン生成能 4-t-オクチルフェノール | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4-t-オクナルノェノール アニリン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | |
| ĺ | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域 | | Maria | <u></u> | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |

| _ | | | L | | 、貝 | | | T | | | | (2024 年度) |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------|--------|--------|----------------|-------------------|---------|--------|-------|-----------|
| | 系名 | | 備讃瀬戸 | A ## | | | | 備讃瀬戸 | 1 A 3P | | | |
| - | 定機関 | | 福山市環境保 36000004 (609 | | | | | 福山市環境係 3600004(60 | | | | |
| _ | 定地点番号 | | | 9-52) | | | | | 19-52) | | | |
| _ | 定地点名 DD等に係るあてはめ水域名 | | 備讃瀬戸4 備讃瀬戸 | | | | | 備讃瀬戸4 備讃瀬戸 | | | | |
| | DD等に係るめてはめ水吸名 DD等に係る環境基準類型 | | 個貨測尸 A イ | | | | | 偏韻測尸 A イ | | | | |
| | SDをに示る原現基準類至 窒素・全燐に係る水域名 | A イ 備讃瀬戸(ロ) | | | | | A 1 備讃瀬戸(ロ) | | | | | |
| _ | 全窒素・全燐に係る水吸石 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | | 加頭機戸(ロ) | | | | | 畑頑㈱戸(ロ) | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 備讃瀬戸(イ) | | | | | 備讃瀬戸(イ) | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | | 生物特A | | | | | 生物特A | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係るか | | | | | | | | | | | |
| 水生 | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | 準類型 | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | | 調査中 | 中層 | | | 年間 | 間調査 下 | 層 | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n |
| | | m3/S | 0.1 | | | | 0 / 10 | 0.1 | | | 0.5 | |
| | pH | /* | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.3 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.5* | 1 / 12 |
| | | mg/L | 8.5 | 5.3* | ~ | 10 | 2 / 12 | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 2.7* | 1.8 | ~ | 5.3* | 7 / 12 | 2.8* | 1.7 | ~ | 5.8* | 9 / 12 |
| | | mg/L | (3.2*) | 1.0 | | J.J** | 1 / 12 | (2.7*) | 1.1 | | J.0** | 9 / 12 |
| 船 | | mg/L | 3 | 1 | ~ | 5 | 0 / 12 | 5 | 1 | ~ | 8 | 0 / 12 |
| 項 | | CFU/100mL | | - | | | , 12 | | - | | | , 15 |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 0.28 | 0.16 | ~ | 0.61* | 2 / 12 | | | | | |
| | | mg/L | 0.035* | 0.022 | ~ | 0.057* | 7 / 12 | | | | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | l | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | 8.2 | 5.3 | ~ | 11 | 0 / 12 |
| COO 空室生生生含 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | l | mg/L | | | | | | | | | | |
| | l | mg/L | | | | | + | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 康頂 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | - | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | + | | | | | |
| | l | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 殊 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 項 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 日 | | mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | l | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| 7 | l | mg/L | | | | | | | | | | |
| ての | | ng/m3 | | | | | | | | | | |
| 他 | | μS/cm | | | | | - | | | | | |
| 項目 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | + | | | | | |
| Ħ | | 度 mg/L | | | | | 1 | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| 1 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | |
| | | 囲g/ L 圏/100mL | | | | | | | | | | |
| ш | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | L 併上づまファした。 | | | | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | 貝 | | | | | | | (2024 年度) | | |
|--------------|--|------------------|---|---------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|--|
| | 系名 | | 備讃瀬戸 | A am | | | | 備讃瀬戸 | A am | | | | | |
| _ | 定機関 | | 福山市環境保 | | | | | 福山市環境保 | | | | | | |
| _ | 定地点番号 | | 36000004 (609 | 9-52) | | | | 36000012 (60 | 9-01) | | | | | |
| _ | 圧地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 備讃瀬戸4 備讃瀬戸 | | | | | 備讃瀬戸12 備讃瀬戸 | | | | | | |
| _ | OD等に係る環境基準類型 | | *************************************** | | | | | 21000 | | | | | | |
| 全窒素・全燐に係る水域名 | | | A 7 備讃瀬戸(ロ) | Aイ ※ Aイ i讃瀬戸(ロ) 備讃瀬戸(ロ) | | | | | | | | | | |
| _ | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅱイ | | | | | ※ II イ | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 備讃瀬戸(イ) | | | | | 備讃瀬戸(全地 | む) | | | | | |
| _ | 主主物の主念状況の適応性に係る係る環境基 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 淮稻刑 | 生物特A | | | | | 開頭(根) *(主) ※ 生物A イ | 以/ | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | | 工49/477 | | | | | ★ 上物/(1-1 | | | | | | |
| _ | 主生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | 2XI | | 年間 | 調査 🛭 | ·層 | | | 年間調査 | 5 上層 | (表層) | | | |
| - | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | .,,,, | | | |
| | рН | | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.5* | 2 / 36 | 8.1 | 8.0 | \sim | 8.2 | 0 / 12 | | |
| | DO | mg/L | 8.6 | 5.3* | \sim | 10 | 4 / 24 | 8.4 | 6.4* | \sim | 10 | 2 / 12 | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.9* | 1.7 | \sim | 6.1* | 25 / 36 | 2.1* | 1.6 | \sim | 3.4* | 7 / 12 | | |
| _ | (75%値) | mg/L | (3.6*) | | | | | (2.2*) | | | | | | |
| | SS | mg/L | 4 | 1 | \sim | 8 | 0 / 36 | 2 | <1 | \sim | 8 | 0 / 12 | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100mL | 4 | <1 | \sim | 18 | 0 / 12 | 1 | <1 | \sim | 3 | 0 / 12 | | |
| П | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 / 12 | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.32* | 0.16 | ~ | 0.75* | 7 / 24 | 0.16 | 0.10 | \sim | 0.28 | 0 / 12 | | |
| Ì | 全燐 | mg/L | 0.041* | 0.022 | \sim | 0.15* | 13 / 24 | 0.026 | 0.016 | \sim | 0.045* | 3 / 12 | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | <0.001 | <0.001 | ~ | <0.001 | 0 / 4 | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | ~ | <0.00006 | 0 / 4 | | |
| | | mg/L | 0.0 | F.C. | | 11 | 0 / 10 | <0.0006 | <0.0006 | \sim | <0.0006 | 0 / 4 | | |
| H | 底層溶存酸素量 | mg/L | 8.2 | 5.3 | ~ | /0.0002 | 0 / 12 | /0.0000 | /0.0000 | | /0.0000 | 0 / 0 | | |
| | カドミウム 全シアン | mg/L mg/L | <0.0003 <0.1 | <0.0003 <0.1 | ~ | <0.0003 <0.1 | 0 / 1 | <0.0003 <0.1 | <0.0003 <0.1 | ~ | <0.0003 <0.1 | 0 / 2 | | |
| | | | <0.005 | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 1 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 <0.01 | 0 / 2 | | |
| | | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 1 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | |
| | 総水銀 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 1 | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | (0.0003 | ₹0.0005 | | ₹0.0005 | 0 / 1 | (0.0005 | \0.0003 | | ₹0.0005 | 0 / 2 | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | ~ | < 0.0005 | 0 / 1 | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | 101000 | 10.0000 | | (0.0000 | 0 / 1 | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 康 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| _ | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| Ì | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| Ì | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| Ì | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| Ì | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.02 | 0.02 | \sim | 0.02 | 0 / 1 | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 1 | | |
| 1 | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 殊 | | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン_溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1-1 | クロム | mg/L | 15000 | 5.45° | | 15000 | / | 17100 | 10100 | | 10000 | / | | |
| 1 | 塩素イオン | mg/L | 15300 | 7470 | ~ | 17800 | - / 12 | 17100 | 16100 | \sim | 18300 | - / 12 | | |
| Ì | 有機態窒素 アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | が が が を に が を に が に に に に に に に に に に に に に | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | が TOC | mg/L | 1.8 | 1.4 | ~ | 2.6 | - / 4 | 1.6 | 1.4 | ~ | 1.7 | - / 4 | | |
| マ | クロロフィルa | mg/L mg/m3 | 1.0 | 1.4 | . ~ | 2.0 | / 4 | 3.1 | <0.5 | $\frac{\sim}{\sim}$ | 6.1 | - / 4 | | |
| の | 電気伝導度 | μS/cm | 1 | | | | | J.1 | √υ.∂ | - | 0.1 | / 1 | | |
| 他 | 电気伝導及 メチレンブルー活性物質 | μ S/CIII mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 測 | 濁度 | mg/L 度 | | | | | | | | | | | | |
| Ħ | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | + | | | | | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の | | 単上ポナファしナ | | | | 1 | L | L | | | 1 | | |

| | | | | | | | | 10 10 | | | | (2024年度) | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-------|--------|---|--------|------------|--------|--------|------|----------|--|--|--|
| 測定機関測定地点番号 | | | 備讃瀬戸 | A | | | | 備讃瀬戸 | | | | | | | |
| | | | 福山市環境保 | | | | | 福山市環境保全課 | | | | | | | |
| _ | | | 36000012 (609 | 9-01) | | | | |)9-01) | | | | | | |
| | 定地点名 OD等に係るあてはめ水域名 | | 備讃瀬戸12 | | | | | | | | | | | | |
| | DD等に係るめてはめ水域名 DD等に係る環境基準類型 | 備讃瀬戸 | | | | | | | | | | | | | |
| | 空素・全燐に係る水域名 | ※ Aイ 備讃瀬戸(ロ) | | | | | | | | | | | | | |
| | 室素・全燐に係る環境基準類型 | | 開頭(現) *(ロ) ※ Ⅱ イ | | | | | | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | 備讃瀬戸(全坂 | t) | | | | | 版) | | | | | | | |
| _ | 主生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | ※ 生物A イ | A) | | | | | ****/ | | | | | | | |
| | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | X 140/11-1 | | | | | X 1.40/1.1 | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 查名 | | | 年間 | 調査「 | 中層 | | | 年間 | 間調査 下 | 層 | | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | m/n | | | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | | 8.1 | 8.0 | ~ | 8.2 | 0 / 12 | 8.1 | 7.9 | \sim | 8.2 | 0 / 12 | | | |
| | DO | mg/L | 8.3 | 6.4* | \sim | 10 | 3 / 12 | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | (75%値) 1 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 2.1* | 1.4 | \sim | 2.8* | 7 / 12 | | 1.3 | \sim | 3.0* | 5 / 12 | | | |
| - | - | mg/L | (2.2*) | | | | | (2.2*) | | | | | | | |
| 般 | - | mg/L | 2 | 1 | ~ | 6 | 0 / 12 | 3 | 1 | ~ | 4 | 0 / 12 | | | |
| 項目 | 5 47205 plan 554 | FU/100mL | | | | | | | | 間調査 下層 | | | | | |
| Н | | mg/L | 0.17 | 0.00 | | 0.00 | 0 / 1- | | | | | | | | |
| | | mg/L | 0.15 | 0.09 | ~ | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | 0.025 | 0.015 | ~ | 0.043* | 2 / 12 | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 7.9 | 9.4 | | 10 | 0 / 10 | | | |
| - | | mg/L mg/L | | | | | | 1.2 | 5.4 | ~ | 10 | 0 / 12 | | | |
| 健康 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | - | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | - | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン 1 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | 36000012(609-01) 備讃瀬戸12 備讃瀬戸12 備讃瀬戸 | | | | | | | | | |
| | チウラム 1 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | - | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| - | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 殊項 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| - | | mg/L mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| そ | | ng/m3 | | | | | | | | | | | | | |
| の | | ι S/cm | | | | | | | | | | | | | |
| 他項 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 月日 | 濁 度 | 度 | | | | | | | | | | | | | |
| [| | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1/100mL | | | | | | | | | | | | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | 培甘》 | 伸上づたファした。 | =+ | | | | • | | | | | | | |

| | T 10 | | | | | | | | | | | (2024 | 1 年度 | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|----------|--------|----------|-------|------|--|--|
| 水系名 測定機関 測定地点番号 | | | 備讃瀬戸 | △細 | | | | 備讃瀬戸 | | | | | | | |
| | | | 福山市環境保 36000012(60 | | | | | 福山市環境保全課 36000013 (609-53) | | | | | | | |
| | 定地点名 | 備讃瀬戸12 | 9-01) | | | | | | | | | | | | |
| _ | DD等に係るあてはめ水域名 | 備讃瀬戸 | | | | | 備讃瀬戸13 備讃瀬戸 | | | | | | | | |
| | DD等に係る環境基準類型 | M i i i i i i i i i i i i i i i i i i | | | | | | | | | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | | 備讃瀬戸(ロ) | | | | | 備讃瀬戸(ロ) | | | | | | | |
| | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | ※ Ⅱ イ | | | | | Пイ | | | | | | | |
| - | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 備讃瀬戸(全地 | 或) | | | | 備讃瀬戸(イ) | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基 | 準類型 | ※ 生物A イ | | | | | ※ 生物特A | | | | | | | |
| 水: | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る | 水域名 | | | | | | | | | | | | | |
| 水生 | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基 | 基準類型 | | | | | | | | | | | | | |
| 調 | 查名 | | | 年間 | 調査 🕯 | è層 | | | 年間調査 | £ 上層 | (表層) | | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m | /n | | |
| | 流量 | m3/S | 0.4 | | | | | 0.1 | | | | | | | |
| l | pH | /* | 8.1 | 7.9 | ~ | 8.2 | 0 / 36 | 8.1 | 8.1 | ~ | 8.2 | 0 . | / 4 | | |
| | BOD | mg/L | 8.4 | 6.4* | \sim | 10 | 5 / 24 | 8.0 | 6.2* | \sim | 9.1 | 1 . | / 4 | | |
| | (75%値) | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.1* | 1.3 | ~ | 3.4* | 19 / 36 | 1.9 | 1.8 | ~ | 2.1* | 1 | / 4 | | |
| | (75%値) | mg/L mg/L | (2.2*) | 1.0 | - | J.47 | 10 / 00 | (1.9*) | 1.0 | - | 4.17 | 1 | , 4 | | |
| 卯 | SS SS | mg/L | 2 | <1 | ~ | 8 | 0 / 36 | 2 | <1 | ~ | 4 | 0 | / 4 | | |
| 項 | 大腸菌数 | CFU/100mL | 1 | <1 | ~ | 3 | 0 / 12 | <1 | <1 | ~ | <1 | 0 | / 4 | | |
| 目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 / 12 | <0.5 | <0.5 | ~ | <0.5 | 0 | / 4 | | |
| | 全窒素 | mg/L | 0.16 | 0.09 | ~ | 0.28 | 0 / 24 | 0.12 | 0.08 | \sim | 0.16 | 0 . | / 4 | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.026 | 0.015 | \sim | 0.045* | 5 / 24 | 0.021 | 0.016 | \sim | 0.034* | 1 . | / 4 | | |
| | 全亜鉛 | mg/L | <0.001 | <0.001 | ~ | <0.001 | 0 / 4 | 0.001 | <0.001 | \sim | 0.001 | 0 . | / 4 | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | \sim | <0.00006 | 0 / 4 | <0.00006 | <0.00006 | \sim | <0.00006 | 0 . | / 4 | | |
| 1 ml J. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | LAS | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | ~ | <0.0006 | 0 / 4 | <0.0006 | <0.0006 | \sim | <0.0006 | 0 . | / 4 | | |
| | 底層溶存酸素量 | mg/L | 7.2 | 3.4 | \sim | 10 | 0 / 12 | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | \sim | <0.0003 | 0 / 2 | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | <0.1 | <0.1 | ~ | <0.1 | 0 / 2 | | | | | | | | |
| | <u>鉛</u> 六価クロム | mg/L | <0.005 <0.01 | <0.005 <0.01 | ~ | <0.005 <0.01 | 0 / 2 | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L mg/L | <0.01 | <0.01 | ~ | <0.01 | 0 / 2 | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L mg/L | <0.005 | <0.005 | ~ | <0.005 | 0 / 2 | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | 10.0000 | \0.000J | - | \0.0000 | 0 / 2 | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ~ | <0.0005 | 0 / 1 | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | , - | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| Irch | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン 1.2 3 5 カコロープロ ペン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.01 | <0.01 | \sim | <0.01 | 0 / 1 | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 特 | 銅 24 次5年2月 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 殊項 | 鉄、溶解性 マンダン 変解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 月 | マンガン_溶解性 クロム | mg/L mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/L | 17100 | 16100 | ~ | 18300 | - / 12 | 16700 | 15800 | ~ | 17600 | _ | / 4 | | |
| | 有機能窒素 | mg/L | 2,100 | 10100 | | 10000 | , 12 | 10.00 | 10000 | | 11000 | | , т | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 燐酸態燐 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | mg/L | 1.6 | 1.4 | \sim | 1.7 | - / 4 | 1.6 | 1.5 | \sim | 1.6 | | / 4 | | |
| その | クロロフィルa | mg/m3 | 3.1 | <0.5 | \sim | 6.1 | - / 7 | 1.0 | 0.5 | \sim | 1.5 | - | / 4 | | |
| | 電気伝導度 | μ S/cm | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | メチレンブルー活性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| C全全水水水水調 一般項目 機項目 機康項目 特殊項目 特殊項目 その他項目 | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | 1 | | | | , | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | \sim | | | / 1 | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | 1 | <0.002 | <0.002 | \sim | <0.002 | | / 1 | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | ~ | <0.0003 | | / 1 | | |
| | ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | (202 | 4年 | 度) | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------|--------|-----|---------|----------------------------|---------------------|--------|----------------|----------|-----|----|--|
| 測定機関測定地点番号 | | | 備讃瀬戸 | A | | | 備讃瀬戸 | | | | | | | | |
| | | | 福山市環境保 | | | | | 福山市環境保全課 36000013 (609-53) | | | | | | | |
| | | | 36000013 (609 | 9-53) | | | | | | | | | | | |
| 例定地点名 COD等に係るあてはめ水域名 | | | 備讃瀬戸13 | | | | | 備讃瀬戸13 | | | | | | | |
| COD等に係るめてはの水域名 COD等に係る環境基準類型 | | | 備護瀬戸 Aイ Aイ | | | | | | | | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る水域名 | 備讃瀬戸(ロ) | | | | | 備讃瀬戸(ロ) | | | | | | | | |
| _ | 窒素・全燐に係る環境基準類型 | | Ⅱイ | | | | | Ⅲ は イ | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る水域名 | | 備讃瀬戸(イ) | | | | | # 1 1 1 (イ) | | | | | | | |
| _ | 生生物の生息状況の適応性に係る係る環境基準 | 生 類型 | ※ 生物特A | | | | | ※ 生物特A | , | | | | | | |
| _ | 生生物の生息・再生産する場の適応性に係る水 | | W T101011 | | | | | X 工物和11 | | | | | | | |
| | 上生物の生息・再生産する場の適応性に係る環境基準 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 查名 | | | 年間 | 調査下 | 層 | | | 年間 | 調査 🛭 | è層 | | | | |
| | 測定項目 | 単位 | 平均 | 最小 | \sim | 最大 | m/n | 平均 | 最小 | ~ | 最大 | n | n/n | | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | pH | | | | | | | 8.1 | 8.1 | \sim | 8.2 | 0 | / | 4 | |
| | DO | mg/L | | | | | | 8.0 | 6.2* | \sim | 9.1 | 1 | / | 4 | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | 1.9 | 1.8 | \sim | 2.1* | 1 | / | 4 | |
| | | mg/L | | | | | | (1.9*) | | | | | | | |
| 般 | | mg/L | | | | | | 2 | <1 | \sim | 4 | 0 | _ | 4 | |
| 項目 | - 1.255 p. 251 | FU/100mL | | | | | | <1 | <1 | \sim | <1 | 0 | | 4 | |
| H | 11一ペイリン抽山初貝_佃刀寺 | mg/L | | | | | 1 | <0.5 | <0.5 | \sim | <0.5 | 0 | _ | 4 | |
| | | mg/L | | | | | 1 | 0.12 | 0.08 | ~ | 0.16 | 0 | _ | 4 | |
| | | mg/L | | | | | 1 | 0.021 | 0.016 | ~ | 0.034* | 1 | | 4 | |
| | <u> </u> | mg/L | | | | | 1 | 0.001 <0.00006 | <0.001 | ~ | 0.001 | 0 | | 4 | |
| | | mg/L | | | | | | <0.0006 <0.006 | <0.00006 <0.0006 | ~ | <0.00006 | 0 | _ | 4 | |
| | | mg/L | 6.9 | 4.4 | ~ | 0.0 | 0 / 4 | 6.9 | <0.0006 4.4 | ~ | <0.0006 9.0 | 0 | _ | 4 | |
| - | | mg/L mg/L | 0.9 | 4.4 | ~ | 9.0 | 0 / 4 | 0.9 | 4.4 | ~ | 9.0 | U | / | 4 | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 健 | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 康項 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| 月目 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | _ | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | 1 | | | | | <u> </u> | | | |
| 特 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 殊頃 | 鉄、溶解性 | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 月日 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Ë | | mg/L | | | | | | 16700 | 15000 | ~ | 17600 | - | / | 4 | |
| | | mg/L mg/L | | | | | | 10100 | 15800 | ~ | 17600 | - | / | 4 | |
| | <u> </u> | mg/L mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | mg/L mg/L | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | + | 1.6 | 1.5 | ~ | 1.6 | - | / | 4 | |
| そ | | ng/m3 | | | | | + | 1.0 | 0.5 | ~ | 1.5 | _ | _ | 4 | |
| の | | μ S/cm | | | | | + | 1.0 | 0.0 | | 1.0 | | , | - | |
| 他區 | | mg/L | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 項日 | 濁度 | 度 | | | | | + | | | | | | | | |
| П | | mg/L | | | | | + | | | | | | | | |
| | | mg/L | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | ~ | <0.00003 | _ | / | 1 | |
| l | | mg/L | | | | | | <0.002 | <0.002 | ~ | <0.002 | - | _ | 1 | |
| | | mg/L | | | | | 1 | <0.002 | <0.002 | ~ | <0.002 | _ | | 1 | |
| | | 周/100mL | | | | | | | | | | | - | | |
| | 備考: 環境基準類型の「※」印は各水域の環 | | 年上づたファルナ. | ニナ | | | 1 | 1 | 1 | | | | | _ | |