


「広島県病害虫発生予察調査データ」

令和7年度 フェロモントラップ等調査結果(南東部・南西部)

チャノキイロアザミウマ (黄色粘着板)

トラップ調査結果

(1) グラフ



(2)調査データ

地帯区分		南東部			南西部		
設置場所		尾道市瀬戸田町			呉市倉橋町		
周辺作物		かんきつ			かんきつ		
月	半旬	本年	平均(6年)	前年	本年	平均(5年)	前年
5月	1	—	3.4	6.0	—	0.3	0
	2	—	3.6	7.1	—	0.7	0.9
	3	—	3.3	2.9	—	1.1	1.1
	4	—	6.4	0	—	2.6	0
	5	—	4.9	1.3	—	2.9	1.7
	6	—	3.6	2.3	—	3.9	2.6
6月	1	0.8	1.9	1.4	5.0	4.3	2.3
	2	0.8	2.0	0.8	5.0	7.4	2.9
	3	0.5	3.0	0.2	5.0	12.9	2.9
	4	0.4	3.6	1.6	7.0	18.8	19.7
	5	0.4	2.1	7.9	7.0	22.1	45.0
	6	0.4	2.3	3.3	7.0	29.7	70.0
7月	1	0.4	3.4	1.3	2.5	20.9	28.9
	2	0.4	3.3	0	2.5	14.1	4.9
	3	1.8	2.8	1.4	2.5	8.3	18.6
	4	1.8	3.6	1.9	1.3	6.0	9.4
	5	2.4	3.9	2.1	1.0	5.2	9.4
	6	5.6	6.0	2.6	1.2	4.4	13.0
8月	1	4.6	9.4	2.9	6.0	2.3	0.7
	2	5.9	14.2	10.1	6.0	4.0	4.7
	3	6.8	18.2	14.4	6.0	4.2	4.9
	4	6.8	24.9	12.1	4.7	2.6	3.6
	5	5.1	32.1	33.3	4.7	3.3	7.9
	6	5.6	35.9	24.9	5.6	3.1	6.6
9月	1	3.8	27.3	3.4	5.3	1.7	2.9
	2	0.4	10.5	5.6	5.3	0.5	0.7
	3	0.4	10.2	2.8	5.3	0.7	0
	4	0.6	7.3	1.1	1.7	1.0	1.3
	5	1.1	5.0	1.4	1.7	1.0	2.0
	6	1.1	4.5	0.7	1.7	1.3	1.4
10月	1		4.1	0.7		1.4	1.8
	2		3.0	0.7		0.9	1.5
	3		1.1	0.7		0.9	0
	4		1.2	0.7		0.3	0
	5		1.2	1.9		0.2	0
	6		1.1	4.5		0.3	0