## 広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の インフルエンザの流行状況について


広島県西部保健所

広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の定点医療機関等におけるインフルエンザ患者数等の状況は、次のとおりです。

(令和7年45週)

インフルエンザ定点医療機関において1週間に診断された患者数です。

(人) 全国 西部保健所(大竹市・廿日市市) 広島県 期 間 患者数 定点当たり 患者数 定点当たり 患者数 定点当たり 7年45週(11/3~11/9) 44 8.80 871 9.27 84,183 21.82 7年44週(10/27~11/2) 14.90 17 3.40 348 3.70 57,424 7年43週(10/20~10/26) 2 0.40 190 24.276 2.02 6.29 7年42週(10/13~10/19) 1 0.20 12,576 3.26 92 0.98



- ※ 感染症発生動向調査に基づいて作成したものです。
  - 〇 インフルエンザの感染経路

【飛沫感染】感染者の咳やくしゃみの「しぶき」を吸い込むなど

【接触感染】汚染されたドアノブや机などに手が触れ、その手で口、鼻などに触れるなど

- 〇 感染拡大防止のための注意点
- 《 流水と石けんでこまめに手洗いをしましょう。》 外から帰ってきた時など、こまめに流水と石けんで手洗いを励行しましょう。
- **《 咳エチケットを守りましょう。》** 咳やくしゃみの症状がある方は、咳エチケットを守りましょう。
- 《 予防接種を受けましょう。》 流行前に予防接種を受けましょう。ウイルスが侵入してきても、予防接種をしていれ
- ☆ 症状などからインフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- ☆ 厚生労働省が、「インフルエンザQ&A」を作成していますので、参考にしてください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/(