




令和7年度 フェロモントラップ調査結果(ハスモンヨトウ)

※調査データはグラフの下にあります。






調査データ

[illegible]

令和7年度 フェロモントラップ調査結果(ハスモンヨトウ)

※調査データはグラフの下にあります。



調査データ

地帯区分		南東部			中東部			中東部		
設置場所		福山市新市町			世羅町山中福田			三次市廻神町		
周辺作物		アスパラガス			ねぎ			だいず		
月	半旬	本年	平年	前年	本年	平均(8年)	前年	本年	平均(0年)	前年
5月	1	0	0.4	0.0	0	1.6	0	1	-	-
	2	0.9	0.6	0.0	0	2.4	0	1	-	-
	3	2.1	0.7	0.0	0	4.6	1.0	2	-	-
	4	7.1	2.1	6.4	0	8.8	2.5	8	-	-
	5	6.7	3.1	4.7	0	19.0	1.8	18	-	-
	6	6.6	3.6	3.7	1.1	16.1	3.9	23	-	-
6月	1	7.1	3.2	4.3	4.5	8.7	2.3	10	-	-
	2	6.4	4.0	10.0	9.0	7.4	2.5	4	-	-
	3	15.9	5.7	13.4	26.4	9.3	5.7	25	-	-
	4	23.0	7.3	17.6	72.4	16.0	27.1	87	-	-
	5	26.4	10.5	25.0	76.7	21.7	39.1	66	-	-
	6	24.1	18.6	23.3	40.7	31.4	30.0	84	-	-
7月	1	33.9	17.8	18.6	19.6	46.1	49.4	72	-	-
	2	49.3	17.8	12.1	30.6	53.0	56.3	179	-	-
	3	63.6	16.9	26.4	55.0	57.4	59.3	103	-	-
	4	46.9	21.9	36.3	25.0	46.1	36.4	51	-	-
	5	34.4	27.6	49.4	32.3	48.4	24.4	35	-	-
	6	35.3	44.7	90.9	51.8	57.3	48.3	66	-	-
8月	1	55.2	60.9	100.7	116.7	54.0	87.9	100	-	-
	2	90.2	74.7	87.0	87.9	85.1	15.0	219	-	-
	3	97.9	78.9	84.9	59.1	150.2	94.7	176	-	-
	4	52.1	80.3	112.9	38.8	188.2	133.6	66	-	-
	5	97.9	98.0	75.7	87.5	171.3	76.4	108	-	-
	6	125.1	154.3	75.4	204.3	235.7	281.0	165	-	-
9月	1	102.3	154.6	60.6	150.3	167.3	248.1	264	-	-
	2	114.3	159.7	65.7	109.4	164.3	196.9	194	-	-
	3	64.6	130.5	103.4	190.7	169.9	38.6	195	-	-
	4	70.4	123.8	117.1	216.9	177.9	138.6	290	-	-
	5	97.9	124.6	123.6	237.4	162.3	126.6	255	-	-
	6	59.3	82.0	76.4	250.0	103.8	71.3	385	-	-
10月	1	70.6	101.3	66.1	219.6	122.1	33.1	399	-	-
	2	78.1	104.7	56.3	138.7	131.7	68.7	423	-	-
	3	35.0	73.1	44.3	85.6	112.4	136.4	506	-	-
	4	88.7	68.3	47.7	149.7	102.1	120.0	470	-	-
	5	83.0	58.4	55.7	122.3	97.2	135.9	346	-	-
	6	7.1	52.7	74.7	58.0	89.6	117.1	133	-	-
11月	1	3.1	-	-	4	-	-	29	-	-
	2	7.1	-	-	1.0	-	-	29	-	-
	3	10.0	-	-		-	-	63	-	-
	4	16.4	-	-		-	-		-	-
	5		-	-		-	-		-	-
	6		-	-		-	-		-	-