

# 広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の インフルエンザの流行状況について


広島県西部保健所

広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の定点医療機関等におけるインフルエンザ患者数等の状況は、次のとおりです。  
(令和8年第5週)

インフルエンザ定点医療機関において1週間に診断された患者数です。

(人)

期 間	西部保健所(大竹市・廿日市市)		広島県		全国	
	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり
令和8年第5週(1/26～2/1)	22	4.40	1,479	15.90	114,291	30.03
令和8年第4週(1/19～1/25)	17	3.40	841	9.04	63,326	16.64
令和8年第3週(1/12～1/18)	19	3.80	795	8.55	43,027	11.33
令和8年第2週(1/5～1/11)	17	3.40	889	9.56	39,996	10.54



※ 感染症発生動向調査に基づいて作成したものです。

- インフルエンザの感染経路
  - 【飛沫感染】感染者の咳やくしゃみの「しぶき」を吸い込むなど
  - 【接触感染】汚染されたドアノブや机などに手が触れ、その手で口、鼻などに触れるなど
- 感染拡大防止のための注意点
  - 《 流水と石けんでこまめに手洗いをしましょう。》  
外から帰ってきた時など、こまめに流水と石けんで手洗いを励行しましょう。
  - 《 咳エチケットを守りましょう。》  
咳やくしゃみの症状がある方は、咳エチケットを守りましょう。
  - 《 予防接種を受けましょう。》  
流行前に予防接種を受けましょう。ウイルスが侵入してきても、予防接種をしていれば

☆ 症状などからインフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

☆ 厚生労働省が、「インフルエンザQ&A」を作成していますので、参考にしてください。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/influenza/Q](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/influenza/Q)