

# 広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の インフルエンザの流行状況について

広島県西部保健所


広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の定点医療機関等におけるインフルエンザ患者数等の状況は、次のとおりです。

(令和8年第8週)

インフルエンザ定点医療機関において1週間に診断された患者数です。

(人)

期 間	西部保健所(大竹市・廿日市市)		広島県		全国	
	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり
令和8年第8週(2/16~2/22)	64	12.80	2,556	27.48	131,200	34.54
令和8年第7週(2/9~2/15)	49	9.80	2,642	28.41	157,713	41.44
令和8年第6週(2/2~2/8)	43	8.60	2,344	25.20	164,744	43.34
令和8年第5週(1/26~2/1)	22	4.40	1,479	15.90	114,291	30.03



※ 感染症発生動向調査に基づいて作成したものです。

## ○ インフルエンザの感染経路

【飛沫感染】 感染者の咳やくしゃみの「しぶき」を吸い込むなど

【接触感染】 汚染されたドアノブや机などに手が触れ、その手で口、鼻などに触れるなど

## ○ 感染拡大防止のための注意点

《 流水と石けんでこまめに手洗いをしましょう。》

外から帰ってきた時など、こまめに流水と石けんで手洗いを励行しましょう。

《 咳エチケットを守りましょう。》

咳やくしゃみの症状がある方は、咳エチケットを守りましょう。

《 予防接種を受けましょう。》

流行前に予防接種を受けましょう。ウイルスが侵入してきても、予防接種をしていれ

☆ 症状などからインフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

☆ 厚生労働省が、「インフルエンザQ&A」を作成していますので、参考にしてください。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuleza/Q](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuleza/Q)