

広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)のインフルエンザの流行状況について


広島県西部保健所

広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の定点医療機関等におけるインフルエンザ患者数等の状況は、次のとおりです。
(令和8年第12週)

インフルエンザ定点医療機関において1週間に診断された患者数です。

(人)

| 期 間 | 西部保健所(大竹市・廿日市市) | | 広島県 | | 全国 | |
|---------------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 患者数 | 定点当たり | 患者数 | 定点当たり | 患者数 | 定点当たり |
| 令和8年第12週(3/16~3/22) | 30 | 6.00 | 913 | 9.82 | 37,043 | 9.75 |
| 令和8年第11週(3/9~3/15) | 54 | 10.80 | 1,032 | 11.10 | 44,322 | 11.66 |
| 令和8年第10週(3/2~3/8) | 89 | 17.80 | 1,299 | 13.97 | 54,516 | 14.33 |
| 令和8年第9週(2/23~3/1) | 66 | 13.20 | 1,902 | 20.45 | 86,175 | 22.66 |



※ 感染症発生動向調査に基づいて作成したものです。

○ インフルエンザの感染経路

【飛沫感染】 感染者の咳やくしゃみの「しぶき」を吸い込むなど

【接触感染】 汚染されたドアノブや机などに手が触れ、その手で口、鼻などに触れるなど

○ 感染拡大防止のための注意点

《 流水と石けんでこまめに手洗いをしましょう。》

外から帰ってきた時など、こまめに流水と石けんで手洗いを励行しましょう。

《 咳エチケットを守りましょう。》

咳やくしゃみの症状がある方は、咳エチケットを守りましょう。

《 予防接種を受けましょう。》

流行前に予防接種を受けましょう。ウイルスが侵入してきても、予防接種をしていれ

☆ 症状などからインフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

☆ 厚生労働省が、「インフルエンザQ&A」を作成していますので、参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuleza/Q