野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1	R3.6.29	尾道市	雌	捕獲	成獣	80	35	R3.7.1	陰性
2	R3.7.5	三原市	雄	捕獲	成獣	100	40	R3.7.8	陰性
3	R3.7.5	三原市	雌	捕獲	成獣	80	20	R3.7.8	陰性
4	R3.7.5	三原市	雄	捕獲	幼獣	30	3	R3.7.8	陰性
5	R3.7.5	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	10	R3.7.8	陰性
6	R3.7.5	三原市	未確認	捕獲	幼獣	60	5	R3.7.8	陰性
7	R3.7.5	三原市	未確認	捕獲	幼獣	60	5	R3.7.8	陰性
8	R3.7.5	三原市	未確認	捕獲	幼獣	60	5	R3.7.8	陰性
9	R3.7.5	福山市	雌	捕獲	幼獣	50	3	R3.7.8	陰性
10	R3.7.6	三原市	雄	捕獲	成獣	85	25	R3.7.9	陰性
11	R3.7.6	三原市	雄	捕獲	成獣	85	25	R3.7.9	陰性
12	R3.7.7	神石高原町	雄	捕獲	成獣	120	35	R3.7.14	陰性
13	R3.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	4	R3.7.14	陰性
14	R3.7.7	三原市	雌	捕獲	幼獣	70	4	R3.7.14	陰性
15	R3.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	45	2	R3.7.14	陰性
16	R3.7.7	三原市	雄	捕獲	成獣	90	20	R3.7.14	陰性
17	R3.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	6	R3.7.14	陰性
18	R3.7.7	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	5	R3.7.14	陰性
19	R3.7.7	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	5	R3.7.14	陰性
20	R3.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	6	R3.7.14	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
21	R3.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	6	R3.7.14	陰性
22	R3.7.12	神石高原町	雄	捕獲	幼獣	60	3	R3.7.16	陰性
23	R3.7.12	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	3	R3.7.16	陰性
24	R3.7.15	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	2	R3.7.21	陰性
25	R3.7.15	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	3	R3.7.21	陰性
26	R3.7.19	神石高原町	雄	捕獲	成獣	130	50	R3.7.27	陰性
27	R3.7.20	庄原市	雄	捕獲	成獣	100	45	R3.7.28	陰性
28	R3.7.21	三原市	雌	捕獲	成獣	95	60	R3.7.28	陰性
29	R3.7.21	三原市	雄	捕獲	幼獣	55	8	R3.7.28	陰性
30	R3.7.21	三原市	雄	捕獲	幼獣	55	10	R3.7.28	陰性
31	R3.7.21	三原市	雄	捕獲	幼獣	55	10	R3.7.28	陰性
32	R3.7.21	三原市	雄	捕獲	幼獣	55	10	R3.7.28	陰性
33	R3.7.21	三原市	雄	捕獲	幼獣	55	10	R3.7.28	陰性
34	R3.7.27	三原市	雄	捕獲	成獣	80	35.0	R3.8.2	陰性
35	R3.7.27	神石高原町	雄	捕獲	幼獣	60	7.0	R3.8.2	陰性
36	R3.7.27	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	7.0	R3.8.2	陰性
37	R3.7.27	神石高原町	雌	捕獲	成獣	110	65.0	R3.8.2	陰性
38	R3.7.28	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	15.0	R3.8.2	陰性
39	R3.7.28	三原市	雌	捕獲	成獣	90	60.0	R3.8.2	陰性
40	R3.7.28	三原市	雄	捕獲	成獣	85	40.0	R3.8.2	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
41	R3.8.2	神石高原町	雄	捕獲	幼獣	65	5.5	R3.8.5	陰性
42	R3.8.2	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	65	5.5	R3.8.5	陰性
43	R3.8.2	神石高原町	雄	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.5	陰性
44	R3.8.2	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.6	陰性
45	R3.8.2	三次市	雌	捕獲	成獣	90	25.0	R3.8.5	陰性
46	R3.8.2	三次市	雌	捕獲	成獣	90	25.0	R3.8.5	陰性
47	R3.8.4	三次市	雄	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.11	陰性
48	R3.8.4	三次市	雄	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.11	陰性
49	R3.8.4	三次市	雄	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.11	陰性
50	R3.8.10	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.19	陰性
51	R3.8.10	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.20	陰性
52	R3.8.10	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.19	陰性
53	R3.8.10	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.19	陰性
54	R3.8.10	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	5.0	R3.8.19	陰性
55	R3.8.10	神石高原町	雌	捕獲	成獣	100	70.0	R3.8.19	陰性
56	R3.8.11	庄原市	雄	捕獲	幼獣	50	4.0	R3.8.19	陰性
57	R3.8.11	庄原市	雄	捕獲	幼獣	50	4.0	R3.8.19	陰性
58	R3.8.11	庄原市	雌	捕獲	幼獣	50	4.0	R3.8.19	陰性
59	R3.8.12	三次市	雌	捕獲	幼獣	45	2.0	R3.8.24	陰性
60	R3.8.23	三次市	雄	捕獲	成獣	110	80.0	R3.8.26	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
61	R3.8.23	三次市	雄	捕獲	成獣	75	50.0	R3.8.26	陰性
62	R3.8.23	三次市	雄	捕獲	成獣	75	45.0	R3.8.26	陰性
63	R3.8.23	三原市	雄	捕獲	成獣	100	30.0	R3.8.26	陰性
64	R3.8.23	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	7.0	R3.9.3	陰性
65	R3.8.24	三次市	雄	捕獲	成獣	110	70.0	R3.9.3	陰性
66	R3.8.26	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	4.0	R3.9.3	陰性
67	R3.8.27	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	7.0	R3.9.3	陰性
68	R3.8.27	三原市	雄	捕獲	成獣	110	50.0	R3.9.3	陰性
69	R3.8.27	広島市	雌	捕獲	幼獣	85	18.0	R3.9.3	陰性
70	R3.8.27	広島市	雌	捕獲	幼獣	90	20.0	R3.9.3	陰性
71	R3.8.30	三原市	雌	捕獲	成獣	110	60.0	R3.9.3	陰性
72	R3.8.30	三原市	雌	捕獲	成獣	95	45.0	R3.9.3	陰性
73	R3.8.30	三原市	雌	捕獲	成獣	100	45.0	R3.9.4	陰性
74	R3.9.1	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	7.0	R3.9.21	陰性
75	R3.9.1	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R3.9.21	陰性
76	R3.9.6	三原市	雄	捕獲	成獣	90	40.0	R3.9.21	陰性
77	R3.9.6	三原市	雄	捕獲	成獣	100	40.0	R3.9.21	陰性
78	R3.9.6	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	4.0	R3.9.21	陰性
79	R3.9.6	三原市	雌	捕獲	成獣	80	40.0	R3.9.21	陰性
80	R3.9.10	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R3.9.21	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
81	R3.9.10	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R3.9.21	陰性
82	R3.9.10	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R3.9.21	陰性
83	R3.9.15	三原市	雄	捕獲	幼獣	65	8.0	R3.9.21	陰性
84	R3.9.16	神石高原町	雌	捕獲	成獣	80	20.0	R3.10.11	陰性
85	R3.10.4	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	10.0	R3.10.11	陰性
86	R3.10.4	三原市	雌	捕獲	成獣	120	50.0	R3.10.11	陰性
87	R3.10.5	三原市	雄	捕獲	成獣	95	30.0	R3.10.11	陰性
88	R3.10.7	三原市	雌	捕獲	成獣	110	60.0	R3.10.25	陰性
89	R3.10.11	三原市	雄	捕獲	成獣	100	60.0	R3.10.25	陰性
90	R3.10.13	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	15.0	R3.10.25	陰性
91	R3.10.13	三原市	雌	捕獲	幼獣	70	15.0	R3.10.25	陰性
92	R3.10.19	三原市	雄	捕獲	成獣	100	40.0	R3.10.25	陰性
93	R3.10.20	三次市	雌	捕獲	成獣	110	55.0	R3.11.5	陰性
94	R3.10.22	三原市	雌	捕獲	成獣	100	60.0	R3.11.5	陰性
95	R3.10.22	三原市	雄	捕獲	成獣	75	10.0	R3.11.5	陰性
96	R3.11.1	三原市	雌	捕獲	成獣	80	20	R3.11.5	陰性
97	R3.11.1	三原市	雄	捕獲	成獣	80	20	R3.11.5	陰性
98	R3.11.1	三原市	雌	捕獲	成獣	100	40	R3.11.5	陰性
99	R3.11.1	三原市	雄	捕獲	成獣	90	40	R3.11.5	陰性
100	R3.11.2	三原市	雌	捕獲	成獣	90	40	R3.11.5	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
101	R3.11.4	神石高原町	雄	捕獲	成獣	70	25	R3.11.22	陰性
102	R3.11.4	神石高原町	雌	捕獲	成獣	75	30	R3.11.22	陰性
103	R3.11.4	神石高原町	雌	捕獲	成獣	75	30	R3.11.22	陰性
104	R3.11.5	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	15	R3.11.22	陰性
105	R3.11.5	三原市	雄	捕獲	成獣	140	100	R3.11.22	陰性
106	R3.11.8	三原市	雌	捕獲	成獣	70	15	R3.11.22	陰性
107	R3.11.18	三原市	不明	死亡	成獣	60	15.0	R3.11.22	陰性
108	R3.11.26	三原市	雄	捕獲	成獣	120	80	R3.12.3	陰性
109	R3.12.7	三原市	雄	捕獲	成獣	140	95	R3.12.20	陰性
110	R3.12.9	三原市	雄	捕獲	幼獣	80	20	R3.12.20	陰性
111	R3.12.9	三原市	雌	捕獲	幼獣	80	20	R3.12.20	陰性
112	R3.12.9	三原市	雌	捕獲	成獣	120	80	R3.12.20	陰性
113	R3.12.13	三原市	雌	捕獲	幼獣	70	15	R3.12.20	陰性
114	R3.12.13	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	15	R3.12.20	陰性
115	R3.12.13	三原市	雌	捕獲	幼獣	70	15	R3.12.20	陰性
116	R3.12.14	三原市	雄	捕獲	成獣	130	70	R3.12.20	陰性
117	R3.12.17	三原市	雄	捕獲	成獣	120	40	R4.1.6	陰性
118	R3.12.17	三原市	雄	捕獲	成獣	90	30	R4.1.6	陰性
119	R4.1.14	三原市	雄	捕獲	成獣	120	60	R4.1.21	陰性
120	R4.1.16	福山市	雄	死亡	成獣	120	80.0	R4.1.18	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
121	R4.2.2	三原市	雄	捕獲	成獣	140	60	R4.2.22	陰性
122	R4.2.3	三原市	雄	捕獲	成獣	140	70	R4.2.22	陰性
123	R4.2.10	三原市	雄	捕獲	成獣	90	15	R4.2.22	陰性
124	R4.2.18	尾道市	雌	死亡	成獣	100	80.0	R4.1.18	陰性
125	R4.2.22	三原市	雌	捕獲	成獣	120	60	R4.3.4	陰性
126	R4.2.24	三原市	雄	捕獲	成獣	80	30	R4.3.4	陰性
127	R4.2.28	廿日市市	雌	捕獲	成獣	110	80	R4.3.4	陰性
128	R4.2.28	廿日市市	雄	捕獲	成獣	90	20	R4.3.4	陰性
129	R4.2.28	廿日市市	雄	捕獲	成獣	75	15	R4.3.4	陰性
130	R4.2.28	廿日市市	雌	捕獲	成獣	80	18	R4.3.4	陰性
131	R4.3.2	三原市	雌	捕獲	成獣	60	15	R4.3.17	陰性
132	R4.3.7	三原市	雄	捕獲	成獣	90	25	R4.3.17	陰性
133	R4.3.7	三原市	雌	捕獲	成獣	85	20	R4.3.17	陰性
134	R4.3.7	三原市	雌	捕獲	成獣	115	55	R4.3.17	陰性
135	R4.3.22	庄原市	雄	死亡	幼獣	60	7.0	R4.3.23	陰性
136	R4.3.17	大竹市	雄	捕獲	成獣	100	70.0	R4.3.20（確定検査:R4.3.21）	陽性
137	R4.3.22	大竹市	雌	捕獲	幼獣	60	20.0	R4.3.22	陰性
138	R4.3.22	大竹市	雄	捕獲	成獣	40	8.0	R4.3.22	陰性
139	R4.3.23	呉市	不明	死亡	幼獣	45	15.0	R4.3.23	陰性
140	R4.3.24	呉市	雄	死亡	幼獣	70	10.0	R4.3.24	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
141	R4.3.24	庄原市	不明	死亡	幼獣	70	6.0	R4.3.25	陰性
142	R4.3.25	大竹市	雄	捕獲	成獣	80	15.0	R4.3.25	陰性
143	R4.3.25	大竹市	雄	死亡	成獣	80	15.0	R4.3.25	陰性
144	R4.3.25	大竹市	雌	死亡	成獣	80	15.0	R4.3.25	陰性
145	R4.3.25	大竹市	雄	死亡	成獣	80	15.0	R4.3.25	陰性
146	R4.3.24	廿日市市	雄	捕獲	成獣	130	100	R4.3.29	陰性
147	R4.3.24	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	70	30	R4.3.29	陰性
148	R4.3.31	呉市	雌	死亡	成獣	80	30	R4.4.1	陰性
149	R4.4.1	大竹市	雌	死亡	成獣	100	60	R4.4.5	陽性
150	R4.4.1	府中市	雌	死亡	成獣	80	20	R4.4.5	陰性
151	R4.4.5	三原市	雌	死亡	成獣	70	16	R4.4.8	陰性
152	R4.4.7	大竹市	雄	死亡	成獣	120	50	R4.4.12	陰性
153	R4.4.7	府中市	雄	死亡	幼獣	50	7	R4.4.12	陰性
154	R4.4.11	三原市	雄	死亡	幼獣	60	10	R4.4.15	陰性
155	R4.4.11	廿日市市	雌	死亡	成獣	100	45	R4.4.15	陽性
156	R4.4.18	北広島町	雌	死亡	成獣	70	7	R4.4.22	陰性
157	R4.4.18	北広島町	雄	死亡	成獣	80	10	R4.4.22	陰性
158	R4.4.18	北広島町	雌	死亡	成獣	95	16	R4.4.22	陰性
159	R4.4.18	大竹市	雄	死亡	成獣	120	30	R4.4.22	陽性
160	R4.4.20	東広島市	雌	死亡	幼獣	65	15	R4.4.26	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
161	R4.4.28	庄原市	雄	死亡	成獣	80	20	R4.5.10	陰性
162	R4.5.8	福山市	雌	死亡	成獣	130	60	R4.5.13	陰性
163	R4.5.15	大竹市	雄	死亡	幼獣	50	8	R4.5.20	陽性
164	R4.5.23	府中市	雌	死亡	成獣	80	30	R4.5.26	陰性
165	R4.5.29	広島市	雄	死亡	幼獣	40	3	R4.6.3	陰性
166	R4.6.17	坂町	雌	死亡	幼獣	40	3	R4.6.24	陰性
167	R4.7.6	三原市	雄	捕獲	幼獣	30	1	R4.7.15	陰性
168	R4.7.6	三原市	雄	捕獲	幼獣	30	1	R4.7.15	陰性
169	R4.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	30	2	R4.7.15	陰性
170	R4.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	30	2	R4.7.15	陰性
171	R4.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	30	2	R4.7.15	陰性
172	R4.7.7	三原市	雄	捕獲	幼獣	30	2	R4.7.15	陰性
173	R4.7.10	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	6	R4.7.15	陰性
174	R4.7.10	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	8.0	R4.7.15	陰性
175	R4.7.10	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	8.0	R4.7.15	陰性
176	R4.7.7	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	65	10	R4.7.15	陰性
177	R4.7.8	安芸高田市	不明	捕獲	成獣	120	32	R4.7.15	陰性
178	R4.7.8	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	65	35	R4.7.15	陰性
179	R4.7.8	安芸高田市	雄	捕獲	幼獣	75	25	R4.7.15	陰性
180	R4.7.10	安芸高田市	雄	捕獲	幼獣	40	4	R4.7.15	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
181	R4.7.12	江田島市	雄	捕獲	幼獣	40	3	R4.7.15	陰性
182	R4.7.12	江田島市	雌	捕獲	幼獣	40	3	R4.7.15	陰性
183	R4.7.12	江田島市	雌	捕獲	成獣	120	60	R4.7.15	陰性
184	R4.7.12	江田島市	雌	捕獲	幼獣	80	20	R4.7.15	陰性
185	R4.7.13	三原市	雌	捕獲	成獣	100	60	R4.7.20	陰性
186	R4.7.13	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	10	R4.7.20	陰性
187	R4.7.13	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	9	R4.7.20	陰性
188	R4.7.13	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	10	R4.7.20	陰性
189	R4.7.13	三原市	雌	捕獲	成獣	120	60	R4.7.20	陰性
190	R4.7.11	三原市	雄	捕獲	幼獣	72	18	R4.7.20	陰性
191	R4.7.11	三原市	雄	捕獲	成獣	72	17	R4.7.20	陰性
192	R4.7.11	三原市	雄	捕獲	幼獣	65	13	R4.7.20	陰性
193	R4.7.11	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	13	R4.7.20	陰性
194	R4.7.11	三原市	雄	捕獲	幼獣	55	12	R4.7.20	陰性
195	R4.7.12	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	90	30	R4.7.20	陰性
196	R4.7.12	竹原市	雄	捕獲	幼獣	90	30	R4.7.20	陰性
197	R4.7.5	坂町	雌	捕獲	成獣	100	80	R4.7.20	陰性
198	R4.7.9	坂町	雌	捕獲	成獣	106	67	R4.7.20	陰性
199	R4.7.10	坂町	雄	捕獲	幼獣	55	5	R4.7.20	陰性
200	R4.7.11	坂町	雌	捕獲	成獣	100	65	R4.7.20	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
201	R4.7.14	竹原市	雌	捕獲	成獣	123	80	R4.7.20	陰性
202	R4.7.14	竹原市	雌	捕獲	幼獣	48	2	R4.7.20	陰性
203	R4.7.14	竹原市	雄	捕獲	幼獣	52	2	R4.7.20	陰性
204	R4.7.14	竹原市	雌	捕獲	幼獣	55	2	R4.7.20	陰性
205	R4.7.14	尾道市	雄	捕獲	成獣	80	50	R4.7.22	陰性
206	R4.7.7	大崎上島町	雌	捕獲	幼獣	80	15	R4.7.22	陰性
207	R4.7.11	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	不明	60	R4.7.22	陰性
208	R4.7.12	大崎上島町	不明	捕獲	幼獣	30	2	R4.7.22	陰性
209	R4.7.13	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	130	50	R4.7.22	陰性
210	R4.7.17	竹原市	雌	捕獲	成獣	不明	50	R4.7.22	陰性
211	R4.7.17	竹原市	雌	捕獲	幼獣	43	2	R4.7.22	陰性
212	R4.7.17	竹原市	不明	捕獲	幼獣	43	2	R4.7.22	陰性
213	R4.7.17	竹原市	雄	捕獲	幼獣	43	2	R4.7.22	陰性
214	R4.7.17	竹原市	不明	捕獲	幼獣	52	3	R4.7.22	陰性
215	R4.7.16	三原市	雄	捕獲	成獣	78	25	R4.7.26	陰性
216	R4.7.16	三原市	雌	捕獲	成獣	72	20	R4.7.26	陰性
217	R4.7.18	三原市	雄	捕獲	成獣	80	30	R4.7.26	陰性
218	R4.7.18	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	7	R4.7.26	陰性
219	R4.7.20	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	12	R4.7.26	陰性
220	R4.7.20	三原市	雄	捕獲	幼獣	57	10	R4.7.26	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
221	R4.7.19	広島市	雌	捕獲	成獣	100	70	R4.7.26	陰性
222	R4.7.16	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	110	35	R4.7.26	陰性
223	R4.7.20	安芸高田市	不明	捕獲	幼獣	50	6	R4.7.26	陰性
224	R4.7.20	安芸高田市	不明	捕獲	成獣	90	30	R4.7.26	陰性
225	R4.7.21	三原市	雄	捕獲	成獣	90	40	R4.7.29	陰性
226	R4.7.21	三原市	雌	捕獲	成獣	90	40	R4.7.29	陰性
227	R4.7.21	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	7	R4.7.29	陰性
228	R4.7.21	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	7	R4.7.29	陰性
229	R4.7.21	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	7	R4.7.29	陰性
230	R4.7.23	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	6	R4.7.29	陰性
231	R4.7.23	福山市	雄	捕獲	成獣	120	60	R4.7.29	陰性
232	R4.7.15	大崎上島町	雄	捕獲	幼獣	60	10	R4.7.29	陰性
233	R4.7.15	大崎上島町	雄	捕獲	幼獣	25	2	R4.7.29	陰性
234	R4.7.20	大崎上島町	雌	捕獲	幼獣	25	2	R4.7.29	陰性
235	R4.7.22	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	100	60	R4.7.29	陰性
236	R4.7.23	大崎上島町	雄	捕獲	幼獣	25	3	R4.7.29	陰性
237	R4.7.23	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	80	35	R4.7.29	陰性
238	R4.7.23	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	8	R4.8.2	陰性
239	R4.7.24	三原市	雄	捕獲	成獣	60	40	R4.8.2	陰性
240	R4.7.25	三原市	雌	捕獲	成獣	60	40	R4.8.2	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
241	R4.7.25	三原市	雄	捕獲	幼獣	40	7	R4.8.2	陰性
242	R4.7.25	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	7	R4.8.2	陰性
243	R4.7.25	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	1	R4.8.2	陰性
244	R4.7.25	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	8	R4.8.2	陰性
245	R4.7.25	三原市	雌	捕獲	幼獣	70	8	R4.8.2	陰性
246	R4.7.25	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	8	R4.8.2	陰性
247	R4.7.25	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	7	R4.8.2	陰性
248	R4.7.25	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	7	R4.8.2	陰性
249	R4.7.26	三原市	雌	捕獲	成獣	110	50	R4.8.2	陰性
250	R4.7.26	三原市	雌	捕獲	成獣	70	25	R4.8.2	陰性
251	R4.7.26	三原市	雌	捕獲	成獣	110	25	R4.8.2	陰性
252	R4.7.27	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	1	R4.8.2	陰性
253	R4.7.24	竹原市	雄	捕獲	成獣	100	100	R4.8.2	陰性
254	R4.7.24	竹原市	雄	捕獲	幼獣	85	12	R4.8.2	陰性
255	R4.7.24	竹原市	雌	捕獲	幼獣	50	2	R4.8.2	陰性
256	R4.7.25	竹原市	不明	捕獲	成獣	90	40	R4.8.2	陰性
257	R4.7.25	竹原市	不明	捕獲	成獣	110	130	R4.8.2	陰性
258	R4.7.27	竹原市	雌	捕獲	成獣	90	40	R4.8.2	陰性
259	R4.7.25	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	100	35	R4.8.2	陰性
260	R4.7.28	東広島市	雌	捕獲	幼獣	80	30	R4.8.2	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
261	R4.7.28	竹原市	雄	捕獲	幼獣	58	2.5	R4.8.5	陰性
262	R4.7.28	竹原市	雌	捕獲	幼獣	50	1.5	R4.8.5	陰性
263	R4.7.28	竹原市	雌	捕獲	幼獣	50	1.5	R4.8.5	陰性
264	R4.7.30	竹原市	雌	捕獲	幼獣	48	4	R4.8.5	陰性
265	R4.7.30	竹原市	雄	捕獲	幼獣	70	5	R4.8.5	陰性
266	R4.7.21	坂町	雄	捕獲	幼獣	50	5	R4.8.5	陰性
267	R4.7.21	坂町	雌	捕獲	幼獣	45	4	R4.8.5	陰性
268	R4.7.23	坂町	雄	捕獲	成獣	80	35	R4.8.5	陰性
269	R4.7.27	坂町	雄	捕獲	成獣	100	40	R4.8.5	陰性
270	R4.7.28	坂町	雌	捕獲	成獣	110	50	R4.8.5	陰性
271	R4.7.30	福山市	雌	捕獲	幼獣	60	6	R4.8.5	陰性
272	R4.8.1	福山市	雄	捕獲	幼獣	75	18	R4.8.9	陰性
273	R4.7.30	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	15	R4.8.5	陰性
274	R4.8.3	府中市	雄	捕獲	成獣	120	30	R4.8.9	陰性
275	R4.8.3	府中市	雌	捕獲	幼獣	45	5	R4.8.9	陰性
276	R4.8.3	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	100	28	R4.8.9	陰性
277	R4.7.28	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	8	R4.8.9	陰性
278	R4.7.28	三原市	雄	捕獲	成獣	90	35	R4.8.9	陰性
279	R4.7.31	三原市	雄	捕獲	成獣	120	70	R4.8.9	陰性
280	R4.8.1	三原市	雄	捕獲	成獣	90	30	R4.8.9	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
281	R4.8.1	三原市	雄	捕獲	成獣	50	15	R4.8.9	陰性
282	R4.7.31	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	7	R4.8.9	陰性
283	R4.7.31	三原市	雌	捕獲	成獣	110	35	R4.8.9	陰性
284	R4.8.1	三原市	雌	捕獲	成獣	110	40	R4.8.9	陰性
285	R4.8.2	三原市	雄	捕獲	幼獣	100	1.2	R4.8.9	陰性
286	R4.8.2	三原市	雄	捕獲	幼獣	80	1	R4.8.9	陰性
287	R4.8.2	竹原市	雄	捕獲	成獣	110	60	R4.8.12	陰性
288	R4.8.3	竹原市	不明	捕獲	幼獣	不明	不明	R4.8.12	陰性
289	R4.8.4	竹原市	雌	捕獲	成獣	110	100	R4.8.12	陰性
290	R4.8.4	竹原市	雌	捕獲	幼獣	40	20	R4.8.12	陰性
291	R4.8.6	福山市	雌	捕獲	成獣	140	40	R4.8.12	陰性
292	R4.8.6	福山市	雄	捕獲	幼獣	70	5	R4.8.12	陰性
293	R4.8.3	坂町	雌	捕獲	成獣	110	45	R4.8.12	陰性
294	R4.8.5	福山市	雄	捕獲	成獣	90	30	R4.8.12	陰性
295	R4.8.5	福山市	雄	捕獲	成獣	80	15	R4.8.12	陰性
296	R4.8.6	福山市	雌	捕獲	成獣	70	15	R4.8.12	陰性
297	R4.8.3	三原市	雌	捕獲	成獣	70	0.8	R4.8.16	陰性
298	R4.8.3	三原市	雌	捕獲	成獣	120	70	R4.8.16	陰性
299	R4.8.5	三原市	雌	捕獲	成獣	75	30	R4.8.16	陰性
300	R4.8.5	三原市	雄	捕獲	成獣	120	80	R4.8.16	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
301	R4.8.5	三原市	雌	捕獲	幼獣	70	8	R4.8.16	陰性
302	R4.8.7	三原市	雌	捕獲	成獣	80	20	R4.8.16	陰性
303	R4.8.7	三原市	雌	捕獲	幼獣	45	5	R4.8.16	陰性
304	R4.8.8	三原市	雌	捕獲	成獣	110	50	R4.8.16	陰性
305	R4.8.9	三原市	雌	捕獲	成獣	100	45	R4.8.16	陰性
306	R4.8.9	福山市	雄	捕獲	幼獣	75	18	R4.8.16	陰性
307	R4.8.9	府中市	雌	捕獲	成獣	130	30	R4.8.19	陰性
308	R4.8.10	庄原市	雄	捕獲	成獣	115	63	R4.8.19	陰性
309	R4.8.10	庄原市	不明	捕獲	幼獣	40	2	R4.8.19	陰性
310	R4.8.10	庄原市	不明	捕獲	幼獣	40	2	R4.8.19	陰性
311	R4.8.10	庄原市	不明	捕獲	幼獣	40	2	R4.8.19	陰性
312	R4.8.9	安芸高田市	不明	捕獲	幼獣	40	8	R4.8.19	陰性
313	R4.8.11	福山市	雄	捕獲	成獣	100	50	R4.8.19	陰性
314	R4.8.11	府中市	雌	捕獲	幼獣	40	3	R4.8.19	陰性
315	R4.8.10	福山市	雄	捕獲	幼獣	80	20	R4.8.19	陰性
316	R4.8.12	福山市	雄	捕獲	成獣	80	9	R4.8.19	陰性
317	R4.8.12	福山市	雌	捕獲	成獣	120	50	R4.8.19	陰性
318	R4.8.13	福山市	雌	捕獲	成獣	80	30	R4.8.19	陰性
319	R4.8.14	福山市	不明	捕獲	幼獣	70	20	R4.8.19	陰性
320	R4.8.16	福山市	雄	捕獲	成獣	100	40	R4.8.19	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
321	R4.8.12	福山市	雄	捕獲	幼獣	70	20	R4.8.23	陰性
322	R4.8.14	福山市	雌	捕獲	幼獣	65	15	R4.8.23	陰性
323	R4.8.15	福山市	雌	捕獲	幼獣	60	12	R4.8.23	陰性
324	R4.8.17	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	80	50	R4.8.23	陰性
325	R4.8.17	安芸太田町	不明	捕獲	幼獣	40	8	R4.8.23	陰性
326	R4.8.14	府中市	雌	捕獲	成獣	120	50	R4.8.23	陰性
327	R4.8.14	府中市	雄	捕獲	幼獣	70	7	R4.8.23	陰性
328	R4.8.17	府中市	雄	捕獲	成獣	110	35	R4.8.23	陰性
329	R4.8.20	府中市	雌	捕獲	成獣	140	50	R4.8.26	陰性
330	R4.8.20	府中市	雄	捕獲	幼獣	60	5	R4.8.26	陰性
331	R4.8.17	福山市	雄	捕獲	成獣	110	40	R4.8.26	陰性
332	R4.8.17	福山市	雌	捕獲	幼獣	90	30	R4.8.26	陰性
333	R4.8.19	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	20	R4.8.26	陰性
334	R4.8.20	福山市	雌	捕獲	成獣	120	50	R4.8.26	陰性
335	R4.8.20	福山市	雌	捕獲	成獣	80	25	R4.8.26	陰性
336	R4.8.21	江田島市	雌	捕獲	成獣	80	50	R4.8.26	陰性
337	R4.8.22	福山市	雌	捕獲	成獣	100	45	R4.8.26	陰性
338	R4.8.13	坂町	雄	捕獲	幼獣	50	4	R4.8.26	陰性
339	R4.8.21	坂町	雄	捕獲	成獣	95	30	R4.8.26	陰性
340	R4.8.24	府中市	雄	捕獲	幼獣	60	8	R4.9.2	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
341	R4.8.24	府中市	雄	捕獲	成獣	130	60	R4.9.2	陰性
342	R4.8.24	福山市	雌	捕獲	幼獣	80	10	R4.9.2	陰性
343	R4.8.22	福山市	雌	捕獲	成獣	95	30	R4.9.2	陰性
344	R4.8.25	福山市	雌	捕獲	成獣	120	50	R4.9.2	陰性
345	R4.8.26	府中市	不明	捕獲	幼獣	80	10	R4.9.2	陰性
346	R4.8.27	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	6	R4.9.2	陰性
347	R4.8.31	江田島市	雄	捕獲	幼獣	70	20	R4.9.6	陰性
348	R4.8.30	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	85	30	R4.9.6	陰性
349	R4.8.31	神石高原町	雄	捕獲	成獣	100	60	R4.9.9	陰性
350	R4.9.1	福山市	雌	捕獲	幼獣	60	3	R4.9.9	陰性
351	R4.9.1	庄原市	雄	捕獲	幼獣	90	30	R4.9.9	陰性
352	R4.9.2	庄原市	雌	捕獲	幼獣	60	12	R4.9.9	陰性
353	R4.8.28	福山市	雄	捕獲	成獣	80	20	R4.9.9	陰性
354	R4.8.29	福山市	雄	捕獲	成獣	75	15	R4.9.9	陰性
355	R4.8.31	福山市	雌	捕獲	幼獣	60	10	R4.9.9	陰性
356	R4.9.3	福山市	雄	捕獲	成獣	110	35	R4.9.9	陰性
357	R4.9.3	福山市	雄	捕獲	成獣	100	35	R4.9.9	陰性
358	R4.8.28	坂町	雄	捕獲	幼獣	50	4	R4.9.9	陰性
359	R4.9.4	坂町	雄	捕獲	成獣	80	50	R4.9.9	陰性
360	R4.9.4	坂町	雄	捕獲	成獣	80	50	R4.9.9	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
361	R4.9.4	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	8	R4.9.9	陰性
362	R4.9.5	福山市	雌	捕獲	幼獣	65	9	R4.9.9	陰性
363	R4.8.26	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	70	30	R4.9.9	陰性
364	R4.8.28	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	70	40	R4.9.9	陰性
365	R4.8.29	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	100	40	R4.9.9	陰性
366	R4.8.31	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	120	50	R4.9.9	陰性
367	R4.8.28	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	100	20	R4.9.9	陰性
368	R4.9.3	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	110	30	R4.9.9	陰性
369	R4.9.3	神石高原町	雌	捕獲	幼獣	60	8	R4.9.9	陰性
370	R4.9.6	府中市	雌	捕獲	幼獣	0	15	R4.9.9	陰性
371	R4.9.7	府中市	雌	捕獲	幼獣	70	15	R4.9.13	陰性
372	R4.9.6	府中市	雌	捕獲	成獣	90	30	R4.9.13	陰性
373	R4.9.6	府中市	雌	捕獲	成獣	120	40	R4.9.13	陰性
374	R4.9.2	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	70	26	R4.9.13	陰性
375	R4.9.2	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	160	35	R4.9.13	陰性
376	R4.8.28	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	110	50	R4.9.13	陰性
377	R4.9.4	坂町	雄	捕獲	成獣	110	65	R4.9.16	陰性
378	R4.9.5	坂町	雄	捕獲	成獣	100	25	R4.9.16	陰性
379	R4.9.6	福山市	雄	捕獲	成獣	80	20	R4.9.16	陰性
380	R4.9.7	福山市	雄	捕獲	成獣	70	12	R4.9.16	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
381	R4.9.11	福山市	雌	捕獲	成獣	100	60	R4.9.16	陰性
382	R4.9.12	熊野町	不明	捕獲	幼獣	30	5	R4.9.16	陰性
383	R4.9.12	安芸太田町	雌	捕獲	幼獣	60	20	R4.9.20	陰性
384	R4.9.13	安芸高田市	雌	捕獲	幼獣	55	13	R4.9.20	陰性
385	R4.9.8	廿日市市	雌	捕獲	成獣	60	30	R4.9.20	陰性
386	R4.9.15	福山市	雌	捕獲	成獣	140	100	R4.9.20	陰性
387	R4.9.16	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	70	6	R4.9.20	陰性
388	R4.9.16	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	70	7	R4.9.20	陰性
389	R4.9.13	安芸高田市	雄	捕獲	幼獣	85	30	R4.9.20	陰性
390	R4.9.8	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	110	30	R4.9.20	陰性
391	R4.9.8	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	120	40	R4.9.20	陰性
392	R4.9.14	大崎上島町	雌	捕獲	幼獣	70	8	R4.9.20	陰性
393	R4.9.15	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	110	30	R4.9.20	陰性
394	R4.9.20	廿日市市	雄	捕獲	成獣	117	90	R4.9.30	陰性
395	R4.9.15	福山市	雌	捕獲	成獣	80	20	R4.9.30	陰性
396	R4.9.20	福山市	雌	捕獲	成獣	90	25	R4.9.30	陰性
397	R4.9.23	福山市	雄	捕獲	成獣	100	40	R4.9.30	陰性
398	R4.9.23	熊野町	不明	捕獲	幼獣	35	10	R4.9.30	陰性
399	R4.9.23	熊野町	不明	捕獲	幼獣	35	10	R4.9.30	陰性
400	R4.9.23	大竹市	雄	捕獲	成獣	120	60	R4.9.30	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
401	R4.9.25	熊野町	雄	捕獲	幼獣	40	28	R4.9.30	陰性
402	R4.9.19	坂町	不明	捕獲	幼獣	102	27	R4.9.30	陰性
403	R4.9.19	坂町	不明	捕獲	成獣	65	25	R4.9.30	陰性
404	R4.9.21	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	50	20	R4.9.30	陰性
405	R4.9.26	廿日市市	雄	捕獲	成獣	110	60	R4.10.4	陰性
406	R4.9.28	大竹市	雄	捕獲	成獣	120	60	R4.10.4	陰性
407	R4.9.22	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	130	80	R4.10.4	陰性
408	R4.9.23	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	100	30	R4.10.4	陰性
409	R4.9.28	安芸高田市	不明	捕獲	成獣	50	5	R4.10.4	陰性
410	R4.9.28	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	50	15	R4.10.4	陰性
411	R4.9.29	安芸高田市	不明	捕獲	成獣	50	13	R4.10.4	陰性
412	R4.9.29	安芸高田市	雌	捕獲	幼獣	70	15	R4.10.4	陰性
413	R4.9.29	福山市	雄	捕獲	成獣	110	80	R4.10.7	陰性
414	R4.9.21	坂町	雌	捕獲	成獣	120	40	R4.10.7	陰性
415	R4.9.27	坂町	雌	捕獲	幼獣	60	5	R4.10.7	陰性
416	R4.9.29	坂町	雌	捕獲	幼獣	65	5	R4.10.7	陰性
417	R4.9.28	福山市	雄	捕獲	幼獣	70	15	R4.10.7	陰性
418	R4.10.1	福山市	雌	捕獲	成獣	150	80	R4.10.7	陰性
419	R4.10.1	熊野町	雌	捕獲	成獣	40	40	R4.10.7	陰性
420	R4.10.2	安芸高田市	雄	捕獲	幼獣	70	18	R4.10.7	陰性

【広島県】

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
421	R4.9.29	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	80	20	R4.10.7	陰性
422	R4.10.1	神石高原町	雄	捕獲	成獣	55～60	10	R4.10.7	陰性
423	R4.10.1	神石高原町	雌	捕獲	成獣	60	12	R4.10.7	陰性
424	R4.10.2	福山市	雌	捕獲	成獣	70	15	R4.10.7	陰性
425	R4.10.4	福山市	雄	捕獲	幼獣	50	5	R4.10.7	陰性
426	R4.10.11	安芸太田町	雄	死亡	成獣	95	20	R4.10.14	陽性
427	R4.9.30	坂町	雌	捕獲	成獣	90	25	R4.10.14	陰性
428	R4.10.2	坂町	雄	捕獲	成獣	100	35	R4.10.14	陰性
429	R4.10.2	坂町	雄	捕獲	成獣	110	40	R4.10.14	陰性
430	R4.10.3	坂町	雄	捕獲	幼獣	60	5	R4.10.14	陰性
431	R4.10.5	廿日市市	雌	捕獲	成獣	120	70	R4.10.14	陰性
432	R4.10.4	熊野町	不明	捕獲	幼獣	15	4	R4.10.14	陰性
433	R4.10.5	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	90	50	R4.10.14	陰性
434	R4.10.7	神石高原町	雄	捕獲	成獣	110	80	R4.10.14	陰性
435	R4.10.8	神石高原町	雌	捕獲	成獣	60	15	R4.10.14	陰性
436	R4.10.11	大竹市	雌	捕獲	成獣	110	50	R4.10.14	陰性
437	R4.10.6	廿日市市	雌	捕獲	成獣	50	30	R4.10.18	陰性
438	R4.10.11	神石高原町	雄	捕獲	成獣	80	45	R4.10.18	陰性
439	R4.10.11	神石高原町	雌	捕獲	成獣	70	40	R4.10.18	陰性
440	R4.10.13	神石高原町	雌	捕獲	成獣	85	50	R4.10.18	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
441	R4.10.13	大竹市	雌	捕獲	成獣	115	45	R4.10.21	陰性
442	R4.10.16	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	70	20	R4.10.21	陰性
443	R4.10.15	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	70	20	R4.10.21	陽性
444	R4.10.19	廿日市市	雄	捕獲	成獣	100	40	R4.10.28	陽性
445	R4.10.28	廿日市市	不明	捕獲	成獣	60	30	R4.11.8	陰性
446	R4.10.31	廿日市市	雌	捕獲	成獣	60	20	R4.11.8	陰性
447	R4.11.9	廿日市市	雄	捕獲	成獣	120	90	R4.11.15	陰性
448	R4.11.15	広島市	雄	死亡	成獣	70	10	R4.11.18	陽性
449	R4.11.17	広島市	雌	死亡	成獣	65	5	R4.11.22	陽性
450	R4.11.21	広島市	雌	死亡	成獣	100	30	R4.11.25	陽性
451	R4.12.14	廿日市市	雄	捕獲	成獣	100	50	R4.12.20	陰性
452	R4.12.17	大竹市	雄	捕獲	成獣	115	80	R5.2.3	陰性
453	R4.12.15	廿日市市	雌	捕獲	成獣	100	45	R5.2.3	陰性
454	R4.12.15	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	70	20	R5.2.3	陰性
455	R4.12.27	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	60	10	R5.2.3	陽性
456	R5.1.3	大竹市	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.2.3	陰性
457	R4.12.30	大竹市	雄	捕獲	成獣	118	70	R5.2.3	陰性
458	R5.1.1	大竹市	雄	捕獲	成獣	100	38	R5.2.3	陰性
459	R5.1.9	広島市	雌	死亡	成獣	75	7	R5.2.3	陽性
460	R5.1.6	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	70	20	R5.2.3	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
461	R5.1.14	大竹市	雌	捕獲	成獣	105	40	R5.2.3	陰性
462	R5.1.14	大竹市	雌	捕獲	成獣	100	35	R5.2.3	陰性
463	R5.1.19	広島市	雌	死亡	成獣	80	10	R5.2.3	陰性
464	R5.1.24	大竹市	雌	捕獲	成獣	100	45	R5.2.3	陰性
465	R5.1.30	廿日市市	雄	捕獲	成獣	70	30	R5.2.3	陰性
466	R5.2.2	広島市	雌	死亡	成獣	80	15	R5.2.7	陽性
467	R5.2.1	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	80	25	R5.2.7	陰性
468	R5.2.2	大竹市	雌	捕獲	成獣	125	65	R5.2.10	陰性
469	R5.2.7	廿日市市	雄	捕獲	成獣	100	50	R5.2.14	陽性
470	R5.2.6	北広島町	雄	死亡	成獣	110	50	R5.2.14	陽性
471	R5.2.9	大竹市	雌	捕獲	成獣	90	25	R5.2.17	陰性
472	R5.2.9	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	100	15	R5.2.17	陰性
473	R5.2.12	大竹市	雄	捕獲	成獣	80	17	R5.2.17	陰性
474	R5.2.14	広島市	雄	死亡	成獣	100	15	R5.2.17	陰性
475	R5.2.15	江田島市	雄	死亡	成獣	120	80	R5.2.21	陽性
476	R5.2.20	大竹市	雄	捕獲	成獣	120	80	R5.2.28	陰性
477	R5.2.27	東広島市	雄	死亡	成獣	90	40	R5.3.3	陰性
478	R5.3.2	北広島町	雄	死亡	成獣	100	35	R5.3.7	陽性
479	R5.3.14	北広島町	雄	死亡	成獣	140	80	R5.3.17	陽性
480	R5.4.17	江田島市	雌	死亡	成獣	100	30	R5.4.21	陽性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
481	R5.4.18	福山市	雌	死亡	成獣	130	60	R5.4.21	陰性
482	R5.4.18	北広島町	雌	死亡	幼獣	80	10	R5.4.21	陽性
483	R5.4.22	江田島市	雄	死亡	成獣	130	60	R5.4.28	陽性
484	R5.4.26	東広島市	雄	死亡	成獣	110	50	R5.5.2	陽性
485	R5.4.26	江田島市	雄	死亡	成獣	100	15	R5.5.2	陰性
486	R5.6.1	大竹市	雌	捕獲	成獣	110	45	R5.6.9	陰性
487	R5.6.1	熊野町	雌	捕獲	成獣	50	60	R5.6.9	陽性
488	R5.6.1	三原市	雄	捕獲	成獣	80	35	R5.6.13	陰性
489	R5.6.3	三原市	雌	捕獲	成獣	80	65	R5.6.13	陰性
490	R5.6.3	三原市	雄	捕獲	成獣	80	30	R5.6.13	陰性
491	R5.6.5	三原市	雌	捕獲	成獣	90	30	R5.6.13	陰性
492	R5.6.6	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	2	R5.6.13	陰性
493	R5.6.6	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	100	25	R5.6.13	陰性
494	R5.6.10	東広島市	雄	捕獲	成獣	80	50	R5.6.15	陰性
495	R5.6.12	江田島市	雄	捕獲	成獣	100	50	R5.6.15	陰性
496	R5.6.8	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	4	R5.6.16	陰性
497	R5.6.11	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	5	R5.6.16	陰性
498	R5.6.11	三原市	雌	捕獲	成獣	85	40	R5.6.16	陰性
499	R5.6.14	熊野町	雄	捕獲	幼獣	55	30	R5.6.16	陰性
500	R5.6.22	呉市	雌	死亡	成獣	100	50	R5.6.27	陽性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
501	R5.6.21	府中市	雌	捕獲	成獣	100	35	R5.6.27	陰性
502	R5.6.15	三原市	雄	捕獲	成獣	120	35	R5.6.27	陰性
503	R5.6.20	三原市	雄	捕獲	成獣	100	40	R5.6.27	陰性
504	R5.6.20	三原市	雄	捕獲	幼獣	80	10	R5.6.27	陰性
505	R5.6.20	三原市	雄	捕獲	成獣	70	25	R5.6.27	陰性
506	R5.6.15	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	120	50	R5.6.27	陰性
507	R5.6.15	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	110	55	R5.6.27	陰性
508	R5.6.23	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	120	65	R5.6.27	陰性
509	R5.6.6	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	110	70	R5.6.30	陰性
510	R5.6.7	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	93	60	R5.6.30	陰性
511	R5.6.8	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	110	75	R5.6.30	陰性
512	R5.6.16	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	100	50	R5.6.30	陰性
513	R5.6.24	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	85	40	R5.6.30	陰性
514	R5.6.22	神石高原町	雄	捕獲	成獣	120	100	R5.6.30	陰性
515	R5.6.23	神石高原町	雄	捕獲	成獣	100	60	R5.6.30	陰性
516	R5.6.26	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	80	60	R5.6.30	陰性
517	R5.6.26	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	50	20	R5.6.30	陰性
518	R5.6.27	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	30	R5.6.30	陰性
519	R5.6.27	福山市	雄	捕獲	幼獣	50	4	R5.7.4	陰性
520	R5.6.25	福山市	雄	捕獲	成獣	100	40	R5.7.4	陰性

【広島県】

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
521	R5.6.25	福山市	雄	捕獲	幼獣	50	10	R5.7.4	陰性
522	R5.6.23	三原市	雌	捕獲	成獣	70	50	R5.7.4	陰性
523	R5.6.25	三原市	雄	捕獲	成獣	70	25	R5.7.4	陰性
524	R5.6.25	三原市	雄	捕獲	成獣	50	25	R5.7.4	陰性
525	R5.6.26	三原市	雄	捕獲	成獣	100	40	R5.7.4	陰性
526	R5.7.3	呉市	雄	死亡	成獣	120	60	R5.7.7	陽性
527	R5.7.2	福山市	雄	捕獲	成獣	100	140	R5.7.7	陰性
528	R5.6.29	坂町	雄	捕獲	幼獣	60	6	R5.7.11	陰性
529	R5.7.1	坂町	雌	捕獲	幼獣	65	15	R5.7.11	陰性
530	R5.7.4	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	30	R5.7.11	陰性
531	R5.6.30	三次市	雌	捕獲	成獣	80	60	R5.7.11	陰性
532	R5.6.30	三次市	雄	捕獲	成獣	90	60	R5.7.11	陰性
533	R5.6.24	福山市	雌	捕獲	成獣	120	45	R5.7.11	陰性
534	R5.6.30	三原市	雄	捕獲	成獣	70	25	R5.7.11	陰性
535	R5.6.30	三原市	雌	捕獲	成獣	80	60	R5.7.11	陰性
536	R5.6.30	三原市	雄	捕獲	成獣	70	40	R5.7.11	陰性
537	R5.7.2	三原市	雌	捕獲	成獣	60	20	R5.7.11	陰性
538	R5.7.3	三原市	雌	捕獲	成獣	120	45	R5.7.11	陰性
539	R5.7.3	三原市	雄	捕獲	成獣	125	75	R5.7.11	陰性
540	R5.7.4	三原市	雌	捕獲	幼獣	45	6	R5.7.11	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
541	R5.7.6	神石高原町	雌	捕獲	成獣	100	60	R5.7.14	陰性
542	R5.7.6	江田島市	雌	捕獲	成獣	120	90	R5.7.14	陰性
543	R5.7.7	江田島市	雌	捕獲	成獣	70	40	R5.7.14	陰性
544	R5.7.9	三次市	雌	捕獲	成獣	120	100	R5.7.14	陰性
545	R5.7.9	三次市	雄	捕獲	成獣	70	40	R5.7.14	陰性
546	R5.7.8	福山市	雄	捕獲	成獣	120	60	R5.7.14	陰性
547	R5.7.11	東広島市	雌	捕獲	成獣	90	40	R5.7.21	陰性
548	R5.7.8	福山市	雌	捕獲	成獣	150	60	R5.7.21	陰性
549	R5.7.9	福山市	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.7.21	陰性
550	R5.7.9	福山市	雄	捕獲	幼獣	50	10	R5.7.21	陰性
551	R5.7.10	福山市	雄	捕獲	成獣	90	40	R5.7.21	陰性
552	R5.7.12	福山市	雌	捕獲	幼獣	60	5	R5.7.21	陰性
553	R5.7.12	福山市	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.7.21	陰性
554	R5.7.10	福山市	雄	捕獲	成獣	120	70	R5.7.21	陰性
555	R5.7.12	府中市	雄	捕獲	幼獣	50	15	R5.7.21	陰性
556	R5.7.6	三原市	雌	捕獲	成獣	70	40	R5.7.21	陰性
557	R5.7.6	三原市	雌	捕獲	成獣	65	30	R5.7.21	陰性
558	R5.7.7	三原市	雌	捕獲	成獣	60	20	R5.7.21	陰性
559	R5.7.7	三原市	雄	捕獲	成獣	80	50	R5.7.21	陰性
560	R5.7.10	三原市	雄	捕獲	成獣	75	40	R5.7.21	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
561	R5.7.10	三原市	雄	捕獲	成獣	75	30	R5.7.21	陰性
562	R5.7.12	三原市	雄	捕獲	成獣	100	40	R5.7.21	陰性
563	R5.7.12	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	4	R5.7.21	陰性
564	R5.7.10	江田島市	雄	捕獲	成獣	120	80	R5.7.21	陰性
565	R5.7.13	東広島市	雄	捕獲	幼獣	90	35	R5.7.21	陰性
566	R5.7.12	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	70	50	R5.7.21	陰性
567	R5.6.25	呉市	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.7.21	陰性
568	R5.6.25	呉市	雌	捕獲	幼獣	70	20	R5.7.21	陰性
569	R5.6.28	呉市	雌	捕獲	成獣	90	40	R5.7.21	陰性
570	R5.7.1	呉市	雌	捕獲	幼獣	50	20	R5.7.21	陰性
571	R5.7.2	呉市	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.7.21	陰性
572	R5.7.13	大竹市	雌	捕獲	幼獣	60	15	R5.7.21	陰性
573	R5.7.14	福山市	雄	捕獲	成獣	90	40	R5.7.21	陰性
574	R5.7.15	府中市	雌	捕獲	成獣	120	60	R5.7.21	陰性
575	R5.7.14	府中町	雄	死亡	幼獣	50	2	R5.7.21	陰性
576	R5.7.14	広島市	雌	死亡	幼獣	50	2	R5.7.21	陰性
577	R5.7.17	府中市	雄	捕獲	成獣	150	80	R5.7.25	陰性
578	R5.7.15	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	50	15	R5.7.25	陰性
579	R5.7.11	竹原市	雌	捕獲	幼獣	45	12	R5.7.25	陰性
580	R5.7.12	竹原市	雌	捕獲	幼獣	30	11	R5.7.25	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
581	R5.7.15	竹原市	雌	捕獲	成獣	85	65	R5.7.25	陰性
582	R5.7.15	竹原市	雌	捕獲	成獣	111	80	R5.7.25	陰性
583	R5.7.16	竹原市	雄	捕獲	成獣	70	60	R5.7.25	陰性
584	R5.7.18	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	50	6	R5.7.25	陰性
585	R5.7.14	坂町	雌	捕獲	成獣	100	60	R5.7.25	陰性
586	R5.7.18	坂町	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.7.25	陰性
587	R5.7.14	江田島市	雄	捕獲	幼獣	60	20	R5.7.25	陰性
588	R5.7.17	江田島市	雄	捕獲	成獣	120	70	R5.7.25	陰性
589	R5.7.11	三原市	雄	捕獲	成獣	75	30	R5.7.25	陰性
590	R5.7.14	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	5	R5.7.25	陰性
591	R5.7.15	三原市	雌	捕獲	成獣	65	30	R5.7.25	陰性
592	R5.7.15	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	7	R5.7.25	陰性
593	R5.7.16	三原市	雌	捕獲	成獣	120	50	R5.7.25	陰性
594	R5.7.17	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	10	R5.7.25	陰性
595	R5.7.18	三原市	雌	捕獲	成獣	90	15	R5.7.25	陰性
596	R5.7.18	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	6	R5.7.25	陰性
597	R5.7.19	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	15	R5.7.25	陰性
598	R5.7.19	神石高原町	雄	捕獲	成獣	90	80	R5.7.25	陰性
599	R5.7.13	福山市	雄	捕獲	成獣	140	50	R5.7.25	陰性
600	R5.7.14	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	5	R5.7.25	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
601	R5.7.17	福山市	雄	捕獲	成獣	160	70	R5.7.25	陰性
602	R5.7.18	福山市	雌	捕獲	幼獣	60	6	R5.7.25	陰性
603	R5.7.18	福山市	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.7.25	陰性
604	R5.7.19	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	65	18	R5.7.28	陰性
605	R5.7.21	大竹市	雄	捕獲	幼獣	50	12	R5.7.28	陰性
606	R5.6.29	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	125	90	R5.7.28	陰性
607	R5.7.7	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	100	60	R5.7.28	陰性
608	R5.7.14	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	110	90	R5.7.28	陰性
609	R5.7.20	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	80	35	R5.7.28	陰性
610	R5.7.20	大崎上島町	雌	捕獲	幼獣	35	7	R5.7.28	陰性
611	R5.7.19	福山市	雌	捕獲	成獣	150	80	R5.7.28	陰性
612	R5.7.23	福山市	雌	捕獲	幼獣	35	3	R5.7.28	陰性
613	R5.7.24	神石高原町	雄	捕獲	成獣	80	50	R5.8.1	陰性
614	R5.7.18	竹原市	雌	捕獲	幼獣	35	9	R5.8.1	陰性
615	R5.7.21	竹原市	雌	捕獲	幼獣	32	12	R5.8.1	陰性
616	R5.7.21	竹原市	雄	捕獲	幼獣	10	9	R5.8.1	陰性
617	R5.7.21	竹原市	雄	捕獲	成獣	120	120	R5.8.1	陰性
618	R5.7.23	竹原市	雌	捕獲	幼獣	30	10	R5.8.1	陰性
619	R5.7.24	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	100	40	R5.8.1	陰性
620	R5.7.25	府中市	雄	捕獲	成獣	110	35	R5.8.1	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
621	R5.7.27	福山市	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.8.1	陰性
622	R5.7.19	三原市	雌	捕獲	成獣	70	30	R5.8.1	陰性
623	R5.7.19	三原市	雌	捕獲	幼獣	30	7	R5.8.1	陰性
624	R5.7.19	三原市	雌	捕獲	幼獣	45	18	R5.8.1	陰性
625	R5.7.19	三原市	雄	捕獲	成獣	90	40	R5.8.1	陰性
626	R5.7.20	三原市	雌	捕獲	成獣	60	20	R5.8.1	陰性
627	R5.7.20	三原市	雄	捕獲	成獣	90	35	R5.8.1	陰性
628	R5.7.21	三原市	雌	捕獲	幼獣	30	8	R5.8.1	陰性
629	R5.7.21	三原市	雌	捕獲	成獣	70	50	R5.8.1	陰性
630	R5.7.21	三原市	雌	捕獲	成獣	90	45	R5.8.1	陰性
631	R5.7.22	三原市	雄	捕獲	幼獣	30	5	R5.8.1	陰性
632	R5.7.22	三原市	雌	捕獲	成獣	40	20	R5.8.1	陰性
633	R5.7.23	三原市	雌	捕獲	成獣	95	30	R5.8.1	陰性
634	R5.7.23	三原市	雌	捕獲	幼獣	70	15	R5.8.1	陰性
635	R5.7.24	三原市	雄	捕獲	幼獣	35	7	R5.8.1	陰性
636	R5.7.25	三原市	雄	捕獲	幼獣	35	8	R5.8.1	陰性
637	R5.7.25	三原市	雄	捕獲	成獣	90	30	R5.8.1	陰性
638	R5.7.26	三原市	雌	捕獲	成獣	90	30	R5.8.1	陰性
639	R5.7.27	大竹市	雄	捕獲	幼獣	55	20	R5.8.1	陰性
640	R5.7.28	府中市	雌	捕獲	成獣	120	35	R5.8.4	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
641	R5.7.30	府中市	雌	捕獲	成獣	100	20	R5.8.4	陰性
642	R5.7.22	福山市	雄	捕獲	成獣	100	50	R5.8.4	陰性
643	R5.7.22	福山市	不明	捕獲	成獣	100	40	R5.8.4	陰性
644	R5.7.23	福山市	雌	捕獲	幼獣	50	10	R5.8.4	陰性
645	R5.7.23	福山市	雌	捕獲	成獣	150	50	R5.8.4	陰性
646	R5.7.26	福山市	雄	捕獲	成獣	100	40	R5.8.4	陰性
647	R5.7.27	福山市	雌	捕獲	幼獣	50	10	R5.8.4	陰性
648	R5.7.28	福山市	雄	捕獲	成獣	60	5	R5.8.4	陰性
649	R5.7.28	福山市	雌	捕獲	成獣	120	30	R5.8.4	陰性
650	R5.7.28	福山市	雄	捕獲	幼獣	50	10	R5.8.4	陰性
651	R5.7.28	福山市	雌	捕獲	幼獣	50	10	R5.8.4	陰性
652	R5.7.29	福山市	雌	捕獲	成獣	100	30	R5.8.4	陰性
653	R5.7.29	福山市	雄	捕獲	成獣	100	40	R5.8.4	陰性
654	R5.7.29	大竹市	雌	捕獲	成獣	100	50	R5.8.4	陰性
655	R5.7.30	江田島市	雄	捕獲	成獣	80	30	R5.8.8	陰性
656	R5.7.26	竹原市	雄	捕獲	幼獣	30	10	R5.8.8	陰性
657	R5.7.26	竹原市	雄	捕獲	成獣	43	50	R5.8.8	陰性
658	R5.7.29	竹原市	雄	捕獲	成獣	45	51	R5.8.8	陰性
659	R5.7.29	竹原市	雌	捕獲	成獣	60	55	R5.8.8	陰性
660	R5.7.30	竹原市	雌	捕獲	幼獣	30	5	R5.8.8	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
661	R5.7.28	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	100	28	R5.8.8	陰性
662	R5.7.26	福山市	雌	捕獲	成獣	160	70	R5.8.8	陰性
663	R5.7.27	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	40	R5.8.8	陰性
664	R5.7.30	福山市	雄	捕獲	成獣	120	50	R5.8.8	陰性
665	R5.7.30	福山市	雄	捕獲	成獣	100	30	R5.8.8	陰性
666	R5.7.31	福山市	雌	捕獲	成獣	130	40	R5.8.8	陰性
667	R5.7.31	福山市	雄	捕獲	幼獣	50	10	R5.8.8	陰性
668	R5.7.31	府中市	雄	捕獲	幼獣	50	10	R5.8.8	陰性
669	R5.8.3	福山市	雄	捕獲	成獣	80	40	R5.8.18	陰性
670	R5.8.1	福山市	雄	捕獲	成獣	70	60	R5.8.18	陰性
671	R5.8.2	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	60	8	R5.8.18	陰性
672	R5.7.30	竹原市	雄	捕獲	成獣	80	45	R5.8.18	陰性
673	R5.7.31	竹原市	雄	捕獲	成獣	60	50	R5.8.18	陰性
674	R5.8.1	竹原市	雌	捕獲	成獣	80	60	R5.8.18	陰性
675	R5.8.1	竹原市	雄	捕獲	成獣	90	90	R5.8.18	陰性
676	R5.8.2	竹原市	雄	捕獲	成獣	120	120	R5.8.18	陰性
677	R5.8.4	竹原市	雌	捕獲	幼獣	50	7	R5.8.18	陰性
678	R5.8.5	府中市	雄	捕獲	幼獣	60	5	R5.8.18	陰性
679	R5.8.5	福山市	雄	捕獲	成獣	150	70	R5.8.18	陰性
680	R5.8.5	福山市	雌	捕獲	成獣	150	80	R5.8.22	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
681	R5.8.4	神石高原町	不明	捕獲	幼獣	45	15	R5.8.22	陰性
682	R5.8.5	神石高原町	不明	捕獲	幼獣	45	15	R5.8.22	陰性
683	R5.8.6	神石高原町	不明	捕獲	幼獣	40	15	R5.8.22	陰性
684	R5.8.8	神石高原町	不明	捕獲	幼獣	45	15	R5.8.22	陰性
685	R5.8.8	神石高原町	不明	捕獲	成獣	80	50	R5.8.22	陰性
686	R5.8.8	大竹市	雌	捕獲	幼獣	55	20	R5.8.22	陰性
687	R5.8.8	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	90	40	R5.8.22	陰性
688	R5.8.8	安芸高田市	雌	捕獲	幼獣	40	3	R5.8.22	陰性
689	R5.8.8	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	75	30	R5.8.22	陰性
690	R5.8.1	福山市	雄	捕獲	成獣	60	40	R5.8.22	陰性
691	R5.8.9	福山市	雌	捕獲	成獣	60	40	R5.8.22	陰性
692	R5.8.10	福山市	雄	捕獲	成獣	50	30	R5.8.22	陰性
693	R5.8.9	竹原市	雄	捕獲	幼獣	40	7	R5.8.22	陰性
694	R5.8.9	竹原市	雄	捕獲	成獣	60	50	R5.8.22	陰性
695	R5.8.10	竹原市	雄	捕獲	幼獣	30	6	R5.8.22	陰性
696	R5.8.11	竹原市	雄	捕獲	幼獣	40	8	R5.8.22	陰性
697	R5.8.12	竹原市	雌	捕獲	幼獣	40	7	R5.8.22	陰性
698	R5.8.12	竹原市	雄	捕獲	幼獣	40	7	R5.8.22	陰性
699	R5.8.16	竹原市	雄	捕獲	成獣	75	80	R5.8.22	陰性
700	R5.8.15	坂町	雄	捕獲	幼獣	65	35	R5.8.22	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
701	R5.8.17	庄原市	雄	死亡	成獣	80	12	R5.8.22	陰性
702	R5.8.18	府中市	雄	捕獲	成獣	100	30	R5.8.25	陰性
703	R5.8.18	庄原市	雄	捕獲	成獣	70	45	R5.8.25	陰性
704	R5.8.19	庄原市	雄	捕獲	成獣	80	70	R5.8.25	陰性
705	R5.8.20	大竹市	雄	捕獲	成獣	55	20	R5.8.25	陰性
706	R5.8.18	広島市	雌	死亡	成獣	70	20	R5.8.25	陽性
707	R5.8.20	坂町	雌	捕獲	幼獣	40	2	R5.8.29	陽性
708	R5.8.20	坂町	雌	捕獲	成獣	80	50	R5.8.29	陰性
709	R5.8.21	坂町	雄	捕獲	幼獣	75	25	R5.8.29	陰性
710	R5.8.19	庄原市	雌	捕獲	成獣	60	35	R5.8.29	陰性
711	R5.8.22	神石高原町	不明	捕獲	幼獣	50	10	R5.9.1	陰性
712	R5.8.24	庄原市	雄	捕獲	成獣	80	72	R5.9.1	陰性
713	R5.8.27	東広島市	雌	捕獲	成獣	110	60	R5.9.1	陰性
714	R5.8.20	大竹市	雌	捕獲	幼獣	45	7	R5.9.1	陰性
715	R5.8.28	庄原市	雄	捕獲	成獣	70	51.5	R5.9.1	陰性
716	R5.8.27	東広島市	雄	死亡	成獣	100	50	R5.9.1	陽性
717	R5.8.29	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	50	8	R5.9.5	陰性
718	R5.8.26	坂町	雄	捕獲	幼獣	60	20	R5.9.5	陰性
719	R5.8.28	江田島市	雄	捕獲	成獣	100	50	R5.9.5	陰性
720	R5.8.28	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	60	20	R5.9.5	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
721	R5.8.31	大竹市	雌	捕獲	成獣	110	50	R5.9.5	陰性
722	R5.9.1	大竹市	雌	捕獲	成獣	110	60	R5.9.8	陰性
723	R5.9.2	大竹市	雌	捕獲	成獣	100	25	R5.9.8	陰性
724	R5.8.30	坂町	雌	捕獲	成獣	80	30	R5.9.8	陰性
725	R5.9.3	廿日市市	不明	捕獲	成獣	130	60	R5.9.8	陰性
726	R5.9.2	坂町	雌	捕獲	成獣	90	40	R5.9.12	陽性
727	R5.9.4	坂町	雌	捕獲	不明	75	15	R5.9.12	陽性
728	R5.9.5	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	110	40	R5.9.12	陰性
729	R5.9.9	東広島市	雄	捕獲	成獣	120	70	R5.9.15	陰性
730	R5.9.9	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	105	40	R5.9.15	陰性
731	R5.9.9	坂町	雄	捕獲	成獣	90	35	R5.9.22	陽性
732	R5.9.9	坂町	雄	捕獲	成獣	135	80	R5.9.22	陰性
733	R5.9.15	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	50	4	R5.9.22	陰性
734	R5.10.16	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	90	20	R5.10.27	陰性
735	R5.10.17	廿日市市	不明	捕獲	幼獣	80	15	R5.10.27	陰性
736	R5.10.17	府中市	雌	捕獲	成獣	100	30	R5.10.27	陰性
737	R5.10.22	福山市	雄	死亡	成獣	80	40	R5.10.27	陰性
738	R5.10.23	世羅町	雄	捕獲	成獣	130	78	R5.10.31	陰性
739	R5.10.31	東広島市	雌	捕獲	幼獣	70	15	R5.10.31	陰性
740	R5.10.31	東広島市	雌	捕獲	幼獣	70	15	R5.11.10	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
741	R5.10.23	安芸太田町	雌	捕獲	幼獣	50	20	R5.11.10	陰性
742	R5.10.23	安芸太田町	不明	捕獲	幼獣	40	10	R5.11.10	陰性
743	R5.10.31	安芸太田町	雄	捕獲	幼獣	40	10	R5.11.10	陰性
744	R5.11.3	世羅町	雄	捕獲	成獣	120	67	R5.11.10	陰性
745	R5.11.11	広島市	雌	死亡	成獣	130	60	R5.11.17	陰性
746	R5.11.22	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	80	25	R5.12.1	陰性
747	R5.11.23	福山市	雄	死亡	幼獣	80	12	R5.12.1	陰性
748	R5.11.23	福山市	雌	死亡	成獣	120	60	R5.12.1	陰性
749	R5.12.3	廿日市市	雌	捕獲	成獣	130	60	R5.12.8	陰性
750	R5.12.5	世羅町	雌	捕獲	成獣	125	75	R5.12.8	陰性
751	R5.12.5	世羅町	雌	捕獲	成獣	80	30	R5.12.8	陰性
752	R5.12.9	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	100	15	R5.12.15	陰性
753	R5.12.12	府中市	雌	捕獲	幼獣	60	15	R5.12.15	陰性
754	R5.12.16	三原市	雄	捕獲	成獣	140	80	R5.12.21	陰性
755	R5.12.17	三原市	雄	捕獲	成獣	100	40	R5.12.21	陰性
756	R5.12.17	三原市	雌	捕獲	成獣	160	90	R5.12.21	陰性
757	R5.12.24	三原市	雌	捕獲	成獣	100	50	R6.1.12	陰性
758	R5.12.24	三原市	雄	捕獲	成獣	110	60	R6.1.12	陰性
759	R5.12.24	三原市	雄	捕獲	成獣	120	70	R6.1.12	陰性
760	R5.12.23	三原市	雌	捕獲	成獣	120	60	R6.1.12	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
761	R5.12.22	三原市	雌	捕獲	成獣	130	80	R6.1.12	陰性
762	R5.12.25	三原市	雌	捕獲	成獣	100	30	R6.1.12	陰性
763	R5.12.25	三原市	雄	捕獲	成獣	80	25	R6.1.12	陰性
764	R6.1.4	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	70	30	R6.1.16	陽性
765	R6.1.21	廿日市市	雌	捕獲	成獣	100	20	R6.1.26	陰性
766	R6.1.7	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	110	60	R6.1.26	陰性
767	R6.1.19	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	70	45	R6.1.30	陰性
768	R6.1.24	尾道市	雌	捕獲	幼獣	60	12	R6.2.2	陰性
769	R6.1.26	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	70	45	R6.2.2	陰性
770	R6.1.30	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	110	50	R6.2.2	陰性
771	R6.1.31	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	85	70	R6.2.6	陰性
772	R6.1.30	府中市	雄	捕獲	幼獣	60	15	R6.2.6	陽性
773	R6.2.4	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	125	50	R6.2.16	陽性
774	R6.2.5	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	78	27	R6.2.16	陰性
775	R6.2.10	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	90	25	R6.2.16	陰性
776	R6.2.14	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	100	40	R6.2.20	陰性
777	R6.2.16	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	130	70	R6.2.22	陰性
778	R6.2.16	廿日市市	雄	捕獲	成獣	120	50	R6.2.22	陰性
779	R6.2.17	廿日市市	雄	捕獲	成獣	110	30	R6.2.22	陰性
780	R6.2.19	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	90	45	R6.2.22	陰性

【広島県】

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
781	R6.2.25	尾道市	雌	死亡	成獣	80	50	R6.3.1	陰性
782	R6.2.25	安芸高田市	不明	捕獲	幼獣	80	15	R6.3.4	陽性
783	R6.2.26	三次市	雌	捕獲	成獣	80	40	R6.3.4	陰性
784	R6.2.28	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	60	25	R6.3.4	陰性
785	R6.2.28	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	60	10	R6.3.4	陽性
786	R6.3.1	福山市	雄	捕獲	成獣	100	30	R6.3.8	陰性
787	R6.3.3	福山市	雌	捕獲	成獣	120	60	R6.3.8	陽性
788	R6.3.4	福山市	雄	捕獲	成獣	80	20	R6.3.8	陰性
789	R6.3.1	三原市	雌	捕獲	成獣	77	28	R6.3.12	陰性
790	R6.3.2	三原市	雌	捕獲	成獣	125	65	R6.3.12	陰性
791	R6.3.1	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	10	R6.3.12	陰性
792	R6.3.1	尾道市	雄	捕獲	成獣	110	30	R6.3.15	陰性
793	R6.3.12	府中町	雄	捕獲	成獣	90	50	R6.3.15	陽性
794	R6.3.10	三原市	雄	捕獲	成獣	90	30	R6.3.19	陰性
795	R6.3.6	三原市	雄	捕獲	成獣	100	50	R6.3.19	陰性
796	R6.3.22	尾道市	雄	死亡	成獣	120	60	R6.3.29	陽性
797	R6.4.10	福山市	雄	死亡	幼獣	80	8	R6.4.16	陽性
798	R6.6.2	安芸高田市	雄	死亡	成獣	100	30	R6.6.7	陽性
799	R6.6.14	尾道市	雄	捕獲	成獣	120	80	R6.6.21	陰性
800	R6.6.16	尾道市	雄	捕獲	成獣	60	40	R6.6.21	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
801	R6.6.16	尾道市	雄	捕獲	成獣	60	40	R6.6.21	陰性
802	R6.6.16	尾道市	雄	捕獲	成獣	60	40	R6.6.21	陰性
803	R6.6.16	福山市	雄	捕獲	成獣	120	50	R6.6.21	陰性
804	R6.6.18	江田島市	雌	捕獲	成獣	80	40	R6.6.28	陰性
805	R6.6.19	庄原市	雌	捕獲	成獣	60	35	R6.6.28	陰性
806	R6.6.19	庄原市	雄	捕獲	成獣	65	37	R6.6.28	陰性
807	R6.6.14	三原市	雌	捕獲	成獣	125	90	R6.6.28	陰性
808	R6.6.15	三原市	雄	捕獲	成獣	95	35	R6.6.28	陰性
809	R6.6.16	三原市	雌	捕獲	成獣	100	30	R6.6.28	陰性
810	R6.6.15	三原市	雄	捕獲	成獣	140	50	R6.6.28	陽性
811	R6.6.15	三原市	雄	捕獲	成獣	100	60	R6.6.28	陰性
812	R6.6.18	三原市	雌	捕獲	成獣	120	70	R6.6.28	陰性
813	R6.6.20	府中市	雄	捕獲	成獣	100	50	R6.6.28	陰性
814	R6.6.21	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	60	20	R6.6.28	陰性
815	R6.6.21	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	60	20	R6.6.28	陰性
816	R6.6.24	府中市	雌	捕獲	成獣	120	60	R6.7.2	陰性
817	R6.6.19	竹原市	雄	捕獲	成獣	35	23	R6.7.2	陰性
818	R6.6.20	竹原市	雄	捕獲	幼獣	32	20	R6.7.2	陰性
819	R6.6.21	竹原市	雄	捕獲	幼獣	40	50	R6.7.2	陰性
820	R6.6.22	竹原市	雄	捕獲	成獣	100	100	R6.7.2	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
821	R6.6.25	竹原市	雌	捕獲	成獣	100	60	R6.7.2	陰性
822	R6.6.25	北広島町	雄	捕獲	成獣	110	60	R6.7.2	陰性
823	R6.6.22	三原市	雌	捕獲	成獣	90	40	R6.7.2	陰性
824	R6.6.26	三原市	雄	捕獲	成獣	90	40	R6.7.2	陰性
825	R6.6.26	三原市	雄	捕獲	幼獣	45	6	R6.7.2	陰性
826	R6.6.27	府中市	雌	捕獲	成獣	110	25.0	R6.7.5	陽性
827	R6.6.19	坂町	雌	捕獲	幼獣	30	1.0	R6.7.5	陰性
828	R6.6.30	福山市	雄	捕獲	成獣	100	80.0	R6.7.5	陰性
829	R6.6.30	福山市	雌	捕獲	成獣	120	85.0	R6.7.5	陰性
830	R6.7.1	世羅町	雄	捕獲	成獣	110	43.6	R6.7.9	陰性
831	R6.6.30	三次市	雄	捕獲	成獣	60	40.0	R6.7.9	陰性
832	R6.6.30	三次市	雌	捕獲	成獣	50	40.0	R6.7.9	陰性
833	R6.6.26	三原市	雄	捕獲	幼獣	40	3.0	R6.7.9	陰性
834	R6.6.30	三原市	雌	捕獲	成獣	120	50.0	R6.7.9	陰性
835	R6.7.2	三原市	雄	捕獲	成獣	110	50.0	R6.7.9	陰性
836	R6.6.28	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	4.0	R6.7.9	陰性
837	R6.6.30	三原市	雌	捕獲	成獣	120	65.0	R6.7.9	陰性
838	R6.6.30	三原市	雄	捕獲	成獣	70	12.0	R6.7.9	陽性
839	R6.7.1	三原市	雄	捕獲	幼獣	55	10.0	R6.7.9	陰性
840	R6.6.29	北広島町	雌	捕獲	成獣	110	35.0	R6.7.9	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
841	R6.7.4	福山市	雄	捕獲	成獣	130	85	R6.7.12	陰性
842	R6.6.27	坂町	雌	捕獲	成獣	80	70	R6.7.12	陰性
843	R6.6.29	呉市	雌	捕獲	成獣	110	60	R6.7.12	陰性
844	R6.7.1	呉市	雌	捕獲	成獣	100	50	R6.7.12	陰性
845	R6.7.2	呉市	雌	捕獲	成獣	100	90	R6.7.12	陰性
846	R6.7.2	呉市	雄	捕獲	成獣	90	40	R6.7.12	陰性
847	R6.7.3	呉市	雌	捕獲	成獣	100	60	R6.7.12	陰性
848	R6.7.6	東広島市	雌	捕獲	成獣	120	60	R6.7.12	陰性
849	R6.6.29	尾道市	雄	捕獲	成獣	120	30	R6.7.12	陰性
850	R6.6.25	竹原市	雄	捕獲	成獣	70	70	R6.7.12	陰性
851	R6.6.27	竹原市	雄	捕獲	成獣	80	70	R6.7.12	陰性
852	R6.7.3	竹原市	雄	捕獲	成獣	40	20	R6.7.12	陰性
853	R6.7.4	竹原市	雌	捕獲	成獣	80	70	R6.7.12	陰性
854	R6.7.6	竹原市	雄	捕獲	成獣	70	70	R6.7.12	陰性
855	R6.7.7	竹原市	雄	捕獲	幼獣	30	20	R6.7.12	陰性
856	R6.7.3	三原市	雌	捕獲	幼獣	30	5	R6.7.19	陰性
857	R6.7.3	三原市	雄	捕獲	成獣	120	90	R6.7.19	陰性
858	R6.7.7	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	4	R6.7.19	陰性
859	R6.7.4	三原市	雌	捕獲	幼獣	90	30	R6.7.19	陰性
860	R5.7.4	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	15	R6.7.19	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
861	R6.7.4	三原市	雌	捕獲	成獣	90	50	R6.7.19	陰性
862	R6.7.5	三原市	雄	捕獲	幼獣	40	3	R6.7.19	陰性
863	R6.7.7	三原市	雌	捕獲	成獣	118	65	R6.7.19	陰性
864	R6.7.8	三原市	雄	捕獲	成獣	70	25	R6.7.19	陰性
865	R6.7.11	府中市	雄	捕獲	成獣	80	30	R6.7.19	陰性
866	R6.7.15	福山市	雌	捕獲	幼獣	40	3	R6.7.19	陰性
867	R6.7.15	福山市	雄	捕獲	成獣	70	35	R6.7.19	陰性
868	R6.7.10	世羅町	雄	捕獲	成獣	125	65	R6.7.19	陰性
869	R6.7.16	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	5	R6.7.19	陰性
870	R6.7.14	神石高原町	雌	捕獲	成獣	80	80	R6.7.19	陰性
871	R6.7.6	広島市	雌	捕獲	成獣	110	40	R6.7.19	陰性
872	R6.7.11	三原市	雌	捕獲	成獣	100	40	R6.7.23	陰性
873	R6.7.13	三原市	雄	捕獲	成獣	130	70	R6.7.23	陰性
874	R6.7.15	三原市	雌	捕獲	成獣	120	60	R6.7.23	陽性
875	R6.7.16	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	10	R6.7.23	陽性
876	R6.7.13	三原市	雌	捕獲	成獣	100	60	R6.7.23	陰性
877	R6.7.13	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	5	R6.7.23	陰性
878	R6.7.15	三原市	雄	捕獲	成獣	100	50	R6.7.23	陰性
879	R6.7.15	三原市	雄	捕獲	成獣	100	40	R6.7.23	陰性
880	R6.7.17	江田島市	雌	捕獲	成獣	70	30	R6.7.23	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
881	R6.7.9	坂町	雌	捕獲	成獣	110	45	R6.7.23	陰性
882	R6.7.18	福山市	雌	捕獲	成獣	120	50	R6.7.23	陰性
883	R6.7.16	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	60	30	R6.7.23	陰性
884	R6.7.18	江田島市	雌	捕獲	成獣	60	30	R6.7.26	陰性
885	R6.7.19	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	10	R6.7.26	陰性
886	R6.7.19	庄原市	雄	捕獲	幼獣	50	26	R6.7.26	陽性
887	R6.7.14	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	115	60	R6.7.26	陰性
888	R6.7.15	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	95	40	R6.7.26	陰性
889	R6.7.15	福山市	雌	捕獲	幼獣	70	10	R6.7.26	陰性
890	R6.7.16	福山市	雌	捕獲	幼獣	70	10	R6.7.26	陰性
891	R6.7.20	福山市	雄	捕獲	成獣	90	35	R6.7.26	陰性
892	R6.7.19	世羅町	雌	捕獲	成獣	110	43.4	R6.7.26	陰性
893	R6.7.21	世羅町	雌	捕獲	成獣	85	30	R6.7.26	陰性
894	R6.7.19	熊野町	雄	捕獲	幼獣	80	20	R6.7.26	陰性
895	R6.7.19	神石高原町	雄	捕獲	成獣	90～100	80～100	R6.7.26	陰性
896	R6.7.20	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	115	90	R6.7.30	陰性
897	R6.7.23	福山市	雌	捕獲	成獣	70	30～35	R6.7.30	陰性
898	R6.7.19	坂町	雌	捕獲	幼獣	57	2	R6.7.30	陰性
899	R6.7.25	庄原市	雌	捕獲	成獣	60	40	R6.7.30	陰性
900	R6.7.24	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5	R6.7.30	陰性

【広島県】

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
901	R6.7.16	福山市	雌	捕獲	成獣	100	45	R6.8.2	陰性
902	R6.7.25	尾道市	雄	捕獲	成獣	100	60	R6.8.2	陰性
903	R6.7.26	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5	R6.8.2	陰性
904	R6.7.28	東広島市	雄	捕獲	成獣	120	60	R6.8.2	陰性
905	R6.7.19	竹原市	雄	捕獲	幼獣	30	10	R6.8.2	陰性
906	R6.7.23	竹原市	雄	捕獲	幼獣	30	10	R6.8.2	陰性
907	R6.7.23	竹原市	雄	捕獲	成獣	80	60	R6.8.2	陰性
908	R6.7.24	竹原市	雄	捕獲	成獣	50	50	R6.8.2	陰性
909	R6.7.26	竹原市	雄	捕獲	成獣	110	120	R6.8.2	陰性
910	R6.7.25	熊野町	雌	捕獲	成獣	130	70	R6.8.2	陰性
911	R6.7.27	福山市	雌	捕獲	成獣	100	65	R6.8.2	陰性
912	R6.7.28	福山市	雌	捕獲	成獣	110	50	R6.8.2	陰性
913	R6.7.23	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	15	R6.8.2	陰性
914	R6.7.29	福山市	雌	捕獲	成獣	100	50	R6.8.2	陰性
915	R6.7.31	神石高原町	雄	捕獲	成獣	60	50	R6.8.6	陰性
916	R6.7.31	神石高原町	不明	捕獲	幼獣	30	20	R6.8.6	陰性
917	R6.7.29	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	3	R6.8.6	陽性
918	R6.7.25	世羅町	雄	捕獲	成獣	105	38	R6.8.6	陰性
919	R6.7.29	竹原市	雄	捕獲	幼獣	40	5.0	R6.8.9	陰性
920	R6.7.30	竹原市	雄	捕獲	成獣	100	70.0	R6.8.9	陰性

【広島県】

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
921	R6.7.27	呉市	雄	捕獲	成獣	110	70.0	R6.8.9	陰性
922	R6.8.2	呉市	雌	捕獲	成獣	100	60.0	R6.8.9	陰性
923	R6.8.3	呉市	雌	捕獲	成獣	90	50.0	R6.8.9	陰性
924	R6.8.2	福山市	雄	捕獲	成獣	80～90	35～40	R6.8.9	陰性
925	R6.8.2	神石高原町	雌	捕獲	成獣	70	30.0	R6.8.9	陰性
926	R6.8.3	神石高原町	雌	捕獲	成獣	60	25.0	R6.8.9	陰性
927	R6.8.3	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	130	75.0	R6.8.9	陰性
928	R6.7.30	坂町	雌	捕獲	成獣	102	40.2	R6.8.23	陰性
929	R6.8.5	福山市	雌	捕獲	成獣	110	70.0	R6.8.23	陰性
930	R6.8.5	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	80	50.0	R6.8.23	陰性
931	R6.8.3	世羅町	雄	捕獲	成獣	110	59.0	R6.8.27	陰性
932	R6.8.4	世羅町	雄	捕獲	成獣	115	60.0	R6.8.27	陰性
933	R6.8.6	神石高原町	雄	捕獲	成獣	80	50.0	R6.8.27	陰性
934	R6.8.7	神石高原町	雄	捕獲	成獣	90	70.0	R6.8.27	陰性
935	R6.8.1	三原市	雄	捕獲	成獣	120	50.0	R6.8.23	陽性
936	R6.8.2	三原市	雄	捕獲	成獣	130	70.0	R6.8.23	陰性
937	R6.8.1	三原市	雌	捕獲	幼獣	55	6.0	R6.8.23	陰性
938	R6.8.1	三原市	雌	捕獲	幼獣	55	6.0	R6.8.23	陰性
939	R6.8.3	三原市	雌	捕獲	成獣	85	25.0	R6.8.23	陰性
940	R6.8.1	三原市	雄	捕獲	幼獣	90	8.0	R6.8.23	陽性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
941	R6.8.3	三原市	雌	捕獲	成獣	140	50.0	R6.8.23	判定不能
942	R6.8.1	三原市	雌	捕獲	成獣	70	25.0	R6.8.23	陰性
943	R6.8.5	三原市	雄	捕獲	成獣	70	30.0	R6.8.23	陽性
944	R6.8.5	三原市	雄	捕獲	成獣	70	10.0	R6.8.23	陰性
945	R6.8.1	福山市	雄	捕獲	幼獣	55	10.0	R6.8.23	陰性
946	R6.8.6	福山市	雄	捕獲	成獣	130	90.0	R6.8.23	陰性
947	R6.8.5	竹原市	雄	捕獲	幼獣	30	6.0	R6.8.27	陰性
948	R6.8.5	竹原市	雄	捕獲	幼獣	30	7.0	R6.8.27	陰性
949	R6.8.6	竹原市	雄	捕獲	成獣	100	50.0	R6.8.27	陰性
950	R6.8.6	竹原市	雌	捕獲	成獣	60	30.0	R6.8.27	陰性
951	R6.8.6	竹原市	雌	捕獲	成獣	40	30.0	R6.8.27	陰性
952	R6.8.8	神石高原町	雄	捕獲	成獣	80	50.0	R6.8.27	陰性
953	R6.8.12	東広島市	雌	捕獲	成獣	120	60.0	R6.8.23	陰性
954	R6.8.9	神石高原町	雄	捕獲	成獣	50	15.0	R6.8.27	陰性
955	R6.8.10	神石高原町	雄	捕獲	成獣	45	18.0	R6.8.27	陰性
956	R6.8.10	神石高原町	雌	捕獲	成獣	50	16.0	R6.8.27	陰性
957	R6.8.11	神石高原町	雌	捕獲	成獣	50	18.0	R6.8.27	陰性
958	R6.8.12	福山市	雄	捕獲	成獣	140	60.0	R6.8.23	陰性
959	R6.8.13	福山市	雌	捕獲	幼獣	55	4.0	R6.8.23	陰性
960	R6.8.7	三原市	雌	捕獲	成獣	120	70.0	R6.8.23	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
961	R6.8.11	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R6.8.23	陰性
962	R6.8.13	江田島市	雌	捕獲	幼獣	40	5.0	R6.8.23	陰性
963	R6.8.6	世羅町	雄	捕獲	成獣	105	45.0	R6.8.27	陰性
964	R6.8.11	福山市	雌	捕獲	成獣	80	30.0	R6.8.23	陰性
965	R6.8.15	福山市	雌	捕獲	成獣	110	45.0	R6.8.23	陰性
966	R6.8.16	熊野町	雄	捕獲	幼獣	50	7.0	R6.8.23	陰性
967	R6.8.17	東広島市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	R6.8.23	陰性
968	R6.8.7	竹原市	雌	捕獲	成獣	100	100	R6.8.27	陰性
969	R6.8.9	竹原市	雌	捕獲	成獣	100	80	R6.8.27	陰性
970	R6.8.11	竹原市	雄	捕獲	成獣	80	40	R6.8.27	陰性
971	R6.8.12	竹原市	雄	捕獲	成獣	100	100	R6.8.27	陰性
972	R6.8.12	竹原市	雄	捕獲	成獣	60	40	R6.8.27	陰性
973	R6.8.14	竹原市	雌	捕獲	成獣	80	60	R6.8.27	陰性
974	R6.8.13	福山市	雌	捕獲	幼獣	50	15	R6.8.27	陰性
975	R6.8.16	福山市	雌	捕獲	幼獣	50	20	R6.8.27	陰性
976	R6.8.20	福山市	雌	捕獲	成獣	80	30	R6.8.27	陰性
977	R6.8.9	坂町	雌	捕獲	幼獣	52	3	R6.8.27	陰性
978	R6.8.18	安芸太田町	雄	捕獲	幼獣	50	15	R6.8.27	陰性
979	R6.8.19	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	100	20	R6.8.27	陰性
980	R6.8.19	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	100	19	R6.8.27	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
981	R6.8.19	東広島市	雄	捕獲	幼獣	50	7	R6.8.27	陰性
982	R6.8.20	府中市	雌	捕獲	幼獣	70	20	R6.8.27	陰性
983	R6.8.14	坂町	雌	捕獲	成獣	88	48	R6.8.27	陰性
984	R6.8.15	坂町	雌	捕獲	成獣	65	7	R6.8.27	陰性
985	R6.8.18	坂町	雌	捕獲	成獣	60	7	R6.8.27	陰性
986	R6.8.18	福山市	雄	捕獲	成獣	120	70	R6.8.27	陰性
987	R6.8.20	熊野町	雌	捕獲	成獣	120	70	R6.8.27	陰性
988	R6.8.22	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	100	30	R6.8.27	陰性
989	R6.8.21	福山市	雄	捕獲	成獣	100	80	R6.9.3	陰性
990	R6.9.3	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	5	R6.9.10	陰性
991	R6.8.23	三原市	雌	捕獲	成獣	110	50	R6.9.3	陰性
992	R6.8.23	世羅町	雄	捕獲	成獣	60	7.4	R6.9.3	陰性
993	R6.8.25	福山市	雄	捕獲	幼獣	40	15	R6.9.3	陽性
994	R6.8.26	福山市	雄	捕獲	成獣	130	60	R6.9.3	陰性
995	R6.8.24	呉市	雌	捕獲	成獣	100	60	R6.9.6	陰性
996	R6.8.26	呉市	雄	捕獲	成獣	120	80	R6.9.6	陰性
997	R6.8.22	福山市	雄	捕獲	成獣	90	20	R6.9.6	陰性
998	R6.8.23	福山市	雄	捕獲	成獣	150	90	R6.9.6	陰性
999	R6.8.24	安芸太田町	雌	捕獲	成獣	100	25	R6.9.6	陰性
1000	R6.8.27	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	105	30	R6.9.6	陰性

【広島県】

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1001	R6.8.22	坂町	雄	捕獲	幼獣	50	2	R6.9.6	陰性
1002	R6.8.22	坂町	雄	捕獲	成獣	130	70	R6.9.6	陰性
1003	R6.8.24	坂町	雌	捕獲	成獣	60	20	R6.9.6	陰性
1004	R6.8.23	神石高原町	雄	捕獲	幼獣	40	15	R6.9.6	陽性
1005	R6.8.24	坂町	雌	捕獲	成獣	61	5	R6.9.6	陰性
1006	R6.8.26	坂町	雄	捕獲	成獣	65	6.5	R6.9.6	陰性
1007	R6.9.2	庄原市	不明	死亡	成獣	70	10.0	R6.9.6	陰性
1008	R6.8.31	福山市	雄	捕獲	成獣	120	60	R6.9.10	陰性
1009	R6.9.1	福山市	雄	捕獲	成獣	110	35	R6.9.10	陰性
1010	R6.9.1	福山市	雄	捕獲	成獣	150	80	R6.9.10	陰性
1011	R6.9.1	坂町	雄	捕獲	幼獣	62	10	R6.9.10	陰性
1012	R6.9.2	坂町	雌	捕獲	成獣	65	30	R6.9.10	陰性
1013	R6.9.3	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	125	60	R6.9.10	陰性
1014	R6.8.31	福山市	雌	捕獲	成獣	90	28	R6.9.13	陰性
1015	R6.9.5	東広島市	雄	捕獲	幼獣	60	7	R6.9.13	陰性
1016	R6.9.5	熊野町	雌	捕獲	幼獣	30	4	R6.9.13	陰性
1017	R6.9.7	熊野町	雄	捕獲	幼獣	40	6	R6.9.13	陰性
1018	R6.9.9	大竹市	雌	捕獲	成獣	110	60	R6.9.13	陰性
1019	R6.9.7	福山市	雌	捕獲	成獣	80	18	R6.9.20	陰性
1020	R6.9.4	三原市	雌	捕獲	成獣	120	50	R6.9.20	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1021	R6.9.6	三原市	雌	捕獲	成獣	70	25	R6.9.20	陰性
1022	R6.9.7	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	5	R6.9.20	陰性
1023	R6.9.6	三原市	雌	捕獲	成獣	110	40	R6.9.20	陰性
1024	R6.9.6	三原市	雌	捕獲	成獣	100	40	R6.9.20	陰性
1025	R6.9.7	三原市	雌	捕獲	成獣	120	45	R6.9.20	陰性
1026	R6.9.9	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	4	R6.9.20	陰性
1027	R6.9.7	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	90	40	R6.9.20	陰性
1028	R6.9.11	大竹市	雌	捕獲	成獣	108	40	R6.9.20	陰性
1029	R6.9.11	世羅町	雌	捕獲	成獣	125	72	R6.9.20	陰性
1030	R6.9.8	福山市	雌	捕獲	成獣	120	60	R6.9.20	陰性
1031	R6.9.14	府中市	雄	捕獲	成獣	100	40	R6.9.20	陰性
1032	R6.9.11	呉市	雄	捕獲	成獣	100	50	R6.9.27	陰性
1033	R6.9.12	呉市	雄	捕獲	成獣	100	50	R6.9.27	陰性
1034	R6.9.14	呉市	雌	捕獲	成獣	100	50	R6.9.27	陰性
1035	R6.9.17	大竹市	雌	捕獲	成獣	90	25	R6.9.27	陰性
1036	R6.9.15	福山市	雌	捕獲	成獣	150	80	R6.9.27	陰性
1037	R6.9.9	坂町	雌	捕獲	成獣	100	25	R6.9.27	陰性
1038	R6.9.10	坂町	雄	捕獲	成獣	70	15	R6.9.27	陰性
1039	R6.9.12	坂町	雄	捕獲	成獣	69	14.5	R6.9.27	陰性
1040	R6.9.12	坂町	雄	捕獲	成獣	67	13.5	R6.9.27	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1041	R6.9.10	三原市	雄	捕獲	幼獣	65	10	R6.9.27	陰性
1042	R6.9.10	三原市	雄	捕獲	成獣	120	70	R6.9.27	陽性
1043	R6.9.11	三原市	雌	捕獲	成獣	120	60	R6.9.27	陰性
1044	R6.9.18	府中市	雌	捕獲	成獣	120	50	R6.9.27	陰性
1045	R6.9.16	熊野町	雌	捕獲	成獣	130	50	R6.9.27	陰性
1046	R6.9.19	大竹市	雌	捕獲	成獣	90	20	R6.9.27	陰性
1047	R6.9.14	坂町	雄	捕獲	成獣	118	67	R6.9.27	陰性
1048	R6.9.21	大竹市	雌	捕獲	成獣	123	70	R6.9.27	陰性
1049	R6.9.19	熊野町	不明	捕獲	幼獣	40	3	R6.9.27	陰性
1050	R6.9.18	三原市	雄	捕獲	成獣	60	10	R6.10.1	陽性
1051	R6.9.19	坂町	雄	捕獲	幼獣	53	2	R6.10.1	陰性
1052	R6.9.20	坂町	雌	捕獲	成獣	110	30	R6.10.4	陰性
1053	R6.9.24	福山市	雌	捕獲	成獣	140	30	R6.10.4	陽性
1054	R6.9.23	府中市	雌	捕獲	成獣	120	40	R6.10.4	陰性
1055	R6.9.26	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	60	30	R6.10.4	陰性
1056	R6.9.25	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	5	R6.10.4	陰性
1057	R6.9.24	福山市	雄	捕獲	幼獣	150	70	R6.10.4	陰性
1058	R6.9.21	呉市	雌	捕獲	成獣	90	40	R6.10.8	陰性
1059	R6.10.3	安芸高田市	雄	捕獲	幼獣	50	20	R6.10.11	陰性
1060	R6.9.28	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	120	40	R6.10.11	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1061	R6.10.4	北広島町	雄	捕獲	成獣	100	40	R6.10.11	陰性
1062	R6.10.7	北広島町	雌	捕獲	成獣	70	30	R6.10.11	陰性
1063	R6.10.12	府中市	雌	捕獲	幼獣	70	15	R6.10.18	陰性
1064	R6.10.11	広島市	雄	死亡	成獣	100	60	R6.10.18	陰性
1065	R6.10.13	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	110	45	R6.10.29	陰性
1066	R6.10.25	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	100	50	R6.11.1	陰性
1067	R6.10.26	江田島市	雌	捕獲	成獣	70	30	R6.11.1	陰性
1068	R6.10.27	北広島町	雄	捕獲	成獣	70	30	R6.11.8	陰性
1069	R6.10.29	北広島町	雄	捕獲	成獣	80	30	R6.11.8	陰性
1070	R6.10.26	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	130	60	R6.11.8	陰性
1071	R6.10.26	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	140	50	R6.11.8	陰性
1072	R6.11.7	府中市	雄	捕獲	成獣	50	10	R6.11.12	陰性
1073	R6.11.9	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	30	R6.11.15	陰性
1074	R6.11.7	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	135	80	R6.11.19	陰性
1075	R6.11.7	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	110	40	R6.11.19	陰性
1076	R6.11.8	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	110	50	R6.11.19	陰性
1077	R6.11.9	大崎上島町	雄	捕獲	成獣	120	45	R6.11.19	陰性
1078	R6.11.11	大崎上島町	雌	捕獲	幼獣	60	15	R6.11.19	陰性
1079	R6.11.12	大崎上島町	雌	捕獲	成獣	110	50	R6.11.19	陰性
1080	R6.11.11	熊野町	雄	捕獲	幼獣	70	23	R6.11.19	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1081	R6.11.12	府中市	雌	捕獲	幼獣	60	10	R6.11.19	陰性
1082	R6.11.14	江田島市	雌	捕獲	成獣	70	30	R6.11.22	陰性
1083	R6.11.10	北広島町	雌	捕獲	成獣	70	40	R6.11.22	陰性
1084	R6.11.10	北広島町	雄	捕獲	成獣	70	35	R6.11.22	陰性
1085	R6.11.23	府中市	雄	捕獲	幼獣	50	10	R6.11.29	陰性
1086	R6.12.14	熊野町	雄	捕獲	成獣	80	70	R6.12.20	陰性
1087	R6.12.25	熊野町	雌	捕獲	幼獣	40	25	R7.1.10	陰性
1088	R7.1.17	熊野町	雌	捕獲	幼獣	60	30	R7.1.28	陰性
1089	R7.1.24	江田島市	雌	捕獲	成獣	60	20	R7.1.31	陽性
1090	R7.2.1	福山市	雌	捕獲	成獣	120	100	R7.2.7	陰性
1091	R7.2.2	福山市	雌	捕獲	成獣	110	60	R7.2.7	陽性
1092	R7.2.1	福山市	雄	捕獲	成獣	150	100	R7.2.7	陰性
1093	R7.2.2	福山市	雌	捕獲	成獣	150	60	R7.2.7	陰性
1094	R7.2.4	三原市	雄	捕獲	成獣	120	65	R7.2.14	陰性
1095	R7.2.15	三原市	雌	捕獲	成獣	120	65	R7.2.28	陰性
1096	R7.2.15	三原市	雄	捕獲	成獣	90	30	R7.2.28	陰性
1097	R7.2.17	三原市	雌	捕獲	成獣	90	40	R7.2.28	陰性
1098	R7.2.22	三原市	雌	捕獲	成獣	120	80	R7.3.4	陰性
1099	R7.2.26	三原市	雄	捕獲	成獣	90	20	R7.3.4	陰性
1100	R7.2.27	福山市	雄	捕獲	幼獣	40	10	R7.3.4	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1101	R7.4.20	尾道市	雌	死亡	成獣	120	60	R7.4.25	陽性
1102	R7.6.9	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	25	R7.6.17	陰性
1103	R7.6.8	尾道市	雌	捕獲	成獣	80	45	R7.6.17	陰性
1104	R7.6.8	尾道市	雌	捕獲	成獣	110	70	R7.6.17	陰性
1105	R7.6.8	尾道市	雌	捕獲	幼獣	50	30	R7.6.17	陰性
1106	R7.6.12	江田島市	雌	捕獲	成獣	100	70	R7.6.20	陰性
1107	R7.6.12	北広島町	雄	捕獲	成獣	98	50	R7.6.20	陰性
1108	R7.6.11	世羅町	雄	捕獲	成獣	120	65	R7.6.20	陰性
1109	R7.6.11	世羅町	雄	捕獲	成獣	110	48.5	R7.6.20	陰性
1110	R7.6.6	坂町	雄	捕獲	成獣	100	36	R7.6.20	陰性
1111	R7.6.9	坂町	雌	捕獲	成獣	97	31	R7.6.20	陰性
1112	R7.6.10	坂町	雌	捕獲	成獣	80	25	R7.6.20	陰性
1113	R7.6.14	江田島市	雌	捕獲	成獣	80	40	R7.6.20	陰性
1114	R7.6.14	北広島町	雄	捕獲	成獣	95	50	R7.6.20	陰性
1115	R7.6.17	世羅町	雄	捕獲	成獣	100	35.2	R7.6.24	陰性
1116	R7.6.16	東広島市	雄	捕獲	幼獣	70	30	R7.6.24	陰性
1117	R7.6.17	府中市	雌	捕獲	成獣	60	30	R7.6.24	陰性
1118	R7.6.15	尾道市	雌	捕獲	成獣	120	40	R7.6.24	陰性
1119	R7.6.21	江田島市	雄	捕獲	成獣	60	30	R7.6.27	陰性
1120	R7.6.21	東広島市	雌	捕獲	幼獣	70	25	R7.6.27	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1121	R7.6.14	坂町	雄	捕獲	成獣	75	24	R7.6.27	陰性
1122	R7.6.21	竹原市	雌	捕獲	成獣	120	80	R7.6.27	陰性
1123	R7.6.22	福山市	雄	捕獲	成獣	150	100	R7.6.27	陰性
1124	R7.6.25	世羅町	雄	捕獲	成獣	100	29	R7.7.1	陰性
1125	R7.6.24	東広島市	雄	捕獲	成獣	120	70	R7.7.1	陰性
1126	R7.6.25	坂町	雄	捕獲	成獣	75	20	R7.7.8	陰性
1127	R7.7.1	尾道市	雌	死亡	成獣	100	30	R7.7.8	陰性
1128	R7.7.1	福山市	雌	捕獲	成獣	90	25	R7.7.8	陰性
1129	R7.6.24	三原市	雌	捕獲	成獣	80	35	R7.7.8	陰性
1130	R7.6.24	三原市	雄	捕獲	成獣	120	60	R7.7.8	陰性
1131	R7.6.25	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	1	R7.7.8	陰性
1132	R7.6.27	三原市	雌	捕獲	成獣	100	70	R7.7.8	陰性
1133	R7.6.27	三原市	雌	捕獲	成獣	90	30	R7.7.8	陰性
1134	R7.6.29	三原市	雄	捕獲	成獣	50	30	R7.7.8	陰性
1135	R7.6.30	三原市	雌	捕獲	成獣	100	50	R7.7.8	陰性
1136	R7.7.1	世羅町	雄	捕獲	成獣	110	61.3	R7.7.8	陰性
1137	R7.6.30	熊野町	雌	捕獲	幼獣	45	28	R7.7.8	陰性
1138	R7.7.2	府中市	雄	捕獲	幼獣	65	30	R7.7.8	陰性
1139	R7.6.30	坂町	雄	捕獲	成獣	95	35	R7.7.11	陰性
1140	R7.7.5	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	40	R7.7.11	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1141	R7.6.30	北広島町	雄	捕獲	成獣	110	50	R7.7.11	陰性
1142	R7.7.7	江田島市	雄	捕獲	成獣	80	60	R7.7.11	陰性
1143	R7.7.9	世羅町	雄	捕獲	成獣	110	61.4	R7.7.15	陰性
1144	R7.7.8	江田島市	雌	捕獲	成獣	80	60	R7.7.15	陰性
1145	R7.7.2	三原市	雌	捕獲	成獣	100	30	R7.7.15	陰性
1146	R7.7.4	三原市	雄	捕獲	成獣	110	25	R7.7.15	陰性
1147	R7.7.4	三原市	雄	捕獲	幼獣	50	3	R7.7.15	陰性
1148	R7.7.5	三原市	雄	捕獲	幼獣	40	1.2	R7.7.15	陰性
1149	R7.7.7	三原市	雄	捕獲	成獣	110	50	R7.7.15	陰性
1150	R7.7.9	尾道市	雌	捕獲	成獣	50	20	R7.7.15	陰性
1151	R7.7.10	世羅町	雄	捕獲	成獣	120	72.5	R7.7.15	陰性
1152	R7.7.7	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	100	35	R7.7.15	陰性
1153	R7.7.13	福山市	雄	捕獲	成獣	100	30	R7.7.18	陰性
1154	R7.7.10	福山市	雌	捕獲	成獣	50	50	R7.7.18	陰性
1155	R7.7.12	世羅町	雌	捕獲	成獣	105	41.8	R7.7.18	陰性
1156	R7.7.12	世羅町	雄	捕獲	成獣	110	57.8	R7.7.18	陰性
1157	R7.7.13	東広島市	雄	捕獲	成獣	120	60	R7.7.18	陰性
1158	R7.7.14	府中市	雄	捕獲	成獣	100	50	R7.7.18	陰性
1159	R7.7.15	竹原市	雌	捕獲	幼獣	95	25	R7.7.18	陰性
1160	R7.7.9	三原市	雄	捕獲	成獣	30	10	R7.7.25	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1161	R7.7.11	三原市	雌	捕獲	幼獣	30	10	R7.7.25	陰性
1162	R7.7.16	安芸太田町	雄	捕獲	成獣	60	20	R7.7.25	陰性
1163	R7.7.17	尾道市	雄	捕獲	成獣	80	40	R7.7.25	陰性
1164	R7.7.17	世羅町	雄	捕獲	成獣	100	39.8	R7.7.25	陰性
1165	R7.7.17	東広島市	雌	捕獲	成獣	110	60	R7.7.29	陰性
1166	R7.7.18	呉市	雌	捕獲	成獣	90	50	R7.7.29	陰性
1167	R7.7.19	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	40	R7.7.29	陰性
1168	R7.7.21	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	4	R7.7.29	陰性
1169	R7.7.14	坂町	雄	捕獲	成獣	125	70	R7.7.29	陰性
1170	R7.7.19	江田島市	雌	捕獲	成獣	80	40	R7.7.29	陰性
1171	R7.7.19	廿日市市	雌	捕獲	成獣	80	30	R7.7.29	陰性
1172	R7.7.21	福山市	雌	捕獲	成獣	90	40	R7.7.29	陰性
1173	R7.7.22	福山市	雌	捕獲	成獣	100	42	R7.7.29	陰性
1174	R7.7.22	府中市	雄	捕獲	成獣	70	50	R7.7.29	陰性
1175	R7.7.23	世羅町	雌	捕獲	成獣	105	47.5	R7.7.29	陰性
1176	R7.7.21	熊野町	雌	捕獲	幼獣	40	7	R7.7.29	陰性
1177	R7.7.22	江田島市	雄	捕獲	幼獣	20	1	R7.7.29	陰性
1178	R7.7.14	尾道市	雄	捕獲	成獣	60	30	R7.7.29	陰性
1179	R7.7.19	福山市	雌	捕獲	幼獣	20	1	R7.7.29	陰性
1180	R7.7.23	江田島市	雄	捕獲	成獣	60	30	R7.7.29	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1181	R7.7.24	府中市	雌	捕獲	成獣	100	50	R7.7.29	陰性
1182	R7.7.24	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	100	60	R7.7.29	陰性
1183	R7.7.18	三原市	雄	捕獲	成獣	100	30	R7.7.29	陰性
1184	R7.7.21	三原市	雌	捕獲	成獣	100	45	R7.7.29	陰性
1185	R7.7.22	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	15	R7.7.29	陰性
1186	R7.7.21	福山市	雄	捕獲	成獣	70	50	R7.8.1	陽性
1187	R7.7.24	竹原市	雄	捕獲	成獣	80	40	R7.8.1	陰性
1188	R7.7.24	竹原市	雌	捕獲	幼獣	50	8	R7.8.1	陰性
1189	R7.7.25	竹原市	雌	捕獲	幼獣	40	1	R7.8.1	陰性
1190	R7.7.19	坂町	雄	捕獲	幼獣	40	4	R7.8.1	陰性
1191	R7.7.21	坂町	雄	捕獲	成獣	90	29.4	R7.8.1	陰性
1192	R7.7.22	坂町	雌	捕獲	幼獣	55	5	R7.8.1	陰性
1193	R7.7.23	坂町	雌	捕獲	幼獣	55	5.4	R7.8.1	陰性
1194	R7.7.26	福山市	雌	捕獲	成獣	100	45	R7.8.1	陰性
1195	R7.7.28	福山市	雄	捕獲	成獣	70	20～25	R7.8.1	陰性
1196	R7.7.26	江田島市	雌	捕獲	幼獣	40	6	R7.8.1	陰性
1197	R7.7.26	福山市	雌	捕獲	幼獣	50	10	R7.8.1	陰性
1198	R7.7.25	呉市	雄	捕獲	成獣	100	60	R7.8.1	陰性
1199	R7.7.24	坂町	雄	捕獲	成獣	100	35	R7.8.1	陰性
1200	R7.7.25	坂町	雌	捕獲	幼獣	53	5	R7.8.1	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1201	R7.7.28	坂町	雌	捕獲	幼獣	55	4.6	R7.8.1	陰性
1202	R7.7.26	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	115	40	R7.8.1	陰性
1203	R7.7.28	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	5	R7.8.1	陰性
1204	R7.7.28	世羅町	雌	捕獲	成獣	100	45	R7.8.1	陰性
1205	R7.7.28	呉市	雌	捕獲	成獣	100	70	R7.8.1	陰性
1206	R7.7.29	福山市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	R7.8.5	陰性
1207	R7.7.30	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R7.8.5	陰性
1208	R7.7.29	竹原市	雄	捕獲	成獣	80	50.0	R7.8.5	陰性
1209	R7.7.29	竹原市	雌	捕獲	成獣	120	60.0	R7.8.5	陰性
1210	R7.7.27	福山市	雄	捕獲	成獣	80	30.0	R7.8.5	陰性
1211	R7.7.30	福山市	雌	捕獲	成獣	100	25.0	R7.8.5	陰性
1212	R7.7.25	廿日市市	雌	捕獲	成獣	100	20.0	R7.8.5	陰性
1213	R7.7.31	福山市	雌	捕獲	幼獣	70	10.0	R7.8.5	陰性
1214	R7.7.31	江田島市	雌	死亡	成獣	100	50.0	R7.8.5	陰性
1215	R7.7.30	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	10.0	R7.8.8	陰性
1216	R7.7.30	福山市	雄	捕獲	成獣	100	30.0	R7.8.8	陰性
1217	R7.7.30	江田島市	雌	捕獲	幼獣	60	7.0	R7.8.8	陰性
1218	R7.7.30	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	4.0	R7.8.8	陰性
1219	R7.8.1	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	70	55.0	R7.8.8	陰性
1220	R7.8.1	東広島市	雌	捕獲	成獣	70	30.0	R7.8.8	陰性
1221	R7.7.31	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R7.8.8	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1222	R7.8.1	府中市	雌	捕獲	幼獣	45	4.0	R7.8.8	陰性
1223	R7.8.1	福山市	雌	捕獲	成獣	90	25.0	R7.8.8	陰性
1224	R7.8.1	福山市	雄	捕獲	成獣	100	50.0	R7.8.8	陰性
1225	R7.8.3	福山市	雌	捕獲	幼獣	50	20.0	R7.8.8	陰性
1226	R7.8.1	竹原市	雌	捕獲	成獣	75	45.0	R7.8.8	陰性
1227	R7.8.2	竹原市	雌	捕獲	成獣	90	100.0	R7.8.8	陰性
1228	R7.8.3	竹原市	雌	捕獲	成獣	90	130.0	R7.8.8	陰性
1229	R7.8.4	竹原市	雌	捕獲	幼獣	30	2.0	R7.8.8	陰性
1230	R7.8.1	呉市	雌	捕獲	成獣	100	70.0	R7.8.8	陰性
1231	R7.8.1	呉市	雌	捕獲	成獣	110	80.0	R7.8.8	陰性
1232	R7.8.2	呉市	雌	捕獲	成獣	100	60.0	R7.8.8	陰性
1233	R7.7.30	尾道市	雄	捕獲	成獣	130	90.0	R7.8.8	陰性
1234	R7.7.31	尾道市	雌	捕獲	成獣	120	70.0	R7.8.8	陰性
1235	R7.8.5	福山市	雄	捕獲	成獣	70	15.0	R7.8.8	陰性
1236	R7.7.29	坂町	雌	捕獲	成獣	115	51.0	R7.8.8	陰性
1237	R7.7.30	坂町	雄	捕獲	成獣	95	28.0	R7.8.8	陰性
1238	R7.7.31	福山市	雄	捕獲	成獣	不明	不明	R7.8.8	陰性
1239	R7.7.31	福山市	雄	捕獲	成獣	不明	不明	R7.8.8	陰性
1240	R7.8.2	福山市	雄	捕獲	幼獣	不明	不明	R7.8.8	陰性
1241	R7.8.4	福山市	雌	捕獲	成獣	不明	不明	R7.8.8	陰性
1242	R7.8.5	福山市	雄	捕獲	成獣	120	50.0	R7.8.22	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1243	R7.8.5	福山市	雌	捕獲	成獣	140	50.0	R7.8.22	陰性
1244	R7.8.6	福山市	雌	捕獲	成獣	90	30.0	R7.8.22	陰性
1245	R7.8.5	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	4.0	R7.8.22	陰性
1246	R7.8.6	東広島市	雌	捕獲	成獣	50	20.0	R7.8.22	陰性
1247	R7.8.2	三原市	雄	捕獲	幼獣	90	12.0	R7.8.22	陰性
1248	R7.8.2	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	6.0	R7.8.22	陰性
1249	R7.8.3	三原市	雌	捕獲	幼獣	80	10.0	R7.8.22	陰性
1250	R7.8.5	三原市	雌	捕獲	成獣	120	60.0	R7.8.22	陰性
1251	R7.8.5	三原市	雌	捕獲	幼獣	35	6.0	R7.8.22	陰性
1252	R7.7.26	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	120	70.0	R7.8.22	陰性
1253	R7.8.6	江田島市	雌	捕獲	成獣	80	40.0	R7.8.22	陰性
1254	R7.8.6	世羅町	雄	捕獲	成獣	100	42.2	R7.8.22	陰性
1255	R7.8.5	呉市	雌	捕獲	成獣	100	70.0	R7.8.22	陰性
1256	R7.8.6	呉市	雌	捕獲	成獣	90	60.0	R7.8.22	陰性
1257	R7.8.7	大竹市	雌	捕獲	成獣	100	20.0	R7.8.22	陰性
1258	R7.8.7	竹原市	雄	捕獲	成獣	120	55.0	R7.8.22	陰性
1259	R7.8.7	府中市	雌	捕獲	成獣	80	40.0	R7.8.22	陰性
1260	R7.8.8	世羅町	雌	捕獲	成獣	105	49.7	R7.8.22	陰性
1261	R7.8.9	竹原市	雌	捕獲	成獣	90	60.0	R7.8.22	陰性
1262	R7.8.10	竹原市	雌	捕獲	成獣	120	100.0	R7.8.22	陰性
1263	R7.8.10	竹原市	雌	捕獲	成獣	85	30.0	R7.8.22	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1264	R7.8.10	江田島市	雄	捕獲	成獣	80	60.0	R7.8.22	陰性
1265	R7.8.7	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	40.0	R7.8.22	陰性
1266	R7.8.3	坂町	雄	捕獲	幼獣	55	3.5	R7.8.22	陰性
1267	R7.8.4	坂町	雌	捕獲	幼獣	65	5.0	R7.8.22	陰性
1268	R7.8.4	坂町	雄	捕獲	成獣	95	31.0	R7.8.22	陰性
1269	R7.8.7	坂町	雌	捕獲	成獣	80	40.0	R7.8.22	陰性
1270	R7.8.11	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R7.8.22	陰性
1271	R7.8.7	三原市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	R7.8.22	陰性
1272	R7.8.7	三原市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	R7.8.22	陰性
1273	R7.8.8	尾道市	雌	捕獲	成獣	100	60.0	R7.8.22	陰性
1274	R7.8.7	尾道市	雌	捕獲	成獣	80	40.0	R7.8.22	陰性
1275	R7.8.12	熊野町	雄	捕獲	幼獣	50	35.0	R7.8.22	陰性
1276	R7.8.12	府中市	雄	捕獲	成獣	70	35.0	R7.8.22	陰性
1277	R7.8.12	江田島市	雌	捕獲	成獣	70	40.0	R7.8.22	陰性
1278	R7.8.7	坂町	雄	捕獲	成獣	95	33.0	R7.8.22	陰性
1279	R7.8.9	坂町	雌	捕獲	成獣	98	31.0	R7.8.22	陰性
1280	R7.8.10	坂町	雌	捕獲	成獣	110	49.0	R7.8.22	陰性
1281	R7.8.11	坂町	雄	捕獲	成獣	115	65.0	R7.8.22	陰性
1282	R7.8.12	竹原市	不明	捕獲	幼獣	40	6.0	R7.8.26	陰性
1283	R7.8.16	江田島市	雄	捕獲	成獣	120	80.0	R7.8.26	陰性
1284	R7.8.17	江田島市	雄	捕獲	幼獣	40	5.0	R7.8.26	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1285	R7.8.16	竹原市	雌	捕獲	成獣	100	70.0	R7.8.26	陰性
1286	R7.8.17	大竹市	雄	捕獲	成獣	110	50.0	R7.8.26	陰性
1287	R7.8.15	世羅町	雌	捕獲	成獣	100	45.3	R7.8.26	陰性
1288	R7.8.18	竹原市	雄	捕獲	幼獣	40	1.0	R7.8.26	陰性
1289	R7.8.18	竹原市	雄	捕獲	幼獣	40	1.0	R7.8.26	陰性
1290	R7.8.10	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	60	14.0	R7.8.26	陰性
1291	R7.8.18	廿日市市	雄	捕獲	成獣	120	45.0	R7.8.26	陰性
1292	R7.8.19	竹原市	雄	捕獲	幼獣	40	4.0	R7.8.26	陰性
1293	R7.8.19	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R7.8.26	陰性
1294	R7.8.20	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R7.8.26	陰性
1295	R7.8.20	竹原市	雌	捕獲	成獣	70	30.0	R7.8.26	陰性
1296	R7.8.20	呉市	雌	捕獲	成獣	90	60.0	R7.8.29	陰性
1297	R7.8.21	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	50	3.0	R7.8.29	陰性
1298	R7.8.19	竹原市	雌	捕獲	成獣	80	60.0	R7.8.29	陰性
1299	R7.8.21	竹原市	雌	捕獲	幼獣	65	1.0	R7.8.29	陰性
1300	R7.8.22	竹原市	雄	捕獲	幼獣	65	1.0	R7.8.29	陰性
1301	R7.8.24	江田島市	雌	捕獲	幼獣	40	5.0	R7.8.29	陰性
1302	R7.8.22	竹原市	雄	捕獲	成獣	80	30.0	R7.8.29	陰性
1303	R7.8.24	竹原市	不明	捕獲	幼獣	50	10.0	R7.8.29	陰性
1304	R7.8.25	竹原市	雌	捕獲	幼獣	60	20.0	R7.8.29	陰性
1305	R7.8.23	呉市	雌	捕獲	成獣	110	70.0	R7.8.29	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1306	R7.8.22	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	1.0	R7.8.29	陰性
1307	R7.8.26	江田島市	雄	捕獲	幼獣	55	5.0	R7.9.2	陰性
1308	R7.8.21	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	100	30.0	R7.9.2	陰性
1309	R7.8.25	竹原市	雌	捕獲	成獣	70	60.0	R7.9.2	陰性
1310	R7.8.26	竹原市	雌	捕獲	成獣	90	100.0	R7.9.2	陰性
1311	R7.8.25	府中市	雌	捕獲	成獣	80	35.0	R7.9.2	陰性
1312	R7.8.26	廿日市市	雄	捕獲	成獣	110	60.0	R7.9.2	陰性
1313	R7.8.26	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	60	10.0	R7.9.2	陰性
1314	R7.8.26	呉市	雌	捕獲	成獣	90	50.0	R7.9.2	陰性
1315	R7.8.27	府中市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R7.9.5	陰性
1316	R7.8.26	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	50	15.0	R7.9.5	陰性
1317	R7.8.28	東広島市	雄	捕獲	幼獣	50	6.0	R7.9.5	陰性
1318	R7.8.27	世羅町	雌	捕獲	成獣	95	39.0	R7.9.5	陰性
1319	R7.8.27	三原市	雄	捕獲	成獣	140	90.0	R7.9.5	陰性
1320	R7.8.29	大竹市	雌	捕獲	成獣	110	30.0	R7.9.5	陰性
1321	R7.8.30	大竹市	雄	捕獲	成獣	110	25.0	R7.9.5	陰性
1322	R7.8.30	東広島市	雌	捕獲	成獣	90	40.0	R7.9.5	陰性
1323	R7.9.1	世羅町	雌	捕獲	幼獣	100	42.8	R7.9.5	陰性
1324	R7.9.1	福山市	雄	捕獲	成獣	110	40.0	R7.9.5	陰性
1325	R7.9.1	大竹市	雄	捕獲	幼獣	60	5.0	R7.9.5	陰性
1326	R7.8.31	府中市	雌	捕獲	幼獣	70	25.0	R7.9.9	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1327	R7.9.1	熊野町	雄	捕獲	成獣	65	97.0	R7.9.9	陰性
1328	R7.9.2	江田島市	雌	捕獲	幼獣	55	5.0	R7.9.9	陰性
1329	R7.9.1	呉市	雄	捕獲	成獣	80	40.0	R7.9.9	陰性
1330	R7.9.3	大竹市	雌	捕獲	成獣	100	15.0	R7.9.9	陰性
1331	R7.9.1	三原市	雄	捕獲	成獣	100	15.0	R7.9.9	陰性
1332	R7.9.1	三原市	雄	捕獲	成獣	60	15.0	R7.9.9	陰性
1333	R7.9.1	三原市	雌	捕獲	成獣	60	30.0	R7.9.9	陰性
1334	R7.9.1	三原市	雌	捕獲	幼獣	50	6.0	R7.9.9	陰性
1335	R7.9.1	三原市	雌	捕獲	成獣	70	35.0	R7.9.9	陰性
1336	R7.9.3	尾道市	雄	捕獲	成獣	130	77.5	R7.9.9	陰性
1337	R7.9.3	尾道市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	R7.9.9	陰性
1338	R7.9.1	尾道市	雌	捕獲	成獣	60	30.0	R7.9.9	陰性
1339	R7.9.5	東広島市	雌	捕獲	幼獣	60	6.0	R7.9.12	陰性
1340	R7.9.5	東広島市	雌	捕獲	成獣	110	50.0	R7.9.12	陰性
1341	R7.9.6	東広島市	雄	捕獲	幼獣	70	25.0	R7.9.12	陰性
1342	R7.8.29	坂町	雄	捕獲	幼獣	55	5.8	R7.9.12	陰性
1343	R7.8.30	坂町	雌	捕獲	成獣	110	41.0	R7.9.12	陰性
1344	R7.9.1	坂町	雄	捕獲	成獣	95	31.0	R7.9.12	陰性
1345	R7.9.3	坂町	雌	捕獲	成獣	75	10.5	R7.9.12	陰性
1346	R7.9.3	坂町	雄	捕獲	幼獣	55	6.0	R7.9.12	陰性
1347	R7.9.5	世羅町	雄	捕獲	成獣	125	107.3	R7.9.12	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1348	R7.9.8	大竹市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R7.9.12	陰性
1349	R7.9.7	福山市	雌	捕獲	成獣	130	50.0	R7.9.12	陰性
1350	R7.9.7	福山市	雌	捕獲	成獣	120	70.0	R7.9.12	陰性
1351	R7.9.4	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	120	90.0	R7.9.12	陰性
1352	R7.9.9	東広島市	雌	捕獲	幼獣	50	10.0	R7.9.12	陰性
1353	R7.9.9	東広島市	雄	捕獲	幼獣	70	30.0	R7.9.12	陰性
1354	R7.9.7	尾道市	雌	捕獲	成獣	80	20.0	R7.9.12	陰性
1355	R7.9.9	大竹市	雌	捕獲	成獣	100	50.0	R7.9.12	陰性
1356	R7.9.8	呉市	雄	捕獲	成獣	90	40.0	R7.9.19	陰性
1357	R7.9.3	三原市	雄	捕獲	成獣	120	60.0	R7.9.19	陰性
1358	R7.9.12	東広島市	雌	捕獲	成獣	80	40.0	R7.9.19	陰性
1359	R7.9.6	坂町	雌	捕獲	成獣	65	10.0	R7.9.19	陰性
1360	R7.9.8	坂町	雄	捕獲	成獣	70	10.8	R7.9.19	陰性
1361	R7.9.9	坂町	雄	捕獲	成獣	97	33.0	R7.9.19	陰性
1362	R7.9.11	世羅町	雄	捕獲	成獣	95	42.6	R7.9.26	陰性
1363	R7.9.16	江田島市	雄	捕獲	幼獣	55	6.0	R7.9.26	陰性
1364	R7.9.18	廿日市市	雄	捕獲	成獣	100	30.0	R7.9.26	陰性
1365	R7.10.4	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	80	10.0	R7.10.10	陰性
1366	R7.10.1	尾道市	雄	捕獲	成獣	60	30.0	R7.10.10	陰性
1367	R7.10.4	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	10.0	R7.10.10	陰性
1368	R7.10.6	尾道市	雌	捕獲	成獣	50	15.0	R7.10.17	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1369	R7.10.9	江田島市	雄	捕獲	成獣	80	40.0	R7.10.17	陰性
1370	R7.10.12	尾道市	雄	捕獲	成獣	100	80.0	R7.10.21	陰性
1371	R7.10.14	尾道市	雄	捕獲	成獣	80	20.0	R7.10.21	陰性
1372	R7.10.9	江田島市	雄	捕獲	幼獣	55	6.0	R7.10.21	陰性
1373	R7.10.9	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R7.10.21	陰性
1374	R7.10.21	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	80	15.0	R7.10.28	陰性
1375	R7.10.26	尾道市	雌	捕獲	成獣	75	30.0	R7.10.31	陰性
1376	R7.10.28	尾道市	雌	捕獲	成獣	110	70.0	R7.10.31	陰性
1377	R7.11.8	福山市	雌	捕獲	成獣	80	20.0	R7.11.14	陰性
1378	R7.11.8	福山市	雄	捕獲	成獣	110	40.0	R7.11.14	陰性
1379	R7.11.9	三原市	雌	捕獲	成獣	90	40.0	R7.11.18	陰性
1380	R7.11.10	三原市	雌	捕獲	成獣	50	10.0	R7.11.18	陰性
1381	R7.11.12	福山市	雌	捕獲	成獣	80	20.0	R7.11.21	陰性
1382	R7.11.12	三原市	雄	捕獲	成獣	120	45.0	R7.11.21	陰性
1383	R7.11.13	三原市	雄	捕獲	成獣	70	25.0	R7.11.21	陰性
1384	R7.11.17	三原市	雄	捕獲	成獣	95	30.0	R7.11.21	陰性
1385	R7.11.17	廿日市市	雄	捕獲	成獣	90	30.0	R7.11.21	陰性
1386	R7.11.15	江田島市	雌	死亡	成獣	70	15.0	R7.11.21	陰性
1387	R7.11.20	熊野町	雄	捕獲	成獣	60	70.0	R7.11.28	陰性
1388	R7.11.22	熊野町	雄	捕獲	成獣	100	105.0	R7.11.28	陰性
1389	R7.11.22	福山市	雄	捕獲	成獣	65	35.0	R7.11.28	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1390	R7.11.21	福山市	雌	捕獲	成獣	120	30.0	R7.11.28	陰性
1391	R7.11.21	廿日市市	雄	捕獲	成獣	120	60.0	R7.11.28	陰性
1392	R7.11.24	廿日市市	雌	捕獲	成獣	90	30.0	R7.11.28	陰性
1393	R7.11.24	福山市	雌	捕獲	成獣	80	25.0	R7.12.5	陰性
1394	R7.11.30	福山市	雄	捕獲	成獣	130	60.0	R7.12.5	陰性
1395	R7.12.4	三原市	雄	捕獲	成獣	60	25.0	R7.12.16	陰性
1396	R8.1.4	江田島市	雌	死亡	成獣	120	70.0	R8.1.9	陰性
1397	R8.1.7	江田島市	雌	死亡	成獣	80	30.0	R8.1.9	陰性
1398	R8.1.10	三原市	雌	捕獲	成獣	60	18.0	R8.1.20	陰性
1399	R8.1.12	三原市	雄	捕獲	成獣	100	45.0	R8.1.20	陰性
1400	R8.1.11	三原市	雌	捕獲	成獣	65	17.0	R8.1.20	陰性
1401	R8.1.11	三原市	雌	捕獲	成獣	120	70.0	R8.1.20	陰性
1402	R8.1.21	三原市	雌	捕獲	成獣	135	45.0	R8.2.17	陰性
1403	R8.2.7	江田島市	雄	死亡	成獣	130	80.0	R8.2.19	陰性
1404	R8.2.17	尾道市	雄	死亡	成獣	90	30.0	R8.2.19	陰性
1405	R8.2.17	福山市	雄	死亡	成獣	100		R8.2.27	陰性
1406	R8.2.23	三原市	雄	捕獲	成獣	110	60.0	R8.2.27	陰性
1407	R8.2.20	三原市	雌	捕獲	成獣	110	60.0	R8.3.3	陰性
1408	R8.2.20	三原市	雄	捕獲	成獣	90	60.0	R8.3.3	陰性
1409	R8.2.21	三原市	雌	捕獲	成獣	120	70.0	R8.3.3	陰性
1410	R8.2.23	三原市	雄	捕獲	成獣	120	55.0	R8.3.3	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1411	R8.4.20	大竹市	雌	死亡	成獣	100	30.0	R8.4.30	陰性
1412	R8.5.8	江田島市	雄	死亡	成獣	80	30.0	R8.5.14	陰性
1413	R8.6.14	三原市	雌	捕獲	成獣	100	50.0	R8.6.25	陰性
1414	R8.6.15	三原市	雄	捕獲	成獣	100	50.0	R8.6.25	陰性
1415	R8.6.16	三原市	雄	捕獲	成獣	90	20.0	R8.6.25	陰性
1416	R8.6.15	坂町	雄	捕獲	成獣	92	33.0	R8.6.25	陰性
1417	R8.6.16	坂町	雄	捕獲	成獣	101	46.0	R8.6.25	陰性
1418	R8.6.19	江田島市	雄	捕獲	成獣	80	30.0	R8.6.25	陰性
1419	R8.6.19	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	35.0	R8.6.25	陰性
1420	R8.6.20	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R8.6.25	陰性
1421	R8.6.19	江田島市	雄	死亡	幼獣	50	5.0	R8.6.25	陰性
1422	R8.6.19	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	80	30.0	R8.7.2	陰性
1423	R8.6.21	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	100	50.0	R8.7.2	陰性
1424	R8.6.22	三原市	雌	捕獲	成獣	120	65.0	R8.7.2	陰性
1425	R8.6.21	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	7.0	R8.7.2	陰性
1426	R8.6.21	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	20.0	R8.7.2	陰性
1427	R8.6.17	三原市	雄	捕獲	成獣	80	30.0	R8.7.2	陰性
1428	R8.6.22	江田島市	雄	捕獲	成獣	90	40.0	R8.7.2	陰性
1429	R8.6.18	坂町	雄	捕獲	成獣	99	41.0	R8.7.2	陰性
1430	R8.6.24	竹原市	雄	捕獲	成獣	90	36.0	R8.7.2	陰性
1431	R8.6.21	坂町	雌	捕獲	成獣	100	53.0	R8.7.2	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1432	R8.6.21	坂町	雄	捕獲	成獣	110	69.0	R8.7.2	陰性
1433	R8.6.25	福山市	雄	捕獲	成獣	80	40.0	R8.7.9	陰性
1434	R8.6.26	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	100	25.0	R8.7.9	陰性
1435	R8.6.28	福山市	雄	捕獲	成獣	100	30.0	R8.7.9	陰性
1436	R8.6.27	呉市	雄	捕獲	成獣	80	30.0	R8.7.9	陰性
1437	R8.6.26	坂町	雄	捕獲	成獣	92	32.0	R8.7.9	陰性
1438	R8.6.26	坂町	雄	捕獲	成獣	92	33.0	R8.7.9	陰性
1439	R8.6.27	世羅町	雌	捕獲	成獣	68	15.0	R8.7.9	陰性
1440	R8.6.28	府中市	雌	捕獲	成獣	70	20.0	R8.7.9	陰性
1441	R8.6.29	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	100	45.0	R8.7.9	陰性
1442	R8.6.30	竹原市	雌	捕獲	成獣	120	50.0	R8.7.9	陰性
1443	R8.7.1	竹原市	雌	捕獲	成獣	110	54.0	R8.7.9	陰性
1444	R8.7.1	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	10.0	R8.7.9	陰性
1445	R8.7.2	府中市	雄	捕獲	幼獣	40	4.0	R8.7.9	陰性
1446	R8.7.3	府中市	雄	捕獲	成獣	80	30.0	R8.7.9	陰性
1447	R8.7.5	江田島市	雌	捕獲	成獣	110	80.0	R8.7.9	陰性
1448	R8.7.4	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	6.0	R8.7.9	陰性
1449	R8.7.3	呉市	雄	捕獲	成獣	110	60.0	R8.7.16	陰性
1450	R8.7.1	世羅町	雄	捕獲	成獣	120	96.1	R8.7.16	陰性
1451	R8.7.3	世羅町	雄	捕獲	成獣	100	36.1	R8.7.16	陰性
1452	R8.7.7	竹原市	雄	捕獲	成獣	130	80.0	R8.7.16	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1453	R8.7.6	呉市	雄	捕獲	成獣	110	60.0	R8.7.16	陰性
1454	R8.7.3	三原市	雄	捕獲	幼獣	55	8.0	R8.7.16	陰性
1455	R8.7.5	三原市	雌	捕獲	幼獣	70	1.5	R8.7.16	陰性
1456	R8.7.6	三原市	雄	捕獲	成獣	120	50.0	R8.7.16	陰性
1457	R8.7.6	三原市	雄	捕獲	成獣	100	35.0	R8.7.16	陰性
1458	R8.7.4	府中市	雄	捕獲	成獣	60	40.0	R8.7.16	陰性
1459	R8.7.7	江田島市	雌	捕獲	幼獣	40	3.0	R8.7.16	陰性
1460	R8.7.7	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R8.7.16	陰性
1461	R8.7.8	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	70	35.0	R8.7.16	陰性
1462	R8.7.7	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	80	25.0	R8.7.16	陰性
1463	R8.7.6	坂町	雌	捕獲	成獣	70	25.0	R8.7.16	陰性
1464	R8.7.8	三原市	雌	捕獲	成獣	80	25.0	R8.7.16	陰性
1465	R8.7.9	竹原市	雄	捕獲	成獣	122	50.0	R8.7.16	陰性
1466	R8.7.11	竹原市	雌	捕獲	成獣	90	35.0	R8.7.16	陰性
1467	R8.7.10	竹原市	雄	捕獲	成獣	93	25.0	R8.7.16	陰性
1468	R8.7.10	竹原市	雌	捕獲	成獣	94	30.0	R8.7.16	陰性
1469	R8.7.11	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R8.7.16	陰性
1470	R8.7.9	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R8.7.16	陰性
1471	R8.7.12	江田島市	雄	捕獲	成獣	100	50.0	R8.7.16	陰性
1472	R8.7.12	福山市	雌	捕獲	成獣	60	50.0	R8.7.23	陰性
1473	R8.7.11	熊野町	雌	捕獲	幼獣	55	28.0	R8.7.23	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1474	R8.7.13	江田島市	雄	捕獲	成獣	100	45.0	R8.7.23	陰性
1475	R8.7.11	世羅町	雌	捕獲	成獣	100	40.0	R8.7.23	陰性
1476	R8.7.12	竹原市	不明	捕獲	幼獣	40	10.0	R8.7.23	陰性
1477	R8.7.13	福山市	雌	捕獲	成獣	150	90.0	R8.7.23	陰性
1478	R8.7.13	福山市	雌	捕獲	成獣	135	80.0	R8.7.23	陰性
1479	R8.7.13	呉市	雄	捕獲	成獣	110	60.0	R8.7.23	陰性
1480	R8.7.9	三原市	雌	捕獲	幼獣	35	5.0	R8.7.23	陰性
1481	R8.7.10	三原市	雌	捕獲	幼獣	40	12.0	R8.7.23	陰性
1482	R8.7.13	竹原市	雌	捕獲	成獣	122	60.0	R8.7.23	陰性
1483	R8.7.16	府中市	雄	捕獲	成獣	100	40.0	R8.7.23	陰性
1484	R8.7.14	世羅町	雄	捕獲	成獣	100	38.1	R8.7.23	陰性
1485	R8.7.16	竹原市	雄	捕獲	成獣	90	20.0	R8.7.23	陰性
1486	R8.7.16	呉市	雄	捕獲	成獣	90	40.0	R8.7.23	陰性
1487	R8.7.14	坂町	雄	捕獲	成獣	108	56.0	R8.7.23	陰性
1488	R8.7.14	坂町	雄	捕獲	成獣	105	65.0	R8.7.23	陰性
1489	R8.7.16	府中市	雌	捕獲	成獣	40	20.0	R8.7.23	陰性
1490	R8.7.16	府中市	雄	捕獲	成獣	65	40.0	R8.7.23	陰性
1491	R8.7.19	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R8.7.23	陰性
1492	R8.7.20	江田島市	雄	捕獲	幼獣	40	5.0	R8.7.23	陰性
1493	R8.7.17	東広島市	雄	捕獲	幼獣	50	6.0	R8.7.23	陰性
1494	R8.7.17	東広島市	雌	捕獲	幼獣	40	5.0	R8.7.23	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1495	R8.7.14	竹原市	雌	捕獲	成獣	100	30.0	R8.7.23	陰性
1496	R8.7.18	竹原市	雌	捕獲	成獣	118	60.0	R8.7.23	陰性
1497	R8.7.16	坂町	雄	捕獲	成獣	100	30.0	R8.7.23	陰性
1498	7月17日	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	80	20.0	R8.7.30	陰性
1499	7月18日	福山市	雌	捕獲	成獣	90	55.0	R8.7.30	陰性
1500	7月19日	福山市	雄	捕獲	成獣	95	50.0	R8.7.30	陰性
1501	7月21日	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	90	35.0	R8.7.30	陰性
1502	7月18日	竹原市	雄	捕獲	成獣	104	37.5	R8.7.30	陰性
1503	7月20日	竹原市	雄	捕獲	成獣	104	38.5	R8.7.30	陰性
1504	7月19日	世羅町	雄	捕獲	成獣	120	70.0	R8.7.30	陰性
1505	7月15日	三原市	雄	捕獲	幼獣	65	8.0	R8.7.30	陰性
1506	7月21日	府中市	雌	捕獲	成獣	120	40.0	R8.7.30	陰性
1507	7月19日	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	80	35.0	R8.7.30	陰性
1508	7月22日	安芸高田市	雄	捕獲	成獣	80	50.0	R8.7.30	陰性
1509	7月21日	呉市	雄	捕獲	成獣	100	60.0	R8.7.30	陰性
1510	7月18日	坂町	雄	捕獲	成獣	112	70.0	R8.7.30	陰性
1511	7月21日	坂町	雄	捕獲	成獣	96	39.0	R8.7.30	陰性
1512	7月22日	世羅町	雄	捕獲	成獣	110	41.0	R8.7.30	陰性
1513	7月23日	世羅町	雌	捕獲	幼獣	50	7.9	R8.7.30	陰性
1514	7月24日	府中市	雌	捕獲	成獣	60	40.0	R8.8.6	陰性
1515	7月25日	府中市	雌	捕獲	幼獣	40	15.0	R8.8.6	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1516	7月25日	福山市	雄	捕獲	成獣	100	30.0	R8.8.6	陰性
1517	7月27日	福山市	雌	捕獲	成獣	80	20.0	R8.8.6	陰性
1518	7月26日	府中市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R8.8.6	陰性
1519	7月23日	北広島町	雄	捕獲	成獣	80	40.0	R8.8.6	陰性
1520	7月23日	世羅町	雌	捕獲	成獣	103	28.4	R8.8.6	陰性
1521	7月24日	世羅町	雄	捕獲	幼獣	55	9.9	R8.8.6	陰性
1522	7月24日	東広島市	雌	捕獲	幼獣	70	30.0	R8.8.6	陰性
1523	7月24日	呉市	雌	捕獲	成獣	90	50.0	R8.8.6	陰性
1524	7月28日	東広島市	雄	捕獲	成獣	80	40.0	R8.8.6	陰性
1525	7月28日	呉市	雄	捕獲	成獣	90	50.0	R8.8.6	陰性
1526	7月24日	坂町	雌	捕獲	幼獣	55	3.5	R8.8.6	陰性
1527	7月24日	坂町	雄	捕獲	成獣	86	25.0	R8.8.6	陰性
1528	7月25日	坂町	雄	捕獲	成獣	101	40.0	R8.8.6	陰性
1529	7月26日	坂町	雄	捕獲	成獣	110	70.0	R8.8.6	陰性
1530	7月30日	呉市	雌	捕獲	成獣	100	70.0	R8.8.6	陰性
1531	7月29日	府中市	雌	捕獲	幼獣	50	2.0	R8.8.6	陰性
1532	7月29日	府中市	雄	捕獲	幼獣	30	10.0	R8.8.6	陰性
1533	7月28日	熊野町	雄	捕獲	幼獣	60	25.0	R8.8.6	陰性
1534	7月29日	東広島市	雌	捕獲	成獣	80	30.0	R8.8.6	陰性
1535	7月30日	広島市	雄	死亡	成獣	70	不明	R8.8.6	陰性
1536	7月22日	竹原市	雄	捕獲	幼獣	60	15.0	R8.8.20	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1537	7月29日	竹原市	雄	捕獲	成獣	100	80.0	R8.8.20	陰性
1538	8月1日	東広島市	雌	捕獲	成獣	60	20.0	R8.8.20	陰性
1539	8月1日	東広島市	雌	捕獲	成獣	60	20.0	R8.8.20	陰性
1540	7月24日	竹原市	雄	捕獲	幼獣	50	2.0	R8.8.20	陰性
1541	7月27日	竹原市	雄	捕獲	幼獣	50	2.0	R8.8.20	陰性
1542	7月28日	竹原市	雄	捕獲	成獣	120	65.0	R8.8.20	陰性
1543	7月29日	竹原市	雄	捕獲	幼獣	50	2.0	R8.8.20	陰性
1544	8月2日	江田島市	雄	捕獲	成獣	90	60.0	R8.8.20	陰性
1545	8月2日	江田島市	雄	捕獲	成獣	120	80.0	R8.8.20	陰性
1546	7月21日	竹原市	雌	捕獲	成獣	100	30.0	R8.8.20	陰性
1547	7月22日	竹原市	不明	捕獲	幼獣	40	10.0	R8.8.20	陰性
1548	8月2日	竹原市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	R8.8.20	陰性
1549	8月3日	廿日市市	雄	捕獲	成獣	120	70.0	R8.8.20	陰性
1550	8月1日	呉市	雄	捕獲	成獣	90	50.0	R8.8.20	陰性
1551	8月3日	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	R8.8.20	陰性
1552	8月1日	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	20.0	R8.8.20	陰性
1553	8月4日	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	80	10.0	R8.8.20	陰性
1554	8月3日	府中市	雌	捕獲	成獣	70	50.0	R8.8.20	陰性
1555	8月2日	世羅町	雄	捕獲	成獣	100	42.8	R8.8.20	陰性
1556	8月3日	江田島市	雄	捕獲	成獣	70	50.0	R8.8.20	陰性
1557	8月4日	呉市	雌	捕獲	成獣	100	60.0	R8.8.20	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1558	8月4日	福山市	雌	捕獲	幼獣	70	15.0	R8.8.20	陰性
1559	8月5日	福山市	雄	捕獲	成獣	120	50.0	R8.8.20	陰性
1560	8月4日	竹原市	雄	捕獲	成獣	80	50.0	R8.8.20	陰性
1561	8月2日	東広島市	雄	捕獲	成獣	120	90.0	R8.8.20	陰性
1562	8月3日	東広島市	雄	捕獲	成獣	100	70.0	R8.8.20	陰性
1563	8月1日	福山市	雌	捕獲	成獣	130	45.0	R8.8.20	陰性
1564	7月31日	坂町	雄	捕獲	成獣	95	36.0	R8.8.20	陰性
1565	8月1日	坂町	雄	捕獲	幼獣	52	3.0	R8.8.20	陰性
1566	8月2日	坂町	雄	捕獲	幼獣	51	3.5	R8.8.20	陰性
1567	8月4日	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	10.0	R8.8.20	陰性
1568	8月4日	世羅町	雌	捕獲	成獣	100	45.1	R8.8.20	陰性
1569	8月6日	世羅町	雄	捕獲	成獣	120	65.1	R8.8.20	陰性
1570	8月5日	府中市	雄	捕獲	成獣	90	40.0	R8.8.20	陰性
1571	8月5日	坂町	雌	捕獲	成獣	101	49.0	R8.8.20	陰性
1572	8月6日	坂町	雌	捕獲	成獣	110	59.0	R8.8.20	陰性
1573	8月1日	三原市	雄	捕獲	幼獣	40	6.0	R8.8.20	陰性
1574	8月1日	三原市	雌	捕獲	幼獣	60	10.0	R8.8.20	陰性
1575	8月1日	三原市	雌	捕獲	成獣	65	15.0	R8.8.20	陰性
1576	8月2日	三原市	雌	捕獲	成獣	75	20.0	R8.8.20	陰性
1577	8月2日	三原市	雄	捕獲	幼獣	70	10.0	R8.8.20	陰性
1578	8月3日	三原市	雄	捕獲	成獣	70	30.0	R8.8.20	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1579	8月6日	福山市	雄	捕獲	成獣	100	25.0	R8.8.20	陰性
1580	8月7日	竹原市	雌	捕獲	成獣	110	65.0	R8.8.20	陰性
1581	8月8日	熊野町	雌	捕獲	幼獣	50	14.0	R8.8.20	陰性
1582	8月9日	熊野町	雌	捕獲	成獣	90	48.0	R8.8.20	陰性
1583	8月9日	熊野町	雄	捕獲	幼獣	45	16.0	R8.8.20	陰性
1584	8月9日	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	20.0	R8.8.20	陰性
1585	8月7日	福山市	雌	捕獲	成獣	50	35.0	R8.8.20	陰性
1586	8月9日	竹原市	雌	捕獲	幼獣	50	2.0	R8.8.20	陰性
1587	8月8日	呉市	雄	捕獲	成獣	100	60.0	R8.8.20	陰性
1588	8月10日	安芸高田市	雌	捕獲	成獣	60	20.0	R8.8.20	陰性
1589	8月12日	呉市	雌	捕獲	成獣	100	70.0	R8.8.20	陰性
1590	8月10日	竹原市	雄	捕獲	成獣	130	100.0	R8.8.27	陰性
1591	8月10日	竹原市	雌	捕獲	幼獣	50	2.0	R8.8.27	陰性
1592	8月12日	竹原市	雄	捕獲	成獣	120	65.0	R8.8.27	陰性
1593	8月7日	江田島市	雄	捕獲	成獣	80	50.0	R8.8.27	陰性
1594	8月13日	江田島市	雄	捕獲	幼獣	60	20.0	R8.8.27	陰性
1595	8月9日	府中市	雄	捕獲	成獣	120	40.0	R8.8.27	陰性
1596	8月15日	府中市	雄	捕獲	成獣	110	30.0	R8.8.27	陰性
1597	8月10日	江田島市	雄	捕獲	成獣	100	60.0	R8.8.27	陰性
1598	8月12日	江田島市	雄	捕獲	幼獣	60	5.0	R8.8.27	陰性
1599	8月12日	江田島市	雌	捕獲	幼獣	60	5.0	R8.8.27	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1600	8月17日	熊野町	雄	捕獲	幼獣	50	18.0	R8.8.27	陰性
1601	8月8日	世羅町	雄	捕獲	成獣	110	35.1	R8.8.27	陰性
1602	8月8日	世羅町	雄	捕獲	成獣	124	54.2	R8.8.27	陰性
1603	8月8日	世羅町	雌	捕獲	成獣	103	36.8	R8.8.27	陰性
1604	8月10日	世羅町	雌	捕獲	成獣	101	35.2	R8.8.27	陰性
1605	8月10日	世羅町	雄	捕獲	成獣	114	43.5	R8.8.27	陰性
1606	8月16日	世羅町	雌	捕獲	成獣	118	51.5	R8.8.27	陰性
1607	8月17日	東広島市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	R8.8.27	陰性
1608	8月17日	呉市	雌	捕獲	成獣	100	70.0	R8.8.27	陰性
1609	8月11日	福山市	雌	捕獲	成獣	70	25.0	R8.8.27	陰性
1610	8月14日	福山市	雄	捕獲	成獣	120	50.0	R8.8.27	陰性
1611	8月7日	坂町	雌	捕獲	成獣	97	40.0	R8.8.27	陰性
1612	8月9日	坂町	雄	捕獲	成獣	96	39.0	R8.8.27	陰性
1613	8月12日	坂町	雌	捕獲	幼獣	62	4.0	R8.8.27	陰性
1614	8月18日	福山市	雌	捕獲	成獣	100	25.0	R8.8.27	陰性
1615	8月17日	呉市	雄	捕獲	成獣	80	40.0	R8.8.27	陰性
1616	8月16日	福山市	雄	捕獲	成獣	110	70.0	R8.8.27	陰性
1617	8月18日	竹原市	不明	捕獲	幼獣	60	20.0	R8.8.27	陰性
1618	8月17日	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	10.0	R8.8.27	陰性
1619	8月17日	福山市	雄	捕獲	幼獣	60	10.0	R8.8.27	陰性
1620	8月18日	福山市	雌	捕獲	幼獣	55	10.0	R8.8.27	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1621	8月18日	福山市	雄	捕獲	成獣	100	50.0	R8.8.27	陰性
1622	8月20日	東広島市	雌	捕獲	成獣	60	30.0	R8.8.27	陰性
1623	8月18日	三原市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	R8.8.27	陰性
1624	8月17日	坂町	雄	捕獲	成獣	97	35.0	R8.8.27	陰性
1625	8月20日	府中市	雌	捕獲	成獣	90	25.0	R8.8.27	陰性
1626	8月22日	府中市	雄	捕獲	成獣	100	40.0	9月3日	陰性
1627	8月22日	府中市	雌	捕獲	成獣	80	25.0	9月3日	陰性
1628	8月23日	府中市	雌	捕獲	成獣	80	30.0	9月3日	陰性
1629	8月19日	坂町	雌	捕獲	成獣	92	30.0	9月3日	陰性
1630	8月21日	廿日市市	不明	捕獲	成獣	100	30.0	9月3日	陰性
1631	8月21日	三原市	雄	捕獲	成獣	80	40.0	9月3日	陰性
1632	8月24日	三原市	雌	捕獲	成獣	120	70.0	9月3日	陰性
1633	8月25日	府中市	雄	捕獲	幼獣	80	20.0	9月3日	陰性
1634	8月24日	北広島町	雌	捕獲	成獣	70	40.0	9月3日	陰性
1635	8月24日	北広島町	雄	捕獲	成獣	60	25.0	9月3日	陰性
1636	8月28日	世羅町	雄	捕獲	成獣	50	6.1	9月10日	陰性
1637	8月30日	府中市	雄	捕獲	成獣	85	70.0	9月10日	陰性
1638	8月28日	世羅町	雌	捕獲	成獣	85	15.8	9月10日	陰性
1639	9月1日	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	3.0	9月10日	陰性
1640	9月1日	江田島市	雌	捕獲	成獣	70	30.0	9月10日	陰性
1641	9月1日	江田島市	雄	捕獲	成獣	120	80.0	9月10日	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1642	9月2日	江田島市	雌	捕獲	幼獣	60	10.0	9月10日	陰性
1643	9月2日	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	10.0	9月10日	陰性
1644	9月3日	江田島市	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	9月10日	陰性
1645	9月3日	江田島市	雄	捕獲	成獣	120	50.0	9月10日	陰性
1646	9月3日	府中市	雄	捕獲	成獣	100	80.0	9月10日	陰性
1647	8月31日	坂町	雄	捕獲	成獣	97	37.0	9月10日	陰性
1648	9月1日	三原市	雄	捕獲	成獣	90	50.0	9月10日	陰性
1649	9月1日	三原市	雄	捕獲	幼獣	60	12.0	9月10日	陰性
1650	9月1日	三原市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	9月10日	陰性
1651	9月2日	三原市	雌	捕獲	成獣	100	45.0	9月10日	陰性
1652	9月3日	三原市	雌	捕獲	成獣	100	40.0	9月10日	陰性
1653	9月3日	三原市	雄	捕獲	成獣	120	80.0	9月10日	陰性
1654	9月5日	江田島市	雄	捕獲	成獣	120	60.0	9月10日	陰性
1655	9月6日	江田島市	雌	捕獲	成獣	100	45.0	9月10日	陰性
1656	9月5日	世羅町	雄	捕獲	成獣	80	12.5	9月17日	陰性
1657	9月6日	江田島市	雄	捕獲	幼獣	60	8.0	9月17日	陰性
1658	9月6日	江田島市	雌	捕獲	幼獣	50	5.0	9月17日	陰性
1659	9月6日	府中市	雌	捕獲	成獣	110	50.0	9月17日	陰性
1660	9月6日	府中市	雌	捕獲	幼獣	60	5.0	9月17日	陰性
1661	9月6日	福山市	雄	捕獲	成獣	110	40.0	9月17日	陰性
1662	9月6日	福山市	雄	捕獲	成獣	120	40.0	9月17日	陰性

野生いのししの豚熱（CSF）感染状況調査（PCR検査）の結果

番号	発見月日	発見場所	性別	分類	区分	体長（cm）	体重（kg）	検査月日	結果
1663	9月7日	三原市	雌	捕獲	成獣	100	50.0	9月17日	陰性
1664	9月7日	三原市	雄	捕獲	成獣	90	30.0	9月17日	陰性
1665	9月7日	三原市	雄	捕獲	成獣	70	15.0	9月17日	陰性
1666	9月8日	熊野町	雄	捕獲	幼獣	60	16.0	9月17日	陰性
1667	9月9日	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	80	20.0	9月17日	陰性
1668	9月6日	坂町	雄	捕獲	成獣	108	54.0	9月17日	陰性
1669	9月10日	三原市	雄	捕獲	成獣	80	20.0	9月17日	陰性
1670	9月11日	熊野町	雄	捕獲	幼獣	50	5.0	9月17日	陰性
1671	9月21日	廿日市市	雌	捕獲	幼獣	70	15.0	10月1日	陰性
1672	9月17日	北広島町	雄	捕獲	成獣	60	20.0	10月15日	陰性
1673	9月18日	北広島町	雌	捕獲	成獣	60	20.0	10月15日	陰性
1674	9月18日	北広島町	雄	捕獲	成獣	60	20.0	10月15日	陰性
1675	9月18日	北広島町	雄	捕獲	成獣	70	25.0	10月15日	陰性
1676	10月9日	福山市	雌	捕獲	成獣	100	50.0	10月22日	陰性
1677	10月10日	廿日市市	雄	捕獲	幼獣	70	15.0	10月22日	陰性
1678	10月11日	神石高原町	雄	捕獲	成獣	130	60.0	10月22日	陰性
1679	10月18日	福山市	雄	捕獲	成獣	100	50.0	10月29日	陰性
1680	10月16日	廿日市市	雌	捕獲	成獣	110	40.0	10月29日	陰性
1681	10月21日	神石高原町	雌	捕獲	成獣	90	40.0	10月29日	陰性
1682	10月19日	北広島町	雄	捕獲	成獣	70	20.0	10月29日	陰性