

## 8 潮風害

台風には普通雨がつき物であるが、雨を伴わないで、大荒れの海水のしぶきを運んでくる潮風は、塩分を茎葉に付着させるが、野菜はその被害を受けやすい。潮風による野菜の種類別の被害程度は表3に示すとおりである。

潮風害の対策として、圃場の周囲に防風網を張ったり、寒冷紗やタフベルなどの被覆資材を作物に直接かけた場合被害は軽減される。散水して茎葉に付着した塩分を除去する。ハウスにも塩が付着しているので注意が必要。

幼苗期や定植場活着不十分の場合もしくは間引き直後のものは被害が大きくなるので、風よけを十分に行う。また潮風に弱い品目は塩害を受けにくいところに栽培する。

表3 野菜の種類と潮風による被害程度の差異(時政, 末富 1956)

被害程度	5	4	3	2	1	
種          類	ナス	トウガラシ	ジャガイモ	サツマイモ	キャベツ	
	トマト	シソ	カブ	ニラ	ネギ	
	フジマメ	ミョウガ	ゴボウ	タマネギ		
	ショウガ	レンコン	シュンギク	タカナ		
		サトイモ	フダンソウ			
		ダイコン	ワケギ			
		ハスイモ	ラッキョウ			
		ハクサイ				
		ニンジン				
		ホウレンソウ				
		フキ				